המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה
מיסודו של ארגון נשות הדסה

תכשירים אנטיביוטיים להזרקה במרכז הרפואי הדסה

Penicillins

שם גנרי	שם מסחרי	צורת מתן	מיהול ראשוני	מיהול שניוני	קצב/משך מתן	יציבות (מיהול שניוני) טמפ' חדר	יציבות (מיהול שניוני) מקרר	הערות
Ampicillin	Penibrin	IV	WFI: 500mg in 5ml; 1 g in 5ml; 2g in 10ml	At least 50ml NSI	At least 15 mins	12 hr	24 hr	
		IV continuous	Half the daily dose in at least 250ml NSI		12 hr			
		IM	WFI: 500mg in 1.8ml 1g in3.5 ml; 2g in 6.8ml		-			
Ampicillin/ Sulbactam ⚠	Unasyn, Ampisulvenir	IV	WFI: 1.5g in 3.2ml; 3g in 6.4ml	WFI or NSI or D5W or D5 in 0.45% NaCl or RL; 1.5g - 50ml 3g - 100ml	Bolus: 10-15 min IV infusion: 15-30 min	WFI, NSI: 8 hr D5W: 2 hr	WFI, NSI: 24 hr D5W, D5 in 0.45% NaCl: 4 hr	** contains 230mg sodium per 3g vial
		IM	WFI or 2% lidocaine 1.5g - 3.2ml 3g - 6.4 ml		-			
Amoxicillin/ Clavulanate	Augmentin, Clavenir	IV	0.5g in 10ml WFI; 1g in 20ml WFI	NSI or RL; 0.5g in at least 50ml 1g in at least 100ml	Bolus: 3-4 min; IV infusion: 30-40 min	3 hr (RL); 4 hr (NSI)	8 hr	
Cloxacillin	Cloxacillin-Medo, and various generics	IV	WFI: 1g in 5ml; 2g in 6.8ml	50ml NSI or D5W	30-40 min	24 hr		
		IV continuous		Half the daily dose in 50ml NSI	12 hr			
Penicillin G (Benzylpenicillin)	Penicillin G Sodium	IV	5MU in 3.5 ml WFI	5MU in 50 ml WFI or NSI or D5W	30-120 min	24 hr		** contains 193mg sodium per 5MU
		IV continuous		Half the daily dose in 50ml WFI or NSI or D5W	12 hr			
Piperacillin	Pipril and various generics	IV	4g in 20ml WFI	1g in 15ml NSI or D5W	30 min	24 hr	24 hr	
		IV continuous	4g in 20ml WFI	12g in at least 180ml NSI or D5W	24 hr			
		IM	4g in 8ml WFI or 1% lidocaine	Max. 2g per injection site!				
Piperacillin/ Tazobactam	Tazopip, Piperacillin-Tazocin, and various generics	IV	4.5g in 20ml WFI or NSI	50-150ml NSI or D5W	30 min up to 3 hr	24 hr	24 hr	
		IV continuous	4.5g in 20ml WFI or NSI	At least 240ml NSI (or 500 ml)	24 hr			

Others

שם גנרי	שם מסחרי	צורת מתן	מיהול ראשוני	מיהול שניוני	קצב/משך מתן	יציבות (מיהול שניוני) טמפ' חדר	יציבות (מיהול שניוני) מקרר	הערות
Azithromycin	Azithrovenir, Azithromycin MBI, Zithromax	IV	500mg in 4.8ml WFI	500ml D5W or NSI or 0.45% NaCl or RL	3 hr	24 hr	24 hr	Store protected from light
				250ml D5W or NSI or 0.45% NaCl or RL	at least 1 hr			
Aztreonam	Azactam	IV	1g in 3-5ml WFI	1g in 50-100ml NSI or D5W	20-60 min	24 hr		
		IM	1g in 3ml WFI or NSI	Max. 1g per injection site				
Chloram-phenicol	Chloramphenicol Vuab	IV	15ml WFI or NSI	At least 50ml NSI or D5W	At least 30 min	24 hr	24 hr	Store protected from light
Ciprofloxacin	Giroflox, Ciprofloxacin-Teva	IV	Ready for use		Each 200mg over 30 min			Store protected from light
Clindamycin	Dalacin-C, Clindamycin Injection	IV	-	NSI or D5W: 300-600mg in 50ml; 900mg in 50-100ml; 1200mg in 100ml	Each 300mg over at least 10 min	24 hr		
		IM	Ready for use	Max. 600mg per injection site				
Colistin (Colistimethate Sodium)	Coliracin	IV	Each vial (1MU) in 6-8ml WFI or NSI	Each dose in at least 50ml NSI	30-60 min	-	24 hr	Store protected from light
		IM	Each vial (1MU) in 2ml WFI, inject to a large muscle					
		INH	3ml NSI		10-15 min			
Co-Trimoxazole (Trimethoprim + Sulfa-methoxazole TMP-SMX) ⚠	Septrin	IV	-	NSI or D5W: 1 vial in 125ml; 2 vials in 250ml; 3 vials in 500ml	60-90 min	6 hr		Store protected from light
				If fluid restriction: 75ml D5W per vial	60 min	2 hr		
Daptomycin	Cubicin	IV	10ml WFI: slowly add while pointing needle to vial wall. Wait 10 min, then gently rotate - DO NOT SHAKE!	50ml NSI **(NO DEXTROSE SOLUTIONS!)**	30 min	12 hr	24 hr	
Doxycycline	Doxycycline Ratiopharm	IV	-	100-1000ml NSI or D5W	1-4 hr	-	24 hr	Store protected from light
Erythromycin	Erythromycin Lactobionate	IV	20ml WFI	200-250ml NSI	20-60 min	24hr		
		IV continuous	20ml WFI	500-1000ml NSI	1-8 hr			
Linezolid	Zyvoxid, Linezan, Linezolid-Teva	IV	-	Ready for use	30-120 min			Store protected from light
Metronidazole	Metronidazole Fresenius and various generics	IV	-	Ready for use	20-60 min		24 hr	Store protected from light; ** contains 320mg sodium per bottle
Rifampin	Rifadin and various generics	IV	10ml WFI	500ml NSI or D5W	3 hr	6 hr		
				100ml NSI or D5W	30 min			
Vancomycin	Vanco-Avenir, Vancomycin-Mylan, and various generics	IV	0.5g in 10ml WFI; 1g in 20ml WFI	NSI or D5W: 5mg/ml = 0.5g in 100ml, 1g in 200ml; If fluid restriction: Max. conc. 10mg/ml, consider slower infusion	≥1 hr per each gram	24 hr	24 hr	Store protected from light
		IV continuous			Half the daily dose over 12 hr			
		PO/PZ	0.5g in 10ml WFI	30ml WFI or tap water				

- הטבלה מכילה מידע המתאים לשימוש במבוגרים, לשימוש בילדים מומלץ להיעזר בכלים ייעודיים.
- במידה וקיימת סתירה בין הרשום בטבלה ובין הרשום בעלון, יש לפעול לפי עלון התרופה ו/או להתייעץ עם אגף הרוקחות.

D5W = Dextrose 5% in Water for Injection;
Hr = hours; **min** = minutes
MU = Million units; **NaCl** = Sodium Chloride
NSI = 0.9% NaCl solution (Normal Saline for Injection)
RL = Ringer's Lactated solution (Hartmann's)
WFI = Water for Injection

Cephalosporins

שם גנרי	שם מסחרי	צורת מתן	מיהול ראשוני	מיהול שניוני	קצב/משך מתן	יציבות (מיהול שניוני) טמפ' חדר	יציבות (מיהול שניוני) מקרר	הערות
Cefazolin	Cefazol, Cefzolin-Panpharma, and various generics	IV	1g in 4-10ml WFI or NSI	50-100ml D5W or NSI or RL or D5W in 0.45% NaCl	30-60 min or continuous infusion	D5W, NSI: 12 hr	24 hr	Store protected from light
		IM	1g in 3-4ml lidocaine 1%	-				
Cefotaxime	Claforan, Cefotaxime-Medo	IV	1g in 10ml WFI	50-100ml D5W or NSI or RL or D5W in 0.45% NaCl	Infusion: 20-60 min	24 hr	24 hr	
		IM	1g in 4ml WFI or lidocaine 1%	-				
Ceftaroline	Zinforo	IV	600mg in 20ml WFI	50-250ml NSI or D5W	60 min	6 hr	24 hr	
Ceftazidime	Fortum, Septax, and various generics	IV	WFI: 1g in 3ml; 2g in 10ml	At least 50ml NSI or D5W or RL	15-30 min or continuous infusion	8 hr	24 hr	Store protected from light
		IV continuous	WFI: 1g in 3ml; 2g in 10ml	Each 1gr in at least 25ml NSI or D5W or RL	1/3 the daily dose over 8 hr			
		IM	1g in 3ml 1% lidocaine	-				
Ceftazidime/ avibactam ⚠	Zavicefta	IV	10ml WFI	100ml NSI or D5W	2 hr	4 hr	12 hr	Store protected from light;
Ceftolozane/ Tazobactam ⚠	Zerbaxa	IV	10ml WFI or NSI	100ml NSI or D5W	1 hr	-	24 hr	Store protected from light ** contains 230mg sodium/1.5g vial
Ceftriaxone	Ceftriaxone-Vit, Ceftriaxone-Panpharma, and various generics	IV	1g in 10ml WFI	1g in at least 20ml NSI or D5W	Bolus: 5 min; IV infusion: 30-60 min	6 hr (several products-12 hr)	24 hr	Store protected from light; **DO NOT** mix with calcium-containing infusion bags (i.e. RL)
		IM	1g in 3.5ml 1% lidocaine	-				
Cefuroxime	Zinacef, Cefuroxime-Panpharma, and various generics	IV	750mg in at least 6ml WFI	50-100ml D5W or NSI or RL or D5W in 0.45%/0.9% NaCl	Bolus: 5 min; infusion: 30-60 min	12-24 hr	24 hr	Store protected from light
		IM	750mg in 3ml WFI or 1% lidocaine	Max. 750mg per injection site				

Carbapenems

שם גנרי	שם מסחרי	צורת מתן	מיהול ראשוני	מיהול שניוני	קצב/משך מתן	יציבות (מיהול שניוני) טמפ' חדר	יציבות (מיהול שניוני) מקרר	הערות
Ertapenem	Invanz	IV	1g in 10ml WFI or NSI	50ml NSI	Up to 6 hr	6 hr	24 hr	
		IM	1g in 3.2ml 1% lidocaine	-		1 hr		
Imipenem/ Cilastain ⚠	Primaxin	IV	500mg in 10ml NSI or D5W	NSI or D5W or D5NSI; ≤500mg in 100ml, 1g in 250ml	≤0.5g in 30min; 1g – 60 min	4 hr	24 hr	
Meropenem	Meronem and various generics	IV	500mg in 10ml 1g in 20ml WFI	50-200ml NSI or D5W (conc. 1-20mg/ml)	15-30 min	3 hr	24 hr	

Aminoglycosides

שם גנרי	שם מסחרי	צורת מתן	מיהול ראשוני	מיהול שניוני	קצב/משך מתן	יציבות (מיהול שניוני) טמפ. חדר	יציבות (מיהול שניוני) מקרר	הערות
Amikacin	Amikan, Amikacin-Medo	IV	-	100ml NSI or D5W	30-60 min	24 hr	24 hr	Do not administer via Y-set with beta-lactams
		IM	Ready for use		-			
		INH	-	2ml NSI				
Gentamicin	Gentamicin-Teva, Gentamicin Panpharma	IV	-	100ml NSI	30-60 min	24 hr	24 hr	
		IM	-					
		INH	-	1-2ml NSI				

Anti-Virals

שם גנרי	שם מסחרי	צורת מתן	מיהול ראשוני	מיהול שניוני	קצב/משך מתן	יציבות (מיהול שניוני) טמפ' חדר	יציבות (מיהול שניוני) מקרר	הערות
Acyclovir	Zovirax, Acyclovenir	IV	10ml WFI or NSI	NSI or 0.45% NaCl: Max. conc. 5mg/ml; Dose ≤ 500mg – 100ml; Dose >500mg – 200ml	At least 1 hr	12 hr	24 hr	
Cidofovir	Cidofovir-Raz	IV	-	100ml NSI	1 hr	24 hr	24 hr	Administered with probenecid
Foscarnet	Foscavir	IV	Ready for use	Central vein – additional dilution not mandatory; Peripheral vein – at least 1:1 in NSI or D5W	At least 1 hr. Over 90mg/kg – at least 2 hr	-	24 hr	
Ganciclovir	Cymevene	IV	10ml WFI	100ml NSI or D5W	1 hr	Following initial reconstit-ution – 12 hr	24 hr	

Anti-Fungals

שם גנרי	שם מסחרי	צורת מתן	מיהול ראשוני	מיהול שניוני	קצב/משך מתן	יציבות (מיהול שניוני) טמפ' חדר	יציבות (מיהול שניוני) מקרר	הערות
Amphotericin -B Deoxycholate	Fungizone	IV	10ml WFI	D5W only! Max. concentration 1mg/10ml	2-6 hr	8 hr	24 hr	Store protected from light
Amphotericin -B Liposomal	Ambisome	IV	12ml WFI and shake well immediately	D5W only! To 0.2-2mg/ml	30-60 min; >5mg/kg – 2 hr	24 hr	24 hr	Administer via 5 micron filter (provided in package)
Anidulafungin	Eraxis, Anidulafungin-Teva	IV	30ml WFI	100ml D5W or NSI for each 100mg	100mg - at least 90 min; 200mg - at least 3 hr	48 hr*		
Caspofungin	Cancidas, Caspovidae, Caspofungin Teva	IV	10.5 WFI	250ml NSI or 0.45% NaCl or RL. NaCl, RL; Max. conc. for volume restriction: 0.5mg/ml	1 hr	24 hr; (1 hr following initial reconstit ution)	24 hr	
Fluconazole	Triflucan, Fluco-Avenir, and various generics	IV	Ready for use	-	Max. 10ml/min (=20mg/min)	-	-	
Isavuconazole	Cresemba	IV	5ml WFI	200mg in 250 ml NSI or D5W	At least 1 hr	6 hr	24 hr	Administer via filter (provided in package)
Voriconazole	V-Fend, Vortimal	IV	200mg in 19ml WFI or NSI	D5W or NSI to 0.5-5mg/ml (40-400ml per 200mg)	1-3 hr. Max 3mg/kg/hr		24 hr	

* מבחינה מיקרוביולוגית, יש להשתמש בתכשיר להזרקה מיד עם הכנתו. אחסון ליותר מ-24 שעות איננו מומלץ אלא אם הכנה נעשתה בתנאים אספטיים.

⚠ יש לוודא אם המינון שנרשם כולל את שני מרכיבי התרופה. למשל, עבור Cotrimoxzazole - האם המינון מתייחס לשני מרכיבי התכשיר (Trimethoprim + Sulfamethoxazole) או למרכיב ה-Trimethoprim בלבד.

הטבלה הוכנה ע"י ד"ר נטלי רבקין, ד"ר אהוד הורביץ, מגר' נטלי שוקייר והרוקחת ראיה דרוויש | אגף הרוקחות, דצמבר 2023