

1. אבחון הריון ומידע ראשוני

אבחון הריון ראשוני מתבסס על זיהוי הורמון ה-beta-HCG, המופרש על ידי השליה המתפתחת, בדם או בשתן. הפסקת הריון יזומה הנה הליך רפואי מכוון אשר גורם לסיום ההריון. הפסקת הריון יכולה להתבצע ע"י נטילת תרופות אשר גורמות להפסקת החיות של ההריון ולריקון הרחם ע"י התכווצויות ודימום. לצורך ביצוע הפסקת הריון, ישנה חשיבות מכרעת לאבחון אולטרסוני המאשר כי שק ההריון ממוקם בתוך חלל הרחם (כדי לשלול הריון חוץ-רחמי) ולקביעת גיל ההריון המדויק. גיל ההריון מחושב באופן סטנדרטי לפי היום הראשון של הווסת האחרונה, אך המדידה המדויקת באולטרסאונד (לפי קוטר השק או אורך העובר) היא הקובעת את סוג ההליך המתאפשר – תרופתי או ניתוחי.

שאלה: איך אני יודעת שאני בהריון?

תשובה: איחור במחזור הוא הסימן העיקרי, לצד בחילות, עייפות ורגישות בשדיים. ניתן לאשר זאת בבדיקת שתן ביתית החל מיום האיחור בוסת. לאחר בדיקת שתן חיובית יש לתאם אולטרסאונד אצל רופא נשים סביב שבוע 8.

תגיות: אבחון הריון טרם טיפול, וסת אחרונה

שאלה: איך אני יודעת מה שבוע ההריון שלי? באיזה חודש אני?

תשובה: את שבוע ההריון מחשבים לפי היום הראשון של הווסת האחרונה, כלומר אם אורך המחזור החודשי שלך הוא 28 ימים וביצעת את הבדיקה ביום האיחור, גיל ההריון הוא 4 שבועות. ניתן גם לקבוע את גיל ההריון באמצעות אולטרסאונד וגילי להערכה מדויקת.

תגיות: אבחון הריון, וסת אחרונה

שאלה: אני בהריון!! מה לעשות?

תשובה: יש לבצע אולטרסאונד ראשון בין שבועות 6-8, להקפיד על חומצה פולית (400 מק"ג) ולא להפסיק תרופות קבועות ללא ייעוץ רופא. אם ההריון אינו רצוי, ניתן לפנות לשירות הסוציאלי לתיאום ועדה.

תגיות: הריון, בדיקות בהריון, תזונה בהריון, חומצה פולית.

שאלה: אילו שיטות קיימות בבית חולים וולפסון להפסקת הריון יזומה?

תשובה: קיימות שתי אפשרויות להפסקת הריון יזומה, הפסקת הריון תרופתית והפסקת הריון ניתוחית. השיטה התרופתית מבוצעת עד שבוע 9 וכוללת נטילת מפיג'ין וציטוטק להפסקת ההתפתחות וריקון הרחם. השיטה הניתוחית (גרידה או שאיבה) היא פעולה קצרה תחת הרדמה מלאה וריקון תוכן הרחם תחת הנחיית אולטרסאונד.

תגיות: שיטות טיפול, הפסקת הריון יזומה

שאלה: מהי הפסקת הריון תרופתית?

תשובה: זהו תהליך המבוצע עד שבוע 9 להריון, לאחר אישור ועדה להפסקת הריון, הכולל נטילת תרופות המפסיקות את התפתחות ההריון וגורמות לריקון הרחם באמצעות התכווצויות ודימום.

תגיות: הפסקה תרופתית יזומה, שבוע 9, תרופות

שאלה: עד איזה שבוע ניתן לבצע הפסקת הריון תרופתית?

תשובה: הפסקת הריון תרופתית מבוצעת עד שבוע 9 של ההריון. בשבועות מתקדמים יותר ההמלצה הרפואית היא לרוב ביצוע הפסקת הריון ניתוחית בעזרת שאיבה או גרידה.

תגיות: הפסקה תרופתית יזומה, שבוע 9, תרופות

שאלה: אני לא מצליחה להחליט לגבי האם לבצע הפסקת הריון. מה אפשר לעשות?

החלטה אם להמשיך הריון או להפסיקו היא אישית ומורכבת. כדי להגיע להחלטה המבוססת על המציאות שלך, מומלץ לבחון את הנקודות הבאות:

- מהם סדרי העדיפויות שלך בחיים כרגע?
- איך התינוק ישתלב בתוכניות ובשאיפות שלך לעתיד?
- מהם היתרונות והחסרונות שאת רואה בגידול ילד בנקודת הזמן הזו?
- האם את מרגישה מוכנה (רגשית וכלכלית) לגידול ילד כעת?
- מי האנשים שתומכים בך וכיצד הם יגיבו לכל החלטה שתקבלי?

במידה ואת מתקשה להחליט לבד, מומלץ להתייעץ עם אדם קרוב שאת סומכת עליו (בן זוג, הורה, חברה) או עם גורם מקצועי כמו רופא/ת הנשים שלך, יועצת, או צוות השירות הסוציאלי בוועדה להפסקת הריון בבית החולים.

זכרי: זהו הגוף שלך ואלו החיים שלך. אף אחד לא רשאי להחליט במקומך או לכפות עלייך דרך פעולה. אין החלטה אחת "נכונה" אבסולוטית, אלא רק את זו שמתאימה לך ביותר בנסיבות הנוכחיות.

תגיות: החלטה, הפסקת הריון יזומה

2. הוועדה להפסקת הריון

הוועדה להפסקת הריון פועלת מתוקף חוק העונשין (1977) ומטרתה להסדיר את התהליך מבחינה רפואית וחוקית במדינת ישראל. הוועדה מורכבת מפאנל מקצועי הכולל שני רופאים (לפחות אחד מהם מומחה בגינקולוגיה) ועובדת סוציאלית, ותפקידה לוודא כי הבקשה עומדת באחד הקריטריונים הקבועים בחוק.

תהליך זה נועד להבטיח כי האישה מקבלת את כל המידע הרפואי הנדרש ומעטפת סוציאלית תומכת, תוך שמירה על זכויותיה וביטחונה הרפואי.

הועדה דנה בבקשה, ואם היא מאשרת אותה יקבע לך תור נוסף לביצוע הפסקת ההריון. הועדה מאשרת בקשות כאשר מתקיים אחד מהתנאים: כאשר את למטה מגיל 18, כאשר את אינך נשואה, כאשר ההריון נובע מיחסים אסורים (אונס או גילוי עריות), כאשר התינוק עלול להיוולד בעל מום או כאשר המשך ההריון עלול לסכן את חייך או לגרום לך נזק נפשי.

שאלה: למה צריך ועדה?

תשובה: בישראל הפסקת הריון מוסדרת בחוק משנת 1977, המחייב פנייה לוועדה בבית חולים מורשה כדי לשקול את הבקשה לפי קריטריונים חוקיים.

תגיות: ועדה, חוק

שאלה: האם לרוב הוועדה מאפשרת הפסקת הריון?

תשובה: כן, הסטטיסטיקה מראה כי כ-99% מהבקשות המתקבלות לוועדה להפסקת הריון בבית חולים וולפסון מאושרות.

תגיות: ועדה, אישור, סטטיסטיקה

שאלה: מי יכולה לפנות לוועדה?

תשובה: כל אישה בישראל, ללא קשר לגיל או מעמד אישי.

תגיות: ועדה, קריטריונים

שאלה: מה הרכב הנוכחים בוועדה?

תשובה: שני רופאים (לרוב גינקולוג בכיר ורופא נוסף) ועובדת סוציאלית.

תגיות: ועדה, הרכב, נוכחים

שאלה: איך ומתי אדע את החלטת הועדה?

אישור הוועדה יישלח לדואר האלקטרוני שלך עוד ביום הועדה. עם קבלתו ניתן [לקבוע](#) תור לביצוע ההליך הרפואי בבתי החולים.

תגיות: תוצאות הועדה, דואר אלקטרוני

שאלה: עברתי היום ועדה. מה השלב הבא?

תשובה: אישור הוועדה יישלח לדוא"ל שלך, ולאחריו תוכלי לקבוע תור לביצוע ההליך בבית החולים.

תגיות: ועדה, המשך תהליך

שאלה: האם אב העובר צריך להיות בוועדה? האם יש צורך בהסכמת השותף להריון?

תשובה: לא, לבן הזוג אין מעמד חוקי בוועדה והסכמתו אינה נדרשת. את המחליטה הבלעדית על גופך.

תגיות: ועדה, בן זוג, הסכמה

שאלה: האם אני חייבת להתייצב מול הוועדה?

תשובה: לא. ניתן לבצע הליך מקוון דרך הקישור המצורף.

<https://www.gov.il/he/service/pregnancy-termination-committee>

תגיות: ועדה, התייצבות, מסמכים

שאלה: באילו מקרים הועדה מאשרת הפסקת הריון יזומה?

תשובה: עד שבוע 24 הועדה מאשרת הפסקת הריון במקרים הבאים - מתחת לגיל 18 או מעל 40, הריון מיחסיים אסורים, חשש למום בעובר, או סיכון לחיי האישה או לנזק פיזי/נפשי.

תגיות: ועדה, קריטריונים, חוק

שאלה: מה להביא לוועדה?

תשובה: תעודת זהות, הפניה, סונר המדגים הריון תוך רחמי ואת גיל ההריון, בדיקות דם (סוג דם וספירה) ואמצעי תשלום או טופס 17. חיילות צריכות אישור מיחידת מהו"ת.

תגיות: ועדה, הכנה, אישורים

שאלה: מה צריך להכין לוועדה מקוונת?

תשובה:

לשם ביצוע הליך מקוון באמצעות מערכת הזיהוי הממשלתית, ללא צורך בהגעה פיזית, יש להצטייד בפרטים הבאים -

1. תעודת זהות, כאשר הסיבה להגשת הבקשה הינה הריון מחוץ לנישואים, נדרשת הצגת ספח תעודת זהות.

2. מסמכים מבדיקת רופא/ת נשים המעידים על הריון.

3. תמונת אולטרה סאונד שעליה מופיע שם המטופלת, המדגימה הריון תוך רחמי ואת גיל ההריון.
4. מסמכים רפואיים אחרים (אם הסיבה לבקשת אישור הועדה נובעת מהחשש כי הוולד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי (סעיף 3 לחוק, או משום שההריון מהווה סיכון לחיי האישה או לגרום לה נזק גופני או נפשי (סעיף 4 לחוק)).
5. תוצאות בדיקות דם שנלקחו במסגרת קופת חולים או מרפאה צבאית: סוג דם, ספירת דם ו-RH. בדיקות הדם אינן נדרשות לצורך קבלת אישור הועדה, אלא לביצוע הפסקת ההריון.
6. טופס 17 לוועדה (קוד L0209) או אסמכתא תקציבית מהצבא. חברות קופ"ח מכבי אינן נדרשות להציג טופס 17.

שאלה: כיצד פונים לוועדה להפסקת הריון?

תשובה: ניתן לפנות בהליך מקוון (עד שבוע 24) דרך הקישור המצורף.

<https://www.gov.il/he/service/pregnancy-termination-committee>

לחילופין ניתן להגיע לוועדה פרונטלית בבית החולים בימים א', ג', ה' בתיאום מראש.

ניתן לתאם תור לוועדה אצל מזכירת השירות הסוציאלי בטלפון 03-5028455, שלוחה 2

בימים ראשון עד חמישי בין השעות 08:00 עד 15:00

ניתן לפנות גם בדואר האלקטרוני: vaadas@wmc.gov.il

יש למסור בטלפון או לכתוב בהודעת הדואר האלקטרוני פרטים מזהים (מספר תעודת זהות, שם פרטי ושם משפחה) ופרטי יצירת קשר (כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון), לצורך מילוי טופס הוועדה.

תגיות: ועדה, דרכי פניה, שירות סוציאלי, הליך מקוון

שאלה: מדוע נאמר בוועדה להפסקת הריון שאני נדרשת לאולטרסאונד לפני הטיפול?

תשובה: לעיתים האולטרסאונד הקיים אינו מספק (חסר מידע על מיקום השק או שבוע מדויק), ולכן נדרשת הערכה חוזרת.

תגיות: אולטרסאונד, ועדה

שאלה: מה תהליך עבודת הועדה? מה צפוי לי?

מזכירת הוועדה תשוחח אתך ותיקח ממך את הפרטים הנדרשים לצורך מילוי טופס הוועדה.

לאחר מכן תשוחחי עם עובדת סוציאלית, אשר תוכל לתת לך הסברים לגבי הליכי אישור הבקשה וייעוץ לגבי

קשיי ההחלטה או בעיות נלוות למצב.

בוועדה, תיפגשי עם רופא/ת נשים מומחה/ית אשר יסבירו לך על תהליך הפסקת ההיריון ועל השלבים השונים, יפרטו בקצרה את השיטות האפשריות ויסבירו על תופעות הלוואי והסיבוכים אשר עלולים להיות כרוכים בפעולה.

החלטת הוועדה נמסרת מיידית, ומפרטת את הסעיף בחוק לפיו אושרה הפסקת ההיריון כמו גם את אפשרויות הביצוע העומדות בפניך.

תגיות: ועדה להפסקת הריון, שירות סוציאלי, החלטת הועדה

3. קטינות ודיסקרטיות

כ-13 אחוזים מכלל הפסקת ההריון בישראל הן בקרב נערות עד גיל 19 מערכת הבריאות בישראל מעניקה לקטינה אוטונומיה מלאה לקבל החלטות לגבי הפסקת הריונה ללא צורך באישור הורים או אפטרופוס, זאת על מנת לעודד נערות לפנות לקבלת טיפול רפואי בטוח. על כן, נשמרת לקטינה הזכות שלא לשתף את הוריה / אפטרופוס במידע הרפואי על ההיריון, על כל נגזרותיו, לרבות טיפול בהריונות פתולוגיים ו/או בסיבוכי הפסקת הריון. הטיפול כפוף לכללי סודיות רפואית מחמירים, וקיימים פרוטוקולים מנהלתיים בבתי החולים המאפשרים יצירת "תיק חסוי". מנגנון זה מבטיח כי המידע על התהליך לא יופיע בתיק הרפואי הממוחשב הכללי של קופת החולים ולא יהיה נגיש לגורמים חיצוניים, כולל בני משפחה, ללא הסכמתה המפורשת של המטופלת. ככלל, הצוות הרפואי אינו רשאי למסור מידע להורים / אפטרופוס בניגוד לרצון הנערה. במקרים חריגים ייוועץ הצוות הרפואי עם גורמים רלוונטיים בבית החולים או בקהילה.

שאלה: אני קטינה וחסרת מעמד בישראל אין לי איך לשלם על הפסקת הריון, מה אני יכולה לעשות?

תשובה: משרד הבריאות נושא בכל ההוצאות עבור קטינה חסרת מעמד בישראל.

תגיות: נערה, קטינה, משרד הבריאות

שאלה: האם הטיפול תועד בתיק הרפואי שלי? האם זה דיסקרטי?

תשובה: ניתן לבקש לשמור את הטיפול בגיליון חסוי בארכיון בית החולים, כך שלא תהיה גישה אליו לגורמים חיצוניים או לעובדים לא רלוונטיים.

תגיות: דיסקרטי, סודיות, תיק רפואי

שאלה: אני לא רוצה שהקרובים שלי ידעו

תשובה: רופאים, אחיות או עובדים סוציאליים מחויבים לשמור על פרטיך בסוד ולא למסור מידע ללא הסכמתך. ניתן לבקש גיליון חסוי שלא יהיה נגיש לקופות החולים או לכלל צוות בית החולים.

הסיבה היחידה למסירת מידע ללא הסכמתך היא להגן עליך מפני פגיעה או התעללות (אם את מתחת לגיל 18). במקרה זה על הצוות ליידע אותך.

תגיות: סודיות, דיסקרטיות, קטינות

שאלה: אני קטינה, האם אני יכולה לבצע הפסקת הריון על דעת עצמי בלבד?

תשובה: כן, לפי החוק הסכמת קטינה אינה טעונה אישור הורים או אפוטרופוס, ונשמרת לה הזכות לסודיות מלאה.

תגיות: נערה, קטינה, מתחת ל-18

שאלה: האם יש סודיות רפואית מול הבעל?

תשובה: יש לך זכות מלאה לסודיות רפואית. אין צורך חוקי בידיעת הבעל או אישורו לביצוע ההליך.

תגיות: סודיות, זכויות המטופלת

4. עלויות, זכאויות

מימון הפסקת הריון בישראל מוסדר דרך סל הבריאות וניתן לנשים העומדות בקריטריונים -

- אישה עד גיל 33

- ההריון נובע מיחסים אסורים על-פי החוק הפלילי (כגון גילוי עריות או אונס), ללא תלות בגיל האישה.

- הוולד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי, ללא תלות בגיל האישה.

- המשך ההריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לה נזק גופני ו/או נפשי,

ללא תלות בגיל האישה.

- מסיבות רפואיות, ללא תלות בגיל האישה.

עבור נשים שאינן זכאיות למימון ציבורי, העלות נקבעת על פי מחירון משרד הבריאות המשתנה מעת לעת.

למימוש הזכאות נדרשת בדרך כלל התחייבות כספית (טופס 17) מקופת החולים.

שאלה: האם הטיפול להפסקת הריון עולה כסף?

תשובה: כן, הדיון וההליך כרוכים בתשלום לפי מחירון משרד הבריאות. בפנייה לוועדה להפסקת הריון נדרש

לבצע תשלום או להציג התחייבות כספית מקופת החולים המבטחת או מגורם מבטח אחר. תעריפי הוועדה

להפסקת הריון וביצוע הפסקת הריון משתנים מעת לעת ומפורסמים במחירון משרד הבריאות.

תגיות: עלות, תשלום, התחייבות כספית

שאלה: האם אני צריכה להביא טופס 17 לוועדה ולטיפול?

תשובה: ברוב המקרים כן, אך יש חריגים לפי הקופה; כדאי לוודא מול מוקד הקופה.

תגיות: טופס 17, ועדה, קופת חולים

שאלה: מה העלות של הפסקת הריון?

תשובה: העלות משתנה מעת לעת ומפורסמת באתר של משרד הבריאות.

<https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/moh-price-list?skip=0>

תגיות: עלות, מחיר, משרד הבריאות

שאלה: האם אני זכאית למימון של ועדה להפסקת הריון?

תשובה: מימון יינתן למי שקיבלה אישור ועדה (דרך סל הבריאות), לקטינות חסרות מעמד, לחיילות, ולעיתים לנשים המוכרות על ידי שירותי הרווחה.

תגיות: עלות, מחיר, משרד הבריאות, ועדה

שאלה: האם אני זכאית למימון של תהליך הפסקת הריון?

תשובה: מימון הפסקת הריון בישראל מוסדר דרך סל הבריאות וניתן לנשים העומדות בקריטריונים -

- אישה עד גיל 33

- ההריון נובע מיחסים אסורים על-פי החוק הפלילי (כגון גילוי עריות או אונס), ללא תלות בגיל האישה.

- הוולד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי, ללא תלות בגיל האישה.

- המשך ההריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לה נזק גופני ו/או נפשי,

ללא תלות בגיל האישה.

- מסיבות רפואיות, ללא תלות בגיל האישה.

תגיות: עלות, מחיר, משרד הבריאות

5. הכנה לטיפול והביקור הראשון

הביקור הראשון במרפאה מהווה את נקודת הפתיחה המעשית של התהליך הרפואי והוא מוקדש להיכרות אישית, סקירה יסודית של ההיסטוריה הרפואית ובניית תוכנית הטיפול. לאחר קבל אישור מהועדה יקבע לך תור לתחילת תהליך ההפסקת הריון, זהו מועד הביקור הראשון. עם ההגעה תתקבלי במזכירות ושם תציגי טופס 17 או פיקדון, תעברי בדיקת מדדים אצל אחות, ולאחר מכן תיפגשי עם רופא/ה המרפאה ממנו תקבלי הסבר מפורט על שלבי התהליך, אופן פעולת התרופות, לוחות הזמנים המדויקים וזיהוי סימני אזהרה. מעבר למתן המידע, שלב זה כולל את מתן המנה הראשונה של הטיפול התרופתי, מפיגין, במרפאה תחת השגחה,

והוראות להמשך התהליך בסביבה הביתית שלך. בסיום הביקור תצוידי בכדורים להמשך הטיפול בביתך ובתור לביקורת במרפאה כעבור כשבועיים.

שאלה: איך להיערך לטיפול?

תשובה: כדאי להיערך ל-3-5 ימי מחלה בבית, להצטייד במשככי כאבים שעוזרים לך בכאבי מחזור ובפדים עבים, ולדאוג לליווי של אדם קרוב.

תגיות: היערכות, הכנות, בבית

שאלה: מה להביא לביקור הראשון בהפסקת הריון יזומה?

תשובה: יש להביא אישור ועדה בתוקף, תמונת אולטרסאונד המדגימה הריון תוך רחמי ואת גיל הריון (צילום או דו"ח), וכן תוצאות בדיקות דם מהחודש האחרון (ספירת דם וסוג דם).

תגיות: הכנה, אישורים, סונר, הפסקת הריון יזומה

שאלה: מה קורה בביקור הראשון?

תשובה: המפגש כולל פגישה עם רופא, סקירת רקע רפואי, וידוא שאין התוויות נגד ונטילת 3 כדורי מפיג'ין (600 מ"ג) בבליעה. לאחר מכן מתבצעת השגחה של 20 דקות לזיהוי תגובה אלרגית. בסיום במפגש תצוידי בכדורי ציטוטק (200 מ"ג) ללקיחה בבית בבליעה ותוכלי לתאם תור לביקורת עם צוות המזכירות של המרפאה.

תגיות: ביקור ראשון, הטיפול התרופתי

שאלה: כמה זמן נמשך הביקור? מה קורה בביקור הראשון בהרחבה?

תשובה: עם ההגעה תתקבלי במזכירות (טופס 17 או פיקדון), תעברי בדיקת מדדים אצל אחות, ולאחר מכן רופא/ה תסביר על התהליך ותחתים על טפסי הסכמה. בסיום נלקח מפיג'ין במקום וניתנים כדורי ציטוטק לבליעה בבית כעבור 48 שעות. בסיום הביקור מומלץ לתאם תור לביקורת עם מזכירות המרפאה. משך הביקור משתנה מיום ליום אך לרוב מדובר בביקור שעורך כשעה.

תגיות: ביקור ראשון, הטיפול התרופתי, זמנים

שאלה: באיזה מקרים לא ניתן לבצע הפסקת הריון תרופתית? מהן התוויות הנגד?

תשובה: הרופא ימליץ להימנע מהשיטה התרופתית במקרים של הריון מעל שבוע 9+0, אגמיה קשה (המוגלובין מתחת ל-9), נוכחות התקן תוך רחמי, הפרעות קרישה או טיפול בנוגדי קרישה, מחלת כבד פעילה, מחלה קרדיווסקולרית, אפילפסיה לא מאוזנת, אסטמה, חשד להריון חוץ-רחמי או הריון בצלקת ניתוח קיסרי, אלרגיה לתרופות הטיפול או אי-יכולת לעמוד במעקב.

תגיות: ביקור ראשון, הטיפול התרופתי, הפסקת הריון יזומה, הפלה נדחית

שאלה: האם צריך להגיע עם מלווה?

תשובה: בטיפול תרופתי מומלץ להגיע עם מלווה לתמיכה רגשית וסיוע בחזרה הביתה מאחר וייתכנו כאבים והתכווצויות החל מחצי שעה לאחר נטילת הטיפול.

תגיות: ליווי, תמיכה

שאלה: האם אקבל ימי מחלה?

תשובה: מומלץ על 3 ימי מנוחה מנטילת הציטוסק; יש לפנות לרופא קופ"ח לקבלת אישור תקף.

תגיות: ימי מחלה, מנוחה

שאלה: למה משמש סוג הדם שלי? מה המשמעות של סוג דם שלילי (RH NEG)?

תשובה: סוג הדם חשוב כדי לקבוע אם יש צורך במתן זריקת אנטי-D. במקרה שיש לך סוג דם עם RH שלילי תצטרכי לקבל זריקת אנטי-D עד 72 שעות מתחילת ההריון למניעת סיבוכים בהריונות עתידיים

תגיות: אנטי D, RH negative, סוג דם שלילי.

6. הטיפול התרופתי - מינונים ונהלים

הפרוטוקול התרופתי המקובל בבית חולים וולפסון ומרבית המרכזים הרפואיים בעולם משלב שתי תרופות הפועלות בסניגריה פיזיולוגית להשגת ריקון הרחם. התרופה הראשונה, מיפריסטון (מיפג'ין), חוסמת את קולטני הפרוגסטרון ברחם, מה שגורם להפסקת התפתחות ההריון ולהכנת רירית הרחם לפליטה. התרופה השנייה, מיסופרוסטול (ציטוסק), ניתנת כ-48 שעות לאחר מכן וגורמת להתכווצויות של שריר הרחם ולפתיחה של צוואר הרחם. הקפדה על המינון המדויק ועל מרווחי הזמן בין התרופות הכרחית להשגת אחוזי הצלחה גבוהים ולמזעור הצורך בהתערבות כירורגית משלימה.

הפרוטוקול כולל נטילת 600 מ"ג מפיג'ין (3 כדורים של 200 מ"ג) דרך הפה ולאחר 48 שעות נטילת 400 מק"ג ציטוסק דרך הפה (2 כדורים של 200 מק"ג)

שאלה: מה זה מפיג'ין? מה תופעות הלוואי של מפיג'ין?

תשובה: מפיג'ין (mifepristone) הוא אנטי-פרוגסטרון החוסם את ההורמון החיוני להריון, מחליש את רירית הרחם ומגביר את השפעת הציטוסק. תופעות הלוואי כוללות תסמינים דמויי וסת, בחילות, דימום וכאבים קלים.

תגיות: מפיג'ין, תרופות, תופעות לוואי

שאלה: מה זה ציטוטק?

תשובה: ציטוטק הוא פרוסטגלנדין הגורם להתכווצויות רחם ופינוי תוכן ההריון. תופעות הלוואי כוללות דימום רב, כאבי בטן קשים, חולשה, שלשול, בחילות וחום נמוך.

תגיות: ציטוטק, תרופות, תופעות לוואי

שאלה: מדוע הטיפול מורכב ממפיג'ין וציטוטק? חברה סיפרה לי שהיא קיבלה רק סוג אחד של כדור.

תשובה: שילוב התרופות משפר משמעותית את היעילות לעומת שימוש בציטוטק בלבד ומפחית את שיעורי הכישלון והצורך בניחות. זהו הסטנדרט הרפואי המקובל כיום.

תגיות: מפגי'ין, ציטוטק, תרופות

שאלה: מה השלב השני? מהו הטיפול בציטוטק?

תשובה: כעבור 48 שעות מנטילת המפיג'ין, יש ליטול בבית בבליעה כדורי ציטוטק (Misoprostol) הגורמים להתכווצויות רחם וריקון תוכן ההריון. ייתכנו גם חולשה, עליית חום קלה, צמרמורות ובחילות.

תגיות: ציטוטק, כאבים, דימום

שאלה: מהו הפרוטוקול הטיפולי? כמה כדורים אני צריכה לקחת? מה המינון של הטיפול התרופתי?

תשובה: 3 כדורי מפגי'ין (600 מ"ג) בבליעה, וכעבור 48 שעות 2 כדורי ציטוטק (400 מק"ג) בבליעה. בטיפול.

תגיות: תרופות, מינונים, הפסקת הריון יזומה

שאלה: האם יש ליטול את הטיפול עם או בלי אוכל? האם עלי להיות בצום?

תשובה: אין חשיבות למועד נטילת התרופות ואין צורך בצום. במקרה של בחילות מומלץ ליטול כדור נגד בחילות לפני תחילת הטיפול. חשוב להקפיד על הפרש של 48 שעות בין המפיג'ין לציטוטק.

תגיות: צום, ארוחות, בחילות, ציטוטק, מפגי'ין

שאלה: מה לעשות אם אין מפגי'ין? מה לעשות אם אני אלרגית למפיג'ין?

תשובה: ניתן להשתמש בציטוטק בלבד, אך יש לקחת בחשבון שיעילות הטיפול יורדת מעט.

תגיות: מפגי'ין, ציטוטק

שאלה: אני לא מצליחה למצוא את הכדורים. איבדתי את הכדורים/ הציטוטק

תשובה: פני מייד למיון נשים לקבלת חלופיים; עיכוב עלול לפגוע בסיכויי ההצלחה.

תגיות: התרופות, אובדן

שאלה: שכחתי לקחת את הציטוטק? שכחתי לקחת את הכדורים?

תשובה: ניתן ליטול עד 72 שעות מנטילת המפיג'ין, אך היעילות יורדת משמעותית. מעבר ל-72 שעות נדרשת הערכה מחודשת של רופא.

תגיות: שכחה, 48 שעות

שאלה: מה קורה אם הקאתי לאחר נטילת הכדור?

תשובה: אם הקאת בתוך פחות מ-20 דקות, צרי קשר עם המרפאה (ייתכן שתצטרכי מנה נוספת). מעל 20 דקות - סביר שהתרופה נספגה.

תגיות: הקאה, ספיגה, כדור

7. תופעות זמן החלמה

תהליך ההחלמה הגופנית לאחר הפסקת הריון כרוך בשינויים הורמונליים חדים ובחזרה הדרגתית של הרחם לגודלו ומצבו הרגיל. בשבועות הראשונים שלאחר ההליך, טבעי לחוות דימומים לא סדירים בכמויות משתנות וכאבים או התכווצויות בבטן תחתונה, המעידים על התנקות הדרגתית של חלל הרחם. החומר ההריוני יפלט מם הרחם ביחד עם הדימום וההתכווצויות. הורמון ההריון (HCG) מתפנה מהדם באיטיות, ולכן תסמינים כמו רגישות בשדיים, נפיחות ובחילות עשויים להימשך מספר ימים ואף שבועות. הווסת הראשונה מופיעה בדרך כלל תוך 4-6 שבועות, והיא מסמלת את חזרתו של הגוף לפעילות הורמונלית ומחזורית תקינה.

שאלה: האם זה נורמלי שעדיין יש בחילות?

תשובה: כן. בחילות יכולות להיות תופעת לוואי של התרופות עצמן או תסמין הריוני שטרם חלף. לרוב הן עוברות תוך מספר ימים עד לשבועיים. את יכולה להפחית את הבחילות ע"י מנוחה, שתיה של מים במנות קטנות וארוחות קלות וקטנות לאורך כל היממה. עם זאת, אם הבחילות מלוות בהקאות מרובות, אינך מצליחה לאכול ולשתות כלל או אם הבחילה מלווה בחום גבוה, יש ליצור קשר עם המרפאה.

תגיות: בחילות, תסמינים, זמן החלמה

שאלה: מתי אמורה להגיע הווסת הבאה?

תשובה: הווסת הראשונה צפויה להגיע תוך 4 עד 6 שבועות מההליך, ייתכן ועד למועד הווסת תחוו דימומים לא סדירים בכמויות משתנות החל מהכתמות ועד ליציאת קרישי דם. כמו כן, הווסת הראשונה עשויה להיות מעט כבדה מהרגיל ושונה מהווסת אותה את מכירה.

תגיות: וסת, מחזור ראשון, זמן החלמה

שאלה: מתי לעשות בדיקת הריון ביתית?

תשובה: אין צורך בביצוע בדיקת הריון ביתית, בדיקת הריון אינה מהווה סמן להצלחת או כישלון התהליך. לא לפני שחלפו 3-4 שבועות. הורמון ההריון beta-HCG מתפנה מהגוף באיטיות והוא יכול להישאר מוגבר לאורך יותר מ-3-4 שבועות, גם לאחר הצלחת התהליך וסיומו.

תגיות: בדיקת הריון, מעקב, beta-HCG

שאלה: האם ישנן השלכות לטווח הרחוק?

תשובה: לא. מחקרים קליניים מראים שסיום הריון תרופתי מוצלח אינו פוגע בפוריות העתידית או ביכולת להחזיק הריון תקין בעתיד.

תגיות: השלכות לטווח רחוק, פוריות

שאלה: האם אני אראה את העובר נפלט?

תשובה: רוב הנשים אינן רואות או מבחינות בדבר מיוחד בזמן פליטת תוכן ההריון. חלק מהנשים עשויות לראות את שק ההריון, שצבעו לבן מעורב בקרישי דם. אם ההריון הוא סביב שבוע 9 ומעלה, ייתכן שניתן יהיה להבחין גם בעובר קטן. את יכולה לבחור שלא להסתכל על התחבושות, פשוט לעטוף אותן ולהשליך אותן לפח כפי שאת עושה בזמן הדימום החודשי.

תגיות: פליטת עובר, מה אני ארגיש

שאלה: כמה זמן דימום נחשב תקין?

תשובה: צפוי דימום משמעותי של כ-3-4 ימים לאחר נטילת הציטוטק ולאחר מכן ייתכן דימום קל אך ממושך למשך כשבועיים ולעיתים עד לווסת. הדימום הממושך הוא לרוב בכמות פחותה מווסת. ייתכנו גם ימי הפסקה בדימום והישנות לאחר מכן במהלך פרק הזמן הזה.

תגיות: דימום, זמן התאוששות

8. תופעות לוואי וניהול כאב

התכווצויות הרחם הנדרשות לפליטת תוכן ההריון מלוות באופן טבעי בכאב, שדרגתו משתנה בין נשים ונוטה להיות חזקה יותר מכאבי וסת רגילים. הכאב נובע מהפרשת פרוסטגלנדינים הגורמים להתכווצות שריר הרחם. בנוסף ידוע כי לציטוטק יש תופעות לוואי רבות המופיעות בעד כ-70% מהנשים, תופעות אלה כוללות: דימום רב, כאבי בטן קשים (6-7 שעות ראשונות), חולשה, שלשול, בחילות, חום עד 38 מעלות וצמרמורות.

ניהול נכון של הכאב מתבסס על שימוש בתרופות נוגדות דלקת (כגון איבופרופן, אדוויל, נורופן), הפועלות ישירות לעיכוב מנגנון הכאב הרחמי. שימוש מושכל במשככי כאבים, החל מהופעת התסמינים הראשונים, מאפשר למטופלת לעבור את השלב האקטיבי של הפליטה במינימום סבל ובביטחון.

שאלה: אילו תופעות לוואי צפויות? מה אני ארגיש?

תשובה: תופעות שכיחות כוללות דימום המלווה בקרישי דם, כאבי בטן, התכווצויות, בחילות, לעיתים חום נמוך, רגישות בחזה, חולשה וגלי חום.

תגיות: תופעות לוואי, דימום

שאלה: אילו תופעות צפויות אחרי נטילת מפיג'ין? אילו תופעות צפויות אחרי הביקור הראשון?

תשובה: תופעות הלוואי הנפוצות כוללות בחילה (לעיתים כמו בהריון צעיר), ולעיתים דימום קל או כאבי בטן קלים. בחלק קטן מהמקרים תהליך ההפלה יחל כבר לאחר נטילת המפיג'ין, במקרה כזה תחוו דימום משמעותי והתכווצויות כואבות לאחר נטילת המפיג'ין וטרם נטילת הציטוטק.

תגיות: תופעות לוואי, מפיג'ין, דימום

שאלה: מהן תופעות הלוואי של הטיפול התרופתי? מה השכיחות שלהן?

תשובה: המפיג'ין גורם לתסמינים דמויי וסת. הציטוטק גורם לדימום רב, כאבי בטן קשים (6-7 שעות ראשונות), חולשה, שלשול, בחילות, חום עד 38 מעלות וצמרמורות. שכיחות: בחילה (43-66%), שלשול (23-35%), כאב ראש (13-40%), חום/צמרמורות (32-69%).

תגיות: מפיג'ין, ציטוטק, תרופות, אחוזים

שאלה: האם חום נמוך הוא תופעה שכיחה?

תשובה: כן, חום נמוך מופיע אצל 30-70% מהמטופלות. אם החום מעל 39 מעלות או אינו מגיב להורדת חום, יש לפנות לרופא מיד.

תגיות: חום, תסמינים, שכיח

שאלה: מתי יתחיל החלק העיקרי של התהליך?

תשובה: החלק העיקרי (דימום וכאבים עזים) מתחיל לרוב לאחר נטילת הציטוטק בבית, בטווח של חצי שעה עד יממה. לעיתים התגובה מתחילה כבר לאחר המפיג'ין או רק במהלך השבוע שאחרי הציטוטק.

תגיות: ציטוטק, כאבים, תזמון

שאלה: כמה זמן לא מרגישים טוב? ומה קורה אחר-כך? כמה זמן נמשך השלב הלא נוח?

תשובה: בדרך כלל מדובר ב-3-4 ימים של אי נוחות, כאבים ודימום משמעותי. לאחר מכן יש הטבה, אך דימום קל וכאבים יכולים להימשך עד שבועיים ולעיתים עד הווסת.

תגיות: התאוששות, החלמה, זמן

שאלה: האם מותר לקחת משככי כאבים? האם מותר לשלב בין משככי כאבים?

תשובה: כן, כל משכך כאבים שעוזר בזמן מחזור (כמו נורופן, אדוויל, אקמול, אופטלגין) מתאים, תוך הקפדה על הוראות הרוקח.

תגיות: משככי כאבים, המלצות

שאלה: האם מומלץ לקחת משככי כאבים לפני תחילת הטיפול או רק כשמופיעים הכאבים?

תשובה: ניתן לקחת כהכנה או להמתין להופעת הכאב, לפי העדפתך, ובלבד שיהיו זמינים וילקחו לפי המינון המומלץ.

תגיות: משככי כאבים, המלצות

שאלה: מהן התופעות התקינות? מה צפוי לי שלא מצריך פניה לרופא/מיון?

תשובה: נצפה לראות קרישי דם וגושים הדומים ל"כבד", וכן כאבים חזקים והתכווצויות בבטן תחתונה, שלרוב משמעותיים יותר מכאבי מחזור. למי שילדה בעבר ניתן להשוות את הכאבים והדימום ליממה הראשונה לאחר הלידה.

תגיות: ציטוטק, כאבים, דימום

שאלה: האם מותר להשתמש בטמפונים או רק בפדים?

תשובה: מומלץ להשתמש בפדים בלבד כדי לאפשר מעקב אחר כמות הדימום ולהפחית סיכון לזיהום.

תגיות: טמפונים, פדים, זיהום

שאלה: האם אני צריכה לקחת אנטיביוטיקה?

תשובה: אין צורך באנטיביוטיקה מונעת; היא תינתן רק אם יעלה חשד לזיהום לפי שיקול דעת רפואי.

תגיות: אנטיביוטיקה, זיהום, מניעה

הפסקת הריון תרופתית נחשבת להליך בטוח מאוד, פחות מ-1% מהמקרים נדרשים לפניה דחופה למיו והתערבות רפואית דחופה. עם זאת, קיימים מצבים נדירים המחייבים הערכה רפואית דחופה. הסיכונים העיקריים כוללים דימום מאסיבי שאינו פוסק (העשוי להוביל לאנמיה או לצורך בעירוי דם) וזיהום בחלל הרחם. זיהוי מוקדם של דגלים אדומים קליניים, כגון חום מעל 38.5 מעלות, הקאות בלתי פוסקות, סחרחורת קשה או כאב שאינו מגיב כלל לתרופות, הוא קריטי למתן טיפול רפואי מהיר למניעת סיבוכים ארוכי טווח.

שאלה: איזה סימפטומים דורשים פנייה מיידית?

תשובה: יש לפנות מיידית במקרים של חום מעל 38.5 מעלות שאינו מגיב לטיפול תרופתי, דימום כבד ביותר (החלפת פד ספוג מעל פעם בשעתיים), חולשה משמעותית המפריעה לתפקוד, הקאות בלתי פוסקות, סחרחורת משמעותית, קושי בנשימה, כאבי בטן שאינם מגיבים למשככי כאב או איבוד הכרה.

תגיות: סימפטומים, מיון, חירום

שאלה: מהם דגלי האזהרה הרפואיים במצריכים פניה מיידית לבדיקה רפואית?

דגלי אזהרה רפואיים (סימפטומים חריגים המחייבים התערבות מיידית):

1. דימום מוגבר במיוחד (יותר משתי תחבושות גדולות בשעה)
2. חום מעל 38°C שאינו יורד תחת טיפול באקמול/אופטלגין/נורופן/אדוויל או כל משכך כאבים אחר
3. כאב חריג/בלתי נסבל שאינו משתפר במשככי כאבים רגילים
4. חולשה משמעותית, עילפון, סחרחורת ונפילה
5. הפרשה נרתיקית חריגה מאוד – ריח חריג, כמות גדולה/צבע יוצא דופן
6. סימני זיהום (חום, צמרמורות, דימום מוגבר, הפרשה חריגה)
7. המשך סימני הריון לאחר טיפול תרופתי
8. אין דימום בכלל יותר משבוע אחרי הטיפול

תגיות: דגלי אזהרה, הפניה למיון, חום, הפרשות, דימום מוגבר

שאלה: יש לי חום מעל 38 מעלות שנמשך מעל יומיים, או חום מעל 39 מעלות. מה לעשות?

תשובה: המצב שאת מתארת מצריך בדיקה דחופה. יש לגשת במידי לבדיקת רופא נשים זמין או למיון נשים בבית החולים וולפסון (טלפון: 03-5028318, זמין 24/7).

תגיות: חום, דגל אדום, מיון נשים, דחוף

שאלה: אני חווה דימום מוגבר במיוחד (יותר משתי תחבושות גדולות בשעה). מה לעשות?

תשובה: המצב שאת מתארת מצריך בדיקה דחופה. דימום כבד כזה דורש הערכה רפואית מיידית במיון נשים (טלפון: 03-5028318).

תגיות: דימום מוגבר, דגל אדום, מיון נשים, דחוף

שאלה: יש לי חום מעל 38°C שלא יורד גם אחרי שלקחתי משככי כאבים (אקמול/אופטלגין/נורופן). מה לעשות?

תשובה: המצב שאת מתארת מצריך בדיקה דחופה. חום שאינו מגיב לטיפול דורש שלילת זיהום במיון נשים באופן מיידי (טלפון: 03-5028318).

תגיות: חום, משככי כאבים, דגל אדום, מיון נשים

שאלה: אני מרגישה כאב חריג או בלתי נסבל שלא משתפר עם משככי כאבים רגילים. מה לעשות?

תשובה: המצב שאת מתארת מצריך בדיקה דחופה. יש לגשת במייד לבדיקת רופא נשים במיון (טלפון: 03-5028318).

תגיות: כאב עז, דגל אדום, מיון נשים, דחוף

שאלה: יש לי הפרשה נרתיקית חריגה מאוד (ריח רע, כמות גדולה או צבע מוזר). מה לעשות?

תשובה: המצב שאת מתארת עשוי להעיד על זיהום ומצריך בדיקה דחופה. יש לגשת במייד לבדיקת רופא נשים זמין במיון (טלפון: 03-5028318).

תגיות: הפרשה חריגה, ריח רע, דגל אדום, מיון נשים

שאלה: אני חווה חולשה משמעותית, עילפון, סחרחורת או נפילה. מה לעשות?

תשובה: המצב שאת מתארת מצריך בדיקה דחופה עקב חשש לאובדן דם משמעותי או תגובה המודינמית. יש לגשת במייד למיון נשים (טלפון: 03-5028318).

תגיות: עילפון, סחרחורת, חולשה, דגל אדום, מיון נשים

שאלה: אני חווה קוצר נשימה או קושי בדיבור. מה לעשות?

תשובה: המצב שאת מתארת מחייב בדיקה רפואית דחופה ביותר. יש לגשת במייד למיון (טלפון: 03-5028318).

תגיות: קוצר נשימה, דגל אדום, מיון, דחוף

שאלה: מהם סימני הזיהום שדורשים פנייה למיון?

תשובה: שילוב של חום, צמרמורות, דימום מוגבר והפרשה חריגה מהווים דגל אדום. במקרה כזה יש לגשת במייד לבדיקת רופא נשים במיון (טלפון: 03-5028318).

תגיות: זיהום, חום, צמרמורות, דגל אדום

9. טריאז' רפואי: דגלים כתומים (בדיקה בהקדם)

דגלים כתומים מעידים על מצבים שאינם מהווים סכנת חיים מיידית אך מצריכים בירור רפואי בטווח של עד 3 ימים. מקרים אלו כוללים לרוב חשד לכישלון הטיפול התרופתי או חריגות בבדיקות מעבדה.

שאלה: אין לי דימום בכלל יותר משבוע אחרי הטיפול התרופתי. מה לעשות?

תשובה: המצב שאת מתארת (דגל כתום) עשוי להעיד על כישלון הטיפול התרופתי. מומלץ לפנות לבדיקת רופא נשים בימים הקרובים (תוך 3 ימים) לצורך הערכה ואולטראסאונד.

תגיות: חוסר דימום, דגל כתום, כישלון טיפול

שאלה: אני עדיין חווה סימני הריון (כמו בחילות או רגישות בחזה) אחרי הטיפול התרופתי. מה לעשות?

תשובה: המשך סימני הריון (דגל כתום) עשוי להעיד על כך שההריון עדיין ויאבילי או שהטיפול לא הושלם. מומלץ לפנות לבדיקת רופא נשים בהקדם (עד 3 ימים).

תגיות: סימני הריון, בחילות, דגל כתום, כישלון טיפול

שאלה: קיבלתי תוצאה חריגה בבדיקת מעבדה. למי לפנות?

תשובה: חריגה בבדיקת מעבדה (דגל כתום) דורשת התייחסות של רופא. יש להפנות את השאלה לרופא הנשים שלך או לרופא שתפגשי בביקור הראשון טרם המשך הטיפול.

תגיות: בדיקות מעבדה, דגל כתום, רופא נשים

10. רקע רפואי ומצבים מיוחדים

לפני תחילת הליך של הפסקת הריון, חיוני לשקלל את ההיסטוריה הרפואית שלך. מחלות כרוניות, הפרעות קרישה או מיקומים חריגים של ההריון (כמו בצלקת ניתוחית) משפיעים על בחירת שיטת הטיפול ורמת המעקב הנדרשת.

שאלה: יש לי רקע רפואי מיוחד (מחלה כרונית, הפרעות קרישה, טיפול במדללי דם או אירוע מוחי בעבר). האם זה משפיע על הטיפול?

תשובה: כן, רקע רפואי מורכב מחייב התאמה אישית של הטיפול. עלייך להפנות את המידע לרופא הנשים שלך או לרופא המטפל בביקור הראשון בבית החולים טרם התחלת התהליך. ניתן ליצור קשר עם מזכירות המרפאה לתיאום: 03-5028490.

תגיות: רקע רפואי, הפרעות קרישה, מחלות כרוניות, בטיחות

שאלה: מה המשמעות של הריון חוץ רחמי או הריון בצלקת ניתוח קיסרי?

תשובה: מצבים אלו הם מצבי חירום רפואיים שאינם מטופלים בהפסקת הריון רגילה. במידה ואובחנת עם הריון חוץ רחמי או הריון בצלקת, יש לגשת במייד לבדיקת רופא נשים במיון (טלפון: 03-5028318).

תגיות: הריון חוץ רחמי, הריון בצלקת, דגל אדום, מיון

11. הנחיות כלליות ואורח חיים

ניהול נכון של הימים שאחרי הטיפול קריטי להחלמה, להתאוששות פיזית ולמניעת סיבוכים. ישנן מספר המלצות שיש להקפיד עליהן בתקופת ההליך עד לביקורת תקינה

- יש להמנע מטבילה מאמבטיה, ים, בריכה ומקווה עד להשלמת כל התהליך וביקורת תקינה
- יש להמנע מקיום יחסים עד להשלמת התהליך וביקורת תקינה, זאת על מנת למנוע זיהומים ולמנוע אפשרות להריון חדש אשר יפריע להערכת הצלחת התהליך.
- מומלץ שלא לנהוג ב-24 השעות לאחר נטילת ציטוטק
- יש להמנע מעישון סיגריות, שתיית אלכוהול וצריכה סמים
- ניתן לחזור לפעילות גופנית שגרתית כ-3-4 ימים לאחר נטילת הציטוטק ובמידה ואת מרגישה טוב ללא חולשה משמעותית או סחרחורות.
- אין מניעה מהנקה לאורך כל תהליך הפסקת הריון.
-

שאלה: האם עלי להודיע לרופא הנשים שלי?

תשובה: כן. חשוב שלרופא המטפל שלך יהיה תיעוד רפואי מלא להמשך המעקב השגרתי והמלצות לעתיד.

תגיות: רופא נשים, תיעוד רפואי

שאלה: האם עישון משפיע על היעילות?

תשובה: עישון אינו מונע מהתרופות לעבוד ואינו משפיע על הצלחת התהליך, אך הוא מעלה פגיעה בכלי דם ועלול להאט את קצב ההחלמה של הגוף ולעלות את שיעור הסיבוכים.

תגיות: עישון, סיבוכים

שאלה: האם מותר לטוס?

תשובה: מומלץ להמתין עד לאחר הביקורת או לפחות עד לאחר שהדימום הכבד ביותר יחלוף (לרוב 3-5 ימים לאחר נטילת הציטוטק) כדי לוודא שאת נמצאת בקרבת מענה רפואי אם יתעורר צורך.

תגיות: טיסה, החלמה

שאלה: האם מותר לעשות אמבטיות? להכנס לבריכה או לים?

תשובה: כדי למנוע זיהום בזמן שצוואר הרחם עדיין מעט פתוח, יש להימנע מאמבטיות, בריכות ורחצה בים למשך כשבועיים או עד הביקורת. מקלחת רגילה מותרת ואף מומלצת.

תגיות: מקווה, זיהום, אמבטיה

שאלה: מתי אפשר לטבול במקווה?

תשובה: כדי למנוע זיהום בזמן שצוואר הרחם עדיין מעט פתוח יש להמנע מטבילה במקווה עד לאחר הוסת הראשונה לאחר ההליך.

שאלה: האם ניתן לנהוג במהלך הטיפול התרופתי?

תשובה: מומלץ להימנע מנהיגה ב-24 השעות לאחר נטילת הציטוטק בשל סכנת סחרחורות או כאבים עזים.

תגיות: נהיגה, בטיחות

שאלה: מתי ניתן לנסות להרות שוב?

תשובה: רפואית, ניתן לנסות שוב לאחר הגעת מחזור וסת תקין אחד ולאחר ביקורת תקינה בה הודגם בסונר חלל רחם ללא שארית.

תגיות: הריון עתידי, החלמה, ביקורת

שאלה: מתי אפשר לחזור לפעילות רגילה?

תשובה: לרוב תוך 3-4 ימים מהציטוטק, עם סיום הדימום ותחושת הטבה. ניתן לחזור לספורט אם מרגישים טוב וללא סחרחורות.

תגיות: פעילות רגילה, ספורט, החלמה

שאלה: מה אם בזמן פעילות גופנית קלה אני שמה לב שהדימום מתגבר? האם זה נורמלי?

תשובה: התגברות דימום עקב מאמץ או שינוי תנוחה היא תופעה תקינה. עם זאת, אם מופיע דימום מוגבר מאוד, המצריך החלפת פד ספיג אחת לשעתיים, יש להיבדק מייד.

תגיות: דימום, פעילות גופנית, מאמץ

שאלה: מתי אפשר לחזור לקיים יחסי מין?

תשובה: מומלץ להמתין עד לאחר ביקורת תקינה. יש להקפיד על אמצעי מניעה שכן ניתן להרות שוב עוד לפני הביקורת. במקרה של קיום יחסים טרם הביקורת, במהלך הביקורת הרופא לא יוכל להבחין בין הריון חדש צעיר לבין כישלון הטיפול התרופתי.

תגיות: יחסי מין, אמצעי מניעה

שאלה: האם מותר לשתות אלכוהול או לצרוך קנאביס במהלך הטיפול?

תשובה: מומלץ להימנע משימוש בסמים ואלכוהול עד להשלמת כל התהליך וביקורת תקינה.

תגיות: אלכוהול, קנאביס

שאלה: אני מניקה, האם ניתן להמשיך להניק?

תשובה: כן, ניתן להמשיך בהנקה שכן התרופות אינן עוברות לתינוק דרך חלב האם.

תגיות: הנקה, תרופות

12. מעקב וביקורת

הביקורת הרפואית המתבצעת במרפאה וכוללת אולטרסאונד היא שלב הכרחי שאין לוותר עליו, גם אם את מרגישה מצוין. מטרתה לוודא שחלל הרחם נקי לחלוטין משאריות הריון, שכן שארית שנותרת עלולה לגרום לזיהום, דימום מאוחר ופגיעה בפוריות עתידית. לעיתים נדרשת בדיקה נוספת לאחר הווסת הראשונה כדי לאשר סופית שהרחם התנקה. במידה ובביקורת תמצא שארית תוכן הריוני בחלל הרחם הרופא לרוב ימליץ על המשך ההליך בפעולה ניתוחית.

שאלה: האם אפשר לבצע את המעקב בבית?

תשובה: לא. ביקורת קלינית, הכוללת לרוב אולטרסאונד, היא חיונית כדי לוודא שהרחם נקי ואין "שארית" שעלולה לגרום לזיהום או לדימום מאוחר ולאפשרות לפגיעה בפיריון עתידי.

תגיות: ביקורת, מעקב

שאלה: האם הביקורת יכולה להתבצע בבית החולים הקרוב לביתי?

תשובה: ההמלצה היא לבצע את הביקורת במקום הטיפול, אך ניתן לבצע בכל מרפאת נשים, במוקדי הקופה או במיון עם הפניה מתאימה במידה ולרופא יש אולטרסאונד והוא מנוסה בזיהוי תוצאות הטיפול התרופתי.

תגיות: ביקורת, קופת חולים

שאלה: אם אני מרגישה טוב, האם אפשר לבטל את התור?

תשובה: לא. חובה להגיע לביקורת. גם אם את מרגישה מצוין והדימום פסק, רק אולטרסאונד ורופא נשים יכול לאשר שההליך הסתיים ואין שארית.

תגיות: ביקורת, מעקב, חובה

שאלה: מה להביא לביקורת?

תשובה: יש להגיע לביקורת עם מכתב הסיכום מהביקור הקודם. במידה ונעשו בדיקות נוספות במהלך התהליך יש להביא גם את תוצאותיהן לביקורת.

תגיות: ביקורת, סיכום רפואי

שאלה: מה לעשות במידה ופספסתי את הביקורת?

תשובה: יש ליצור קשר עם המרפאה ולתאם תור חדש בהקדם, ולשים לב לסימפטומים חריגים בינתיים.

תגיות: ביקורת, פספוס

שאלה: האם יש סימנים גופניים לכך שהרחם התרוקן?

תשובה: סימן עיקרי הוא הפסקת הדימום הכבד ושיפור בהרגשה הכללית, אך הדרך היחידה לוודא זאת בוודאות היא אולטרסאונד.

תגיות: סימני הצלחה, ריקון רחם

שאלה: למה אני צריכה ללכת לרופא נשים שלי לאחר הוסת?

תשובה: לעיתים נותרת שארית קטנה שלא זוהתה קודם, והבדיקה המיטבית לזיהוי כזה נעשית מיד בסיום הווסת. במידה ובמהלך הביקורת יודגם בסונר חשד נמוך לשארית תונחי לפנות לרופא הנשים שלך לביקורת לאחר הוסת.

תגיות: שארית, ביקורת

שאלה: מהי שארית? מה עושים אם יש שארית?

תשובה: שארית היא רקמה הריונית שנותרה ברחם ומצריכה טיפול נוסף (תרופתי או כירורגי כמו גרידה/היסטרוסקופיה) לפי המלצת הרופא.

תגיות: שארית, גרידה, ציטוטק

13. טיפול והכנות - פרוצדורה כירורגית

במידה והטיפול התרופתי לא צלח או שישנה שארית משמעותית, מבוצעת גרידה (D&C). הפעולה נעשית תחת הרדמה כללית ומצריכה צום מלא של 8 שעות (אוכל ומים) ומלווה צמוד. מדובר בהליך בטוח ושגרתי בחדר ניתוח המאפשר ריקון מיידי של הרחם וחזרה מהירה לשגרה.

שאלה: במידה וההפלה התרופתית לא הצליחה - האם הגרידה מתבצעת באותו היום?

תשובה: בדרך כלל לא. אם באולטרסאונד הביקורת נראה שהתהליך לא הושלם, עוד במרפאה נקבע לך תור לגרידה (D&C) למועד מאוחר יותר. במקרים בודדים תהיה אפשרות לבצע את הגרידה עוד באותו היום.

במידה ותהיי בצום של 8 שעות. אם מדובר במקרה חירום של דימום פעיל וחזק מאוד, חום גבוה או אירועי איבוד הכרה אז תופני לאשפוז לביצוע גרידה דחופה.

תגיות: גרידה, כירורגי, דחיפות

שאלה: האם יש צורך בבדיקות דם?

תשובה: כן. חובה לוודא את סוג הדם שלך, את רמת ההמוגלובין וכמות הטסיות שלך. במידה וההמוגלובין שלך נמוך מ-9 או רמת הטסיות מתחת ל 100,000 לא תוכלי לקבל טיפול תרופתי להפסקת הריון ויתואם לך מועד להפסקת הריון ניתוחית בגרידה. בערכים נמוכים מאלה, על פי שיקול דעת הרופא, ייתכן ותופני לאשפוז במחלקת נשים לצורך קבלת מוצרי דם סביב הפעולה הניתוחית. אם סוג הדם הוא Rh שלילי, תצטרכי לקבל זריקת אנטי-D תוך 72 שעות מההליך כדי להגן על הריונות עתידיים.

תגיות: ספירת דם, המוגלובין, Rh

14. פוריות, וסיכונים עתידיים

הפסקת הריון המבוצעת במסגרת מוסדרת נחשבת לאחד ההליכים הבטוחים והשכיחים ביותר ברפואת נשים המודרנית. מבחינה רפואית, חשוב להדגיש כי אין כל עדות מדעית לכך שהפסקת הריון תקינה (בין אם בוצעה באמצעות כדורים ובין אם בהליך כירורגי) פוגעת בפריון או מקשה על כניסה להריון בעתיד. הרחם הוא איבר בעל יכולת שיקום וריפוי יוצאת דופן; רירית הרחם מתחדשת באופן מלא מיד לאחר סיום התהליך, והגוף חוזר למעגל הורמונלי תקין תוך זמן קצר. מחקרים ארוכי טווח רחבי היקף מוכיחים כי ההליך אינו מעלה את הסיכון לסיבוכים בהריונות הבאים, כגון הריונות חוץ-רחמיים או לידות מוקדמות. כחלק מהמעטפת הרפואית שנועדה להגן על בריאותך העתידית, במידה וסוג הדם שלך הוא Rh שלילי, בעת הביקור יומלץ לך להשלים זריקת אנטי-D בתוך 72 שעות מההליך. זריקה זו חיונית למניעת היווצרות נוגדנים ובכך מבטיחה את תקינותם המלאה של הריונות עתידיים.

שאלה: האם הטיפול בטוח? האם יש פגיעה לאם או לעובר הבא?

תשובה: כן, הטיפול בטוח מאוד עד שבוע 9 ופחות מ-1% מהמקרים מצריכים פנייה דחופה למיון. אין סכנה לפגיעה בפוריות עתידית.

תגיות: סיכונים, בטיחות

שאלה: האם בעקבות הטיפול יש סכנה להריון חוץ רחמי? מה הסיכון לסיבוכים בהריונות הבאים?

תשובה: הטיפול אינו מעלה שכיחות של הריון חוץ-רחמי ואינו קשור לסיבוכים כלשהם בהריונות עתידיים.

תגיות: פוריות, הריונות עתידיים

שאלה: האם הטיפול התרופתי יכול לסכן אותי בעתיד? מבחינת פרייון, וסת או תסמונת קדם וסתית?

תשובה: לא, הטיפול בטוח ואינו משפיע לרעה על פוריות, סדירות הווסת או תסמונת קדם-וסתית.

תגיות: פוריות, מחזור, תסמונת קדם-וסתית

שאלה: האם הטיפול במפיג'ין וציטוטק מתאים גם להריון חוץ רחמי?

תשובה: לא, הטיפול מיועד להריון תוך-רחמי בלבד. במקרה של הריון חוץ-רחמי יש צורך בטיפול אחר ופנייה מיידית לרופא.

תגיות: הריון חוץ-רחמי, דגל אדום

שאלה: מתי הגוף מפסיק להיות בתהליך?

תשובה: התהליך מושלם לחלוטין לאחר הווסת הראשונה, המעידה על חזרה לפעילות הורמונלית שגרתית.

תגיות: סיום התהליך, וסת

שאלה: מה יקרה אם אבחר להמשיך את ההריון אחרי טיפול כושל?

תשובה: קיים סיכון מוגבר למומים בעובר, הפלה מאוחרת או לידה מוקדמת, ולכן יש לשקול הפסקת הריון באמצעים כירורגיים.

ההשפעות האופייניות לכל אחת מהתרופות:

1. מפיג'ין (mifepristone)

אין עדות ברורה לכך שמפיג'ין עצמו הוא טרטוגן משמעותי, כלומר לא ידועים מומים קבועים עקב חשיפה בלעדית לחומר זה.

2. ציטוטק (misoprostol)

ציטוטק הוא חומר טרטוגני, וידוע ששימוש בו בתחילת ההריון עלול לגרום למומים מולדים נדירים אך חמורים בעובר (בעיקר מומי גפיים – limb defects – ומום נוירולוגי בשם Mobius syndrome – שיתוק פנים/עיניים, הפרעות ביצירת שרירי פנים וגפיים

תגיות: המשך הריון, מומים, סיכון לעובר, כישלון

שאלה: לקחתי מפיג'ין והתחרטתי

תשובה: לטיפול יש השלכות וסיכון למומים. אם את מעוניינת להמשיך את ההריון לאחר נטילת התרופה, יש לפנות בדחיפות לייעוץ במרכז טרטולוגי.

תגיות: מומים, סיכון לעובר, כישלון

שאלה: זאת פעם שלישית שאני עוברת הפסקת הריון, האם יש בכך סיכונים מצטברים?

תשובה: מבחינה רפואית, אין מניעה לעבור יותר מהפסקת הריון אחת, והדבר אינו הופך את התהליך למסוכן יותר או פוגע בסיכויים להרות בעתיד. מחקרים רפואיים מראים כי הפסקות הריון חוזרות, ובמיוחד אלו המבוצעות בשיטה התרופתית שאינה פולשנית, אינן גורמות לנזק מצטבר לרחם ואינן מעלות את הסיכון לסיבוכים בהריונות הבאים (כמו לידות מוקדמות או הפלות). בשיטה הניתוחית (גרידה), קיים סיכון תאורטי נמוך מאוד להיווצרות הידבקות ברחם (תסמונת אשמן), אך שימוש בטכניקות שאיבה מודרניות ועדינות ממזער סיכון זה למינימום. הדבר החשוב ביותר הוא שההליך מבוצע תחת פיקוח רפואי המונע זיהומים, שהם הגורם העיקרי לסיבוכי פוריות. לאחר סיום התהליך, כדאי לנצל את המפגש עם הרופא/ה כדי להתאים אמצעי מניעה יעיל שיסייע לך להימנע מהצורך בהליך נוסף בעתיד.

תגיות: הפסקות הריון חוזרות, סיכונים, פוריות עתידית, בטיחות ההליך.

15. אמצעי מניעה

המחזור הטבעי ואיתו הביוץ לעיתים מתרחש תוך 10-14 ימים בלבד, ולכן התאמת אמצעי מניעה יעיל מיד לאחר ההליך היא קריטית למניעה חוזרת של הריון לא רצוי. ניתן להתחיל להשתמש בגלולות, מדבקות או טבעת כבר ביום הביקורת או לחילופים להצטייד במרשם להתקן תוך רחמי ולקבל הסבר על אמצעי המניעה השונים מהרופא בביקורת. חשוב לדעת שגלולות או כל אמצעי מניעה הורמונלי אינו פוגע בפוריות או גורם להשמנה, ויעילותן של הגלולות וההתקן התוך רחמי גבוהה משמעותית ממשגל נסוג או מגלולת "היום שאחרי".

שאלה: מתי אפשר להתחיל ליטול אמצעי מניעה? מתי מומלץ להתחיל אמצעי מניעה?

תשובה: ניתן ומומלץ להתחיל אמצעי מניעה מיד לאחר ההליך, יש להתייעץ עם רופא נשים לצורך התאמת אמצעי מניעה. ניתן להתייעץ גם עם הרופא שתפגשי במהלך הביקורת ולקבל מרשם במידת הצורך עוד במהלך הביקורת.

תגיות: אמצעי מניעה, גלולות

שאלה: מהם אמצעי המניעה הנפוצים?

תשובה: קונדום, גלולות משולבות, טבעת וגינאלית, מדבקה, גלולות פרוגסטרון (mini pill) והתקן תוך רחמי (הורמונלי או נחושת). לכל אחד יתרונות שונים; התקן הורמונלי נחשב לאמצעי המניעה היעיל ביותר. קונדום: יעיל נגד הריון ומחלות. ניתן לרכישה ללא מרשם.

גלולה: אמצעי הורמונלי יעיל מאוד הדורש נטילה יומית ומרשם רופא. גלולה למניעת הריון אינה מונעת מחלות מין. שימי לב גלולות אינן גורמות להשמנה, אינן פוגעות בפוריות עתידית, ויכולות לשפר את מצב העור מבחינת אקנה ושיעור. יעילותן במניעת הריון היא 99.9%.

זכרי: גלולת "היום שאחרי" אינה במקום אמצעי מניעה קבוע! יעילותה משמעותית יותר נמוכה מכל אמצעי המניעה שהוזכרו.

"משגל נסוג" אינו בטוח ועילותו במניעת הריון היא נמוכה מאוד.

תגיות: אמצעי מניעה, קונדום, גלולות, גלולת היום שאחרי.

שאלה: אפשר הסבר קצר על אמצעי המניעה השונים?

תשובה: קונדום - אמצעי מניעה יעיל, מספק הגנה סבירה גם מפני הריון ואמצעי המניעה היחיד שמספק הגנה מפני מחלות המועברות במגע מיני. ניתן לרכוש קונדום בבית המרקחת ללא מרשם רופא.

גלולה משולבות למניעת הריון - אמצעי מניעה הורמונאלי יעיל יותר למניעת הריון מקונדום, אם נוטלים את הגלולה כמו שצריך, בכל יום. חשוב לדעת, כי הגלולה אינה מונעת הדבקות במחלות מין. אמצעי המניעה ההורמונאליים מחייבים התאמה אישית על ידי רופא/ת נשים וניתנים לרכישה רק עם מרשם של רופא.

טבעת וגינאלית - אמצעי מניעה הורמונלי בעל יעילות כשל גלולה למניעת הריון. אופן הלקיחה היא השמה של טבעת בנרתיק והחלפה שלה אחת ל 3 שבועות. יתרונות הטבעת אל מול הגלולה הם שאין צורך לזכור ליטול גלולה כל יום ולעיתים ישנן פחות תופעות לוואי מאחר והספיגה של ההורמונים מתבצעת דרך הנרתיק.

מדבקה למניעת הריון - אמצעי מניעה הורמונלי בעל יעילות כשל גלולה למניעת הריון. אופן הלקיחה היא הדבקה המדבקה ביום הראשון של המחזור החודשי והחלפה אחת לשבוע עם הפסקה של שבוע לאחר 3 שבועות.

גלולות פרוגסטרון למניעת הריון, mini pill - גלולה למניעת הריון עם יעילות פחותה משל הגלולות המשולבות אך מתאימה לנשים אשר אסור להן ליטול גלולות המכילות אסטרוגן כדוגמת נשים מניקות או נשים עם קרישיות יתר ועוד. בגלולות אלו חשוב מאוד להקפיד על שעת הנטילה אחרת היעילות נפגעת וצפויים דימומים בין וסתיים.

התקן תוך רחמי - אמצעי המניעה היעיל ביותר ללא תלות באופן הנטילה, מספק הגנה מהריון למשך עד 5 שנים. ישנם שני סוגים של התקן תוך רחמי, התקן הורמונלי המפריש את ההורמון פרוגסטרון באופן מקומי לרחם או התקן נחושת שהינו פחות יעיל מהתקן הורמונלי אך מספק הגנה מהריון ללא השפעות הורמונליות. הכנסת ההתקן התוך רחמי מתבצעת אצל רופא הנשים שלך, מאחר ומדובר בחוויה שיכולה להיות לא נעימה מומלץ להתייעץ עם הרופא שלך על שיכון כאב טרם ההשמה. התקן תוך רחמי מתאים לנשים בכל גיל לאחר

התחלת קיום יחסי מין ללא קשר ללידות. חשוב לדעת, התקן תוך רחמי אינו מגן מפני מחלות העוברות במגע מיני.

תגיות: אמצעי מניעה, גלולות, התקן, טכעת, קונדום, מחלות מין

שאלה: האם גם נערות יכולות לגבי אמצעי מניעה מהמרפאה?

ככלל, אין מניעה חוקית למתן גלולות לנערות ללא ידיעת ההורים, אלא אם המטפל בנערה סבור כי היא אינה מסוגלת להבין את מצבה ואת משמעות קבלת אמצעי המניעה.

תגיות: אמצעי מניעה, נערות

16. השוואת שיטות וסיכומים

הבחירה בין השיטה התרופתית לכירורגית תלויה בגיל ההריון ובהעדפה האישית. השיטה התרופתית מאפשרת תהליך פרטי בבית אך נמשכת זמן רב יותר, בעוד שהשיטה הכירורגית מהירה ומסתיימת בפעולה אחת. שתי השיטות יעילות מאוד ובטוחות בניהול רפואי נכון.

שאלה: מהן יתרונות הטיפול התרופתי?

תשובה: הטיפול התרופתי הניתן עד שבוע 9 הוא יעיל מאוד ויתרונות הם הימנעות מפעולה פולשנית והרדמה כללית, אפשרות לביצוע בבית בסביבה פרטית, וללא השפעה על פוריות עתידית.

תגיות: יתרונות, יעילות, ללא ניתוח, בבית

שאלה: מה החסרונות של הטיפול התרופתי?

תשובה: מדובר בהליך ממושך היכול להימשך מספר שבועות ולכלול מספר ביקורים במרפאה ואצל רופא נשים, הוא כולל כאב ודימום משמעותיים למשך מספר ימים. וכן קיים סיכון לכישלון או שארית המצריכים התערבות ניתוחית.

תגיות: חיסרונות, כישלון, שארית, התערבות ניתוחית

שאלה: מה הסיכון שאצטרך התערבות ניתוחית לאחר הטיפול?

תשובה: בהפסקת הריון יזומה הסיכון לשארית מצריכת ניתוח הוא כ- 2-5%

תגיות: כישלון, שארית, התערבות ניתוחית

שאלה: האם ניתן לצפות מראש אם יהיה צורך בטיפול נוסף?

תשובה: לא, כל אישה מגיבה אחרת לטיפול ואין דרך לנבא את התגובה מראש.

תגיות: טיפול נוסף, חיזוי, תגובה

17. תמיכה רגשית ובריאות הנפש

הפסקת הריון מלווה לעיתים קרובות בתנודות רגשיות הנובעות משילוב של צניחה הורמונלית ותהליך אישי מורכב. רגשות של עצב, הקלה, אשמה או בלבול הם טבעיים ולגיטימיים. חשוב לתת לעצמך זמן לעבד את החוויה ולהיעזר בתמיכה מהסביבה או מהצוות הסוציאלי במידת הצורך.

שאלה: האם יש תמיכה נפשית בוולפסון?

תשובה: כן, בבית חולים וולפסון (כמו ברוב בתי החולים) ישנן עובדות סוציאליות וצוותים שניתן להיעזר בהם לתמיכה רגשית.

תגיות: תמיכה נפשית, וולפסון

שאלה: זה נורמלי שאני מרגישה כל כך עצובה ובוכה הרבה אחרי ההפלה?

תשובה: כן, זה טבעי להרגיש עצב עמוק אחרי הפסקת הריון. הרבה נשים בוכות ומרגישות דכדוך בתקופה הזאת גם כאשר מדובר בהפסקת הריון יזומה. בדרך כלל העצב החזק נחלש בהדרגה ככל שעובר הזמן.

תגיות: עצב, בכי, אבל

שאלה: אני מרגישה רגשות אשם ומתחרטת על ההחלטה. האם התחושות האלה רגילות?

תשובה: תחושות אשמה וחרטה נפוצות מאוד אחרי הפסקת הריון, אפילו אם היית משוכנעת שזה הצעד הנכון. לגמרי נורמלי להרגיש אשמה או לתהות אם עשית נכון, והרבה נשים מזדהות עם זה. עם הזמן, רוב הנשים לומדות לקבל את ההחלטה שלהן והרגשות הקשים נרגעים.

תגיות: אשמה, חרטה, החלטה

שאלה: אף אחד לא יודע על ההפלה שלי ואני מרגישה מאוד לבד. זה נורמלי להרגיש ככה?

תשובה: בהחלט מובן להרגיש בידדות כשאת שומרת דבר כזה לעצמך. נשים רבות לא משתפות ומרגישות שאף אחד לא יכול להבין אותן. את לא היחידה שמרגישה לבד במצב הזה. את יכולה לנסות לפנות לחברה קרובה או קרובת משפחה ולשתף. תראי שבמהרה תמצאי עוד נשים שעברו אותו הדבר.

תגיות: בידדות, תמיכה, סודיות

שאלה: אני דואגת שההפלה פגעה לי בסיכוי להרות בעתיד. האם זה חשש נפוץ?

תשובה: כן, חשש לגבי פוריות עתידית אחרי הפסקת הריון הוא נפוץ מאוד. הרבה נשים דואגות כמוך, אבל הפסקת הריון תרופתית לא פוגעת ביכולת שלהן להיכנס להריון בעתיד. הגוף מתאושש די מהר, ואין השפעה ארוכת טווח על הפוריות.

תגיות: חרדה, פוריות, עתיד

שאלה: אני כועסת – למה דווקא לי זה קרה – ואני אפילו מקנאה בנשים בהריון. זה נורמלי לכעוס ככה?

תשובה: כן, תחושות של כעס ואפילו קנאה הן טבעיות במצב כזה. הרבה נשים מרגישות תסכול ושאלות "למה זה קרה דווקא לי". זה חלק מההתמודדות עם האובדן, ובדרך כלל הכעס שוכך ככל שעובר הזמן.

תגיות: כעס, קנאה, תסכול

שאלה: אני פשוט לא מרגישה כלום מאז ההפלה. זה בסדר?

תשובה: תחושת קהות או חוסר רגש אחרי אירוע כזה היא לא נדירה. לפעמים הגוף והנפש נכנסים למין מצב "הגנה" טבעי, ולא מרגישים כמעט כלום בהתחלה – זו דרך של הגוף להגן עלייך מהכאב. בדרך כלל, אחרי שעובר קצת זמן, הרגשות חוזרים. במידה ותחושה זו לא חולפת לאחר מספר שבועות מומלץ לשוחח על כך עם איש מקצוע.

תגיות: קהות רגשית, ניתוק, הגנה

שאלה: האמת שאני בעיקר מרגישה הקלה שזה מאחוריי, וכמעט לא עצובה. זה נורמלי?

תשובה: בהחלט. לא כל אחת מרגישה עצב עמוק, ויש נשים שהתחושה העיקרית שלהן אחרי הפסקת הריון היא דווקא הקלה. זה לא אומר שמהשווה לא בסדר אצלך – זה פשוט אומר שזו הייתה כנראה ההחלטה הנכונה עבורך. כל אישה מגיבה אחרת.

תגיות: הקלה, רגשות מעורבים, לגיטימי

שאלה: אין לי כמעט שינה מאז ההפלה. זה יעבור לי מתישהו?

תשובה: קושי לישון אחרי חוויה מטלטלת הוא תופעה ידועה. הרבה נשים מדווחות שבימים שאחרי הפסקת הריון הן מתקשות להירדם. לרוב, ככל שהזמן עובר והנפש נרגעת, גם השינה חוזרת לעצמה. במידה ותחושה זו לא חולפת מומלץ לשוחח עם איש מקצוע.

תגיות: קשיי שינה, נדודי שינה

שאלה: יום אחד אני מרגישה בסדר, ולמחרת שוב עצובה וכועסת. זה נורמלי שהרגשות באים והולכים ככה?

תשובה: כן, זה לגמרי רגיל. אחרי הפסקת הריון, הרגשות יכולים להתנדנד – יום אחד את מרגישה יציבה ויום אחר עולה שוב גל של עצב. תהליך ההחלמה הרגשית הוא לא קווי, והתחושות מגיעות והולכות בגלים.

תגיות: מצבי רוח, תנודתיות, החלמה

שאלה: אני מרגישה שאני לעולם לא אחזור לעצמי. מתי כבר ארגיש יותר טוב?

תשובה: זה טבעי לחשוב ככה בהתחלה, אבל התחושות הקשות לרוב לא נמשכות לנצח. קשה להגיד בדיוק מתי תרגישי טוב יותר, כי כל אחת מחלימה בקצב אחר. בדרך כלל עם חלוף השבועות, הרבה נשים מבחינות בהקלה וחוזרות להרגיש יותר כמו עצמן.

תגיות: החלמה, זמן, תקווה

שאלה: אני ובן הזוג שלי מתווכחים המון מאז ההפלה. האם זה קשור?

תשובה: כן, הפסקת הריון יכולה ליצור מתח רב במערכת היחסים. כל אחד מבני הזוג עשוי לעבד את החוויה בצורה שונה, מה שמוביל לעיתים לאי-הבנות או תחושה שבן הזוג לא תומך מספיק. זה נפוץ מאוד וחשוב לנסות לדבר על כך בפתיחות.

תגיות: זוגיות, מתח, תקשורת

שאלה: אני מרגישה בוושה גדולה, כאילו עשיתי משהו לא בסדר. זה נורמלי?

תשובה: בוושה היא רגש נפוץ מאוד, במיוחד בגלל הסטיגמה החברתית שקיימת לעיתים סביב הפסקות הריון. זכרי שזהו הליך רפואי נפוץ וזכותך לקבל החלטות על גופך ועל חיך. הבוושה לרוב נחלשת ככל שמשתפים גורמים תומכים.

תגיות: בוושה, סטיגמה, רגשות

שאלה: קשה לי מאוד לראות תינוקות או נשים בהריון כרגע. האם אני צריכה להימנע מהם?

תשובה: זוהי תגובה נורמלית לחלוטין של הגנה עצמית. נשים רבות חוות "טריגר" כשהן רואות סממנים של הריון או הורות מיד לאחר התהליך. מותר לך לקחת פסק זמן ולהימנע מסיטואציות שקשות לך כרגע עד שתרגישי חזקה יותר.

תגיות: טריגרים, הגנה עצמית, הימנעות

שאלה: אני מרגישה ריקנות גדולה בגוף ובנפש. איך ממלאים את זה?

תשובה: תחושת הריקנות היא חלק ממהליך האבל על האובדן. חשוב לתת לעצמך זמן ולא "לזרז" את המילוי מחדש. חזרה הדרגתית לפעילויות שאת אוהבת וטיפול עצמי (שינה, תזונה, מנוחה) יעזרו לתחושה הזו להתפוגג עם הזמן.

תגיות: ריקנות, אבל, טיפול עצמי

שאלה: האם זה בסדר לחזור לקיים יחסי מין אם אני עדיין מרגישה עצובה?

תשובה: מבחינה רפואית יש להמתין עד לאחר הביקורת, אך מבחינה רגשית - רק את ובן זוגך יכולים לדעת מתי זה מרגיש נכון. אין "נכון" או "לא נכון", ויש נשים שדווקא האינטימיות עוזרת להן להתנחם, בעוד אחרות זקוקות לזמן ארוך יותר.

תגיות: אינטימיות, יחסי מין, רגש

18. ביטוי מצוקה (דגלים אדומים)

בדומה לסיבוכים פיזיים, קיימים מצבי מצוקה רגשית הדורשים התייחסות מקצועית. אם חלוף הזמן לא מביא הקלה, אם ישנה פגיעה בתפקוד היומיומי, הפרעות שינה קשות או תחושת ייאוש, מומלץ לפנות לייעוץ רגשי דרך שירותי בריאות הנפש או השירות הסוציאלי כדי לקבל כלים להתמודדות וחזרה לאיזון.

שאלה: "מצב הרוח שלי לא משתפר, אני מרגישה ככה כבר הרבה זמן" / "עברו כמה שבועות ואני לא מרגישה הקלה"

תשובה: ממה שאת מתארת עולה שהקושי הרגשי נמשך ומתחיל להשפיע עליך. בשלב כזה מומלץ לפנות לעזרה מקצועית בתחום בריאות הנפש. פנייה לפסיכולוגית, עובדת סוציאלית או גורם טיפולי אחר היא צעד מקובל ונכון.

תגיות: מצוקה מתמשכת, דגל אדום

שאלה: "קשה לי לתפקד ביום-יום" / "אפילו דברים קטנים מרגישים לי בלתי אפשריים"

תשובה: ממה שאת מתארת עולה שהקושי הרגשי משפיע על התפקוד שלך. מומלץ לפנות לעזרה מקצועית בתחום בריאות הנפש כדי לקבל תמיכה שתעזור לך לחזור לשגרה.

תגיות: פגיעה בתפקוד, דגל אדום

שאלה: "אני מרגישה מוצפת כמעט כל הזמן" / "אני לא מסתדרת עם זה לבד"

תשובה: הצפה רגשית היא סימן לכך שהעומס גדול מדי כרגע. מומלץ לפנות לעזרה מקצועית דרך רופא המשפחה או שירות הסוציאלי בוולפסון כדי לקבל כלים להתמודדות.

תגיות: הצפה רגשית, דגל אדום

שאלה: "אני כמעט לא ישנה בלילה כבר הרבה זמן"

תשובה: הפרעות שינה מתמשכות הן סימן לעומס רגשי משמעותי. מומלץ לפנות לקבלת תמיכה מקצועית כדי לאפשר לגוף ולנפש לנוח ולהתאושש.

תגיות: הפרעות שינה, דגל אדום

שאלה: "אני מרגישה לבד לגמרי וחסרת תקווה"

תשובה: תחושת בדידות עמוקה או חוסר תקווה הן נורות אזהרה למצוקה. פנייה לגורם טיפולי יכולה לספק מרחב בטוח לשיתוף וקבלת תמיכה מקצועית שתעזור לך לראות את הדרך קדימה.

תגיות: בדידות, ייאוש, דגל אדום

19. מידע שימושי ואנשי קשר במרכז הרפואי וולפסון

ריכוז פרטי ההתקשרות של היחידות השונות במרכז הרפואי וולפסון מאפשר לך לקבל מענה מהיר בכל שעה. לכל צורך – החל מזימון תורים ועד למצבי חירום בלילה – קיים ערוץ תקשורת ייעודי.

שאלה: מהו מספר הטלפון של מיון נשים בוולפסון ומתי הוא פעיל?

תשובה: מיון נשים פעיל 24/7. טלפון: 03-5028318 (דחוף) או 03-5028490. כתובת: הלוחמים 62, חולון.

תגיות: מיון נשים, טלפון, וולפסון, 24/7

שאלה: איך ניתן ליצור קשר עם מרפאת הנשים (לא בשעות חירום)?

תשובה: המרפאה פעילה בימים א'-ה' בין השעות 08:00–14:30.

- טלפון: 03-5028490
- WhatsApp (הודעות בלבד): 03-5028111
- מייל: Nashimirp@wmc.gov.il
- תגיות: מרפאת נשים, וואטסאפ, שעות פעילות

שאלה: איך פונים לשירות הסוציאלי בוולפסון?

תשובה: השירות הסוציאלי פעיל בימים א'-ה' בין השעות 08:00–15:30.

- טלפון: 03-5028455
- מייל: vaadas@wmc.gov.il
- תגיות: שירות סוציאלי, עובדת סוציאלית

שאלה: איך מזמנים תור להליך או לוועדה?

תשובה: ניתן לזמן תורים בטלפון 03-5028111 או דרך האתר:
<https://www.gov.il/he/service/wolfson-book-medical-appointment>

ניתן גם לפנות לשירות הסוציאלי בוולפסון לקבלת הדרכה ועזרה.

תגיות: זימון תורים, וועדה

שאלה: כיצד ניתן לפנות לוועדה להפסקת הריון במרכז הרפואי וולפסון?

תשובה: ניתן לפנות לוועדה בשתי דרכים, וועדה פרונטלית או הליך מקוון. הליך מקוון יכול להתבצע במידה וגיל ההריון מתחת לשבוע 24.

לשם ביצוע הליך מקוון באמצעות מערכת הזיהוי הממשלתית, ללא צורך בהגעה פיזית, יש להצטייד בפרטים הבאים:

1. תעודת זהות, כאשר הסיבה להגשת הבקשה הינה הריון מחוץ לנישואים, נדרשת הצגת ספח תעודת זהות.
 2. מסמכים מבדיקת רופא/ת נשים המעידים על הריון
 3. תמונת אולטרה סאונד שעליה מופיע שם המטופלת
 4. מסמכים רפואיים אחרים (אם הסיבה לבקשת אישור הוועדה נובעת מהחשש כי הוולד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי (סעיף 3 לחוק, או משום שההריון מהווה סיכון לחיי האישה או לגרום לה נזק גופני או נפשי (סעיף 4 לחוק).
- תוצאות בדיקות דם שנלקחו במסגרת קופת חולים או מרפאה צבאית: סוג דם, ספירת דם ו-RH. בדיקות הדם אינן נדרשות לצורך קבלת אישור הוועדה, אלא לביצוע הפסקת ההריון.
- טופס 17 לוועדה (קוד L0209) או אסמכתא תקציבית מהצבא.
- חברות קופ"ח מכבי אינן נדרשות להציג טופס 17.

עבור הפונות לוועדה פרונטלית (בבית החולים):

הוועדה מתקיימת מס' פעמים בשבוע בימי ראשון, שלישי וחמישי, ומתקיימת בבניין מרפאות חוץ, קומה ראשונה.

לתיאום התור יש להתקשר בימים ראשון עד חמישי בין השעות 8-15.30 למזכירת השירות הסוציאלי בטלפון 03-5028455, שלוחה 2.

ניתן לפנות גם באמצעות המייל - מזכירות השירות הסוציאלי: vaadas@wmc.gov.il

מזכירת הוועדה תהיה אתך בקשר, ותוכלי להתייעץ עם רופא/ת הוועדה אונליין. אישור הוועדה מתקבל באופן דיגיטלי, וניתן לפנות איתו לקביעת תור לביצוע גם בבתי חולים אחרים.

תגיות: ועדה להפסקת הריון, השירות הסוציאלי וולפסון, זימון תור, מסמכים