

1. אבחנה והגדרות רפואיות

אובדן הריון מוקדם (Early Pregnancy Loss) הוא מצב שכיח המופיע בכ-15-20% מההריונות המאובחנים קלינית. השיעור עולה עם גיל האם, מכ-12% בגיל 20 לכ-80% אצל נשים בגיל 45 ומעלה. האבחנה של "הפלה נדחית" מבוססת על ממצאים אולטרסוניים חד-משמעיים המעידים על הפסקת התפתחות העובר או שק ההריון, גם במידה והמטופלת אינה חווה תסמינים חיצוניים כגון דימום או כאב. האבחנה מתבצעת על פי קריטריונים בינלאומיים קשיחים של גודל השק או אורך העובר ביחס להיעדר דופק.

קיימות שתי חלוקות של הפלות לפי גיל הריון:

- הפלה מוקדמת - עד שבוע 13
- הפלה מאוחרת - שבוע 14-20

שאלה: מהי הפלה נדחית?

תשובה: אובדן הריון מוקדם (early pregnancy loss) או הפלה נדחית (missed abortion) מוגדר כהריון לא ויאבילי בשליש הראשון. הגורם העיקרי הינו פגם גנטי נקודתית בהריון הספציפי, אשר מוביל להפסקתו בשלב מוקדם. בד"כ, הפגם הגנטי הוא ספציפי להריון הנוכחי, ואינו חוזר בהריונות הבאים.

תגיות: הפלה נדחית, אובדן הריון מוקדם, אבחנה

שאלה: כיצד מאבחנים הפלה נדחית?

תשובה: קריטריונים לאבחנה על פי אולטרסאונד:

- הדגמת קוטב עוברי עם מדידת CRL של 7 מ"מ או יותר ללא דופק.
- הדגמת שק הריון בקוטר ממוצע של 25 מ"מ או יותר ללא קוטב עוברי.
- העדר דופק עוברי שבועיים או יותר לאחר הדגמת שק הריון שלא הודגם בו שק חלמון.
- העדר דופק עוברי 11 ימים או יותר לאחר הדגמת שק הריון עם שק חלמון.
- היעדר דופק עוברי בהריון שגילו 7.0 שבועות לפחות: 3 שבועות או יותר לאחר בדיקת הריון חיובית (כמותית/ איכותית), או הריון IVF לפי חישוב גיל הריון.

תגיות: הפלה נדחית, אובדן הריון מוקדם, אבחנה

שאלה: אני בהריון ויש לי דימום

תשובה: דימום בהריון צעיר זוהי תופעה שכיחה המופיעה אצל כ-1 מ-4-5 נשים. באופן מסורתי מצב זה מוגדר כהפלה מאיימת ומהווה סיכון מוגבר להפלה. מרבית הנשים שלהן דימום בהריון צעיר בסוף יילדו במועד אך חשוב לדעת שמצב זה מעלה סיכון להפלה, לידה מוקדמת והאטה בגדילה תוך רחמית. במקרה של דימום בהריון צעיר יש לפנות לבדיקת רופא נשים. במידה ואת חשה בטוב, מדובר בדימום בכמות פחותה מפד אחת לשעתיים ואינך סובלת מכאבים עזים או חום אין צורך בבדיקה דחופה וניתן להמתין לשעות הבוקר.

תגיות: דימום בהריון, הפלה מאיימת, הפלה נדחית

שאלה: מהי הפלה מאיימת?

תשובה: כל הפרשה דמית מהלדן או דמם מהרחם המתרחשים במחצית הראשונה של ההריון נחשבו באופן מסורתי כהפלה מאיימת. דימום בטרימסטר ראשון מופיע בכ - 20-25% מהנשים. הסיכון נמוך יותר באופן משמעותי עד אחוזים בודדים כאשר מודגם דופק עוברי באולטר-ה-סאונד. כאשר ההריון נמשך, ישנו סיכון מוגבר ללידה מוקדמת, משקל לידה נמוך. גם אם הדמם מועט, הוא יכול להיות מלווה בכאבי בטן cramping או כאבי גב תחתון. בבדיקה אצל רופא הנשים צוואר הרחם ארוך וסגור ואין מעבר רקמה הריונית דרך צוואר הרחם. אין טיפול להפלה מאיימת שיעילותו מוכחת בשיפור תוצאות ההריון. לאחר בדיקת אולטראסאונד המראה הריון תוך רחמי תקין מומלצת מנוחה והימנעות מיחסי מין למספר ימים. ישנם רופאים אשר ימליצו על טיפול בפרוגסטרון אך טיפול זה לא הוכח שמשפר תוצאות הריון במקרה של דימום בהריון צעיר.

תגיות: דימום בהריון, הפלה מאיימת, דופק

שאלה: מהי הפלה בלתי נמנעת והפלה בלתי שלמה

תשובה: הפלה בלתי נמנעת והפלה בלתי שלמה הן בעלות אותו מופע קליני ומטופלות באותו אופן. הפלה בלתי נמנעת מאובחנת כאשר יש דמם רב או פקיעת קרומים ופתיחה של צוואר הרחם בנוכחות דופק עוברי. הפלה בלתי שלמה מאובחנת כאשר מופיע כל האמור לעיל ויש מעבר חלקי של רקמה דרך הצוואר. הדמם יכול להיות ניכר ואף לגרום לתסמינים כולל חולשה, סחרחורות ואיבוד הכרה. אבחנה נעשית בבדיקה לדנית וסונר. כאשר ההפלה מתרחשת בשליש הראשון של ההריון או בשליש השני, נותרים בד"כ חלקי שליה בחלל הרחם המחייבים השלמת ריקון חלל הרחם. לרוב במצב זה הרופא הבודק ימליץ על ביצוע גרידה דחופה להשלמת ריקון הרחם ומניעת סיבוכים מיידיים וארוכי טווח. תגיות: הפלה בלתי שלמה, גרידה דחופה.

שאלה: מהי הפלה שלמה?

הפלה בה כל רקמת ההריון נפלטת. במקרה זה, הדימום יחל כדימום משמעותי עם יציאת קרישי דם מרובים ועד ההגעה לרופא הדמם יפחת משמעותית. בבדיקתך הרופא יבחין כי הפה הפנימי של צוואר הרחם סגור. אין צורך בריקון הרחם במצב זה כיוון שלא נותרה שארית הריון ברחם. האבחנה נעשית על ידי אולטראסאונד ולאחר שנשללה אפשרות של הריון חוץ רחמי. מומלץ לעשות ביקורת חוזרת לאחר הוסת אצל רופא הנשים שלך לודא שאכן לא נותרה שארית תוכן הריוני ברחם. תגיות: הפלה שלמה

שאלה: אני בהריון!! מה לעשות?

MISSED ABORTION

תשובה: זה הזמן לקבוע תור לרופא הנשים שלך לצורך תחילת מעקב והמלצות המותאמות לך אישית. בכלליות יש לבצע אולטראסאונד ראשון בין שבועות 6-8, להקפיד על חומצה פולית (400 מק"ג) ולא להפסיק תרופות קבועות ללא ייעוץ רופא.

תגיות: הריון, בדיקות בהריון, תזונה בהריון, חומצה פולית.

שאלה: איך אני יודעת שאני בהריון?

תשובה: איחור במחזור הוא הסימן העיקרי, לצד בחילות, עייפות ורגישות בשדיים. ניתן לאשר זאת בבדיקת שתן ביתית החל מיום האיחור בוסת. לאחר בדיקת שתן חיובית יש לתאם אולטראסאונד אצל רופא נשים סביב שבוע 8.

תגיות: אבחון הריון טרם טיפול, וסת אחרונה

שאלה: איך אני יודעת מה שבוע ההריון שלי? באיזה חודש אני?

תשובה: את שבוע ההריון מחשבים לפי היום הראשון של הווסת האחרונה, כלומר אם אורך המחזור החודשי שלך הוא 28 ימים וביצעת את הבדיקה ביום האיחור, גיל ההריון הוא 4 שבועות. ניתן גם לקבוע את גיל ההריון באמצעות אולטראסאונד וגילולי להערכה מדויקת.

תגיות: אבחון הריון, וסת אחרונה

2. בירור רפואי והפלות חוזרות

ברוב המוחלט של המקרים, הפלה מוקדמת היא אירוע אקראי שאינו מעיד על בעיה רפואית כרונית או פגיעה בפוריות. הגוף עובר תהליך טבעי של סלקציה כאשר ישנו פגם גנטי בראשית ההריון. בירור רפואי מעמיק (בירור הפלות חוזרות) נשמר בדרך כלל למקרים של שלושה אובדני הריון רצופים, מתוך מטרה לשלול גורמים אנטומיים, הורמונליים או בעיות קרישה (תרומבופיליה).

שאלה: האם יש צורך בבירור מיוחד לאחר הפלה? איזה בירור אני צריכה לעשות כדי למנוע אירוע חוזר?

תשובה: היות שמדובר באירוע שלא נוטה לחזור על עצמו, אין המלצה לבצע בירור מיוחד לאחר הפלה נדחית. במקרה של 3 הפלות אצל אותה המטופלת, מומלץ לבצע בירור של גורמים אחרים, כגון קרישיות יתר ומומים רחמיים. מומלץ להיוועץ ברופא המטפל או לפנות למרפאה המתמחה בטיפול בהפלות חוזרות.

תגיות: הפלות חוזרות, בירור

3. שיטות טיפול והגדרת הפסקה תרופתית

ניהול של הפלה נדחית יכול להתבצע בשלוש גישות: המתנה לפליטה טבעית, טיפול תרופתי או התערבות כירורגית. בבית החולים וולפסון, הגישה התרופתית מתאפשרת עד שבוע 12 ומתבססת על ריקון הרחם ללא צורך בפעולה פולשנית או הרדמה. הבחירה בשיטה הניתוחית נעשית לרוב בשבועות מתקדמים יותר או במקרים בהם הטיפול התרופתי לא צלח.

על פי הנחיות משרד הבריאות לניהול מקרי אובדן הריון, מומלץ לבצע את ריקון חלל הרחם מוקדם ככל האפשר ועד 72 שעות ממועד גילוי אובדן ההריון. כחלק מהמענה הרפואי, מומלץ טיפול אקטיבי, המאפשר בחירה בין הליך כירורגי לבין טיפול תרופתי משולב של מפיג'ין וציטוטק.

שאלה: אילו שיטות קיימות בבית חולים וולפסון?

תשובה: קיימות שתי אפשרויות לטיפול בהפלה נדחית: תרופתית וניתוחית. השיטה התרופתית ניתנת לביצוע עד שבוע 12 להריון, על פי אולטרסאונד, וכוללת נטילת תרופות, מפיג'ין וציטוטק, המפסיקות את התמיכה של ההריון וגורמות לריקון הרחם באמצעות דימום והתכווצויות. הפסקת הריון ניתוחית נקראת גם גרידה או שאיבה. זוהי פעולה שמבוצעת בחדר ניתוח יום בהרדמה מלאה במהלכה נעשה שימוש במכשירים כירורגיים בהנחיית אולטרסאונד לרוקן את תוכן הרחם.

תגיות: שיטות טיפול, הפלה נדחית

שאלה: מהו טיפול תרופתי להפלה נדחית?

תשובה: תהליך המבוצע עד שבוע 12 להריון, על פי אולטרסאונד, כולל נטילת תרופות המפסיקות את התמיכה של ההריון וגורמות לריקון הרחם באמצעות דימום והתכווצויות.

הטיפול מבוסס על נטילת תרופה דרך הפה, מפיג'ין, הגורמת לעצירת התמיכה ההורמונלית של ההריון, ולאחר מכן נטילת כדורים דרך הנרתיק, ציטוטק, אשר גורמים לגרימת התכווצויות רחם ויציאה של תוכן ההריון, ובכך סיום ההריון.

תגיות: טיפול תרופתי, הגדרה

שאלה: מהן יתרונות הטיפול התרופתי על פני הטיפול הניתוחי?

תשובה: יתרונות הטיפול התרופתי בהפלה נדחית:

- נמנעת פעולה פולשנית בהרדמה כללית.
- תהליך שיכול להתבצע בבית, בסביבה הנוחה והפרטית שלך
- ללא השפעה על פיריון עתידי

תגיות: יתרונות, ללא השפעה, לא פולשני

שאלה: מהן חסרונות הטיפול התרופתי על פני הטיפול הניתוחי?

תשובה: חסרונות הטיפול התרופתי בהפלה נדחית:

- ב-5%-10% מהמקרים יש צורך להשלים פעולה ניתוחית.
- הטיפול דורש כמה ביקורים; יכול להימשך מספר שבועות.
- צפוי כאב ודימום משמעותי במשך מספר ימים.

תגיות: חסרונות, כישלון, ממושך

4. הביקור הראשון והכנות

הביקור הראשון במרפאה מהווה את נקודת הפתיחה המעשית של התהליך הרפואי והוא מוקדש להיכרות אישית, סקירה יסודית של ההיסטוריה הרפואית ובניית תוכנית הטיפול. במהלך מפגש זה מתבצע הליך ה"הסכמה מדעת", וניתנת המנה הראשונה של הטיפול (מפיג'ין) תחת השגחה. שלב זה חיוני לוודא היעדר התוויות-נגד (כמו אנמיה קשה) ולהעניק ביטחון למטופלת לקראת המשך התהליך בביתה. בסיום הביקור המטופלת מקבלת הנחיות להמשך הטיפול בביתה כולל כדורי ציטוטק לנטילה דרך הנרתיק כעבור 48 שעות ותור לביקורת כשבוע לאחר השלמת הטיפול בציטוטק.

שאלה: מה קורה בביקור הראשון?

תשובה: הגשת טפסים למזכירות ולקיחת מדדים ע"י האחות, מפגש עם רופא, סקירת רקע רפואי, וידוא שאין התוויות נגד, בליעת כדור מפיג'ין (mifepristone 200 mg). השגחה של 20 דקות וזיהוי של תגובה אלרגית במידה ומתפתחת.

תגיות: ביקור ראשון, תהליך

שאלה: באיזה מקרים לא ניתן לבצע טיפול תרופתי? מהן התוויות הנגד?

תשובה: במקרים הבאים הרופא ימליץ לך להימנע מהפסקת הריון תרופתי: הריון מעל שבוע 12+0 על פי אולטרסאונד, אנמיה קשה (המוגלובין < 9), הפרעות קרישה או טיפול בנוגדי קרישה, מחלת כבד פעילה, מחלה קרדיווסקולרית, אפילפסיה לא מאוזנת, אסטמה, חשד להריון חוץ-רחמי או הריון בצלקת של ניתוח קיסרי, אלרגיה לאחת התרופות שניתנות בטיפול, אי-יכולת לעמוד במעקב או הוראות טיפול.

תגיות: התוויות נגד, בטיחות

שאלה: כמה זמן נמשך הביקור? מה קורה בביקור הראשון בהרחבה?

MISSED ABORTION

תשובה: בעת הגעתך למתחם מרפאות נשים בבית החולים וולפסון תתקבלי ע"י המזכירות ולאחר הצגת טופס 17 או פיקדון, הן יפתחו לך תיק ממוחשב ויוציאו מדבקות. עם המדבקות את תתקבלי ע"י האחות שתרכז את כל המסמכים ותבצע בדיקה של לחץ דם ודופק. האחות תעביר אותך לרופאה שתעבור על המסמכים, תמלא את הפרטים במחשב, תסביר על התהליך ולאחר מענה על שאלות תחתים אותך על טפסי הסכמה לתהליך המפרטים את התהליך, הסיכונים והסיבוכים האפשריים. בסיום המפגש תקבלי כדור מפיג'ין אותו עלייך ליטול בחדר הרופאה ובנוסף תצויידי במעטפה בתוכה עוד ארבעה כדורי ציטוטק אותם יש להניח בנרתיק, בבית, כעבור 48 שעות. לאחר נטילת הכדור במרפאה תתבקשי לחכות 20 דקות בחדר ההמתנה בהן תקבעי תור לביקורת במרפאה.

תגיות: ביקור ראשון, וולפסון, משך הביקור

שאלה: מה להביא לביקור הראשון?

תשובה: מכתב הפניה מהרופא אשר מתעד את האבחנה של הפלה נדחית, כל הבדיקות אותן ביצעת במהלך ההריון כולל בדיקות אולטראסאונד ותוצאות בדיקות דם מהחודש האחרון ביניהן ספירת דם וסוג דם.

תגיות: מסמכים, הכנות, בדיקות בהריון

שאלה: איך להיערך לטיפול?

תשובה: כדאי להיערך ל-3-5 ימי מחלה בבית, להצטייד במשככי כאבים שעוזרים לך בכאבי מחזור ובפדים עבים, ולדאוג לליווי של אדם קרוב.

תגיות: היערכות, הכנות, בבית

שאלה: למה משמש סוג הדם שלי? מה המשמעות של סוג דם שלילי (RH NEG)?

תשובה: סוג הדם חשוב כדי לקבוע אם יש צורך במתן זריקת אנטי-D. במקרה שיש לך סוג דם עם RH שלילי תצטרכי לקבל זריקת אנטי-D עד 72 שעות מתחילת ההריון למניעת סיבוכים בהריונות עתידיים

תגיות: אנטי D, RH negative, סוג דם שלילי.

שאלה: האם צריך להגיע עם מלווה?

תשובה: בטיפול תרופתי מומלץ להגיע עם מלווה לתמיכה רגשית וסיוע בחזרה הביתה, מאחר וייתכנו כאבים והתכווצויות החל מחצי שעה לאחר נטילת הטיפול.

תגיות: ליווי, תמיכה

5. הטיפול התרופתי - מינונים ונהלים

הפרוטוקול התרופתי המקובל משלב שתי תרופות הפועלות בסינרגיה פיזיולוגית. התרופה הראשונה, מיפריסטון (מיפיג'ין), חוסמת את השפעת הפרוגסטרון, ההורמון החיוני להמשך ההריון, ובכך מחלישה את רירית הרחם. התרופה השנייה, מיסופרוסטול (ציטוטק), גורמת להתכווצויות רחמיות חזקות ולפתיחה של צוואר הרחם לצורך פליטת התוכן. שילוב זה הוכח כבעל אחוזי הצלחה גבוהים משמעותית משימוש בתרופה אחת בלבד.

שאלה: מה זה מפיג'ין? מה תופעות הלוואי של מפיג'ין?

תשובה: מפיג'ין (Mifepristone) הוא אנטי-פרוגסטרון החוסם את השפעת הפרוגסטרון ברחם. בכך הוא מחליש את רירית הרחם ומגביר את רגישות הרחם לפרוסטגלנדינים (ציטוטק). לאחר נטילתו ייתכנו תסמינים דמויי תחילת וסת, לעיתים דימום קל וכאבים קלים. ייתכן גם שלא תרגישי דבר לאחר נטילת המפיג'ין.

תגיות: מפיג'ין, מנגנון פעולה

שאלה: מה זה ציטוטק?

תשובה: ציטוטק (Misoprostol) הוא פרוסטגלנדין שגורם להתכווצויות רחם ופינוי פיזי של תוכן ההריון. תופעות הלוואי כוללות: דימום רב, כאבי בטן קשים (6-7 שעות ראשונות), חולשה, שלשול, בחילות, חום עד 38°C, צמרמורות.

תגיות: ציטוטק, מנגנון פעולה

שאלה: מה השלב השני? מהו הטיפול בציטוטק?

תשובה: בסיום המפגש הראשון תקבלי ארבעה כדורי ציטוטק אותם תתבקשי להניח בנרתיק (עמוק ככל שניתן), בבית, כעבור 48 שעות ממועד נטילת המפיג'ין. כדורים אלה גורמים להתכווצויות רחם וריקון תוכן ההריון. החל מחצי שעה לאחר השמת הציטוטק ייתכנו כאבי בטן חזקים, דימום משמעותי, חולשה, עליית חום קלה, צמרמורות, בחילות. לאחר הכנסת הציטוטק לנרתיק מומלץ לשכב כחצי שעה על מנת לאפשר ספיגה טובה של הכדורים ומניעת פליטתם.

תגיות: ציטוטק, שלב שני, הנחיות

שאלה: מדוע הטיפול מורכב ממפיג'ין וציטוטק?

תשובה: השילוב משפר משמעותית את היעילות לעומת שימוש בציטוטק בלבד ומפחית את שיעורי הכישלון (הצלחה של 95-98%). הוא מקטין את הסיכוי להיוותרות שארית ואת הצורך בגרידה משלימה. טיפול משולב הוא הסטנדרט הרפואי העולמי.

תגיות: יתרונות השילוב, יעילות, מפיג'ין, ציטוטק

שאלה: האם יש ליטול את הטיפול עם או בלי אוכל?

תשובה: אין חשיבות למועד נטילת התרופות. במידה ואת מרגישה בחילות טרם הטיפול מומלץ ליטול כדור נגד בחילות במרפאה על מנת למנוע הקאה של הכדורים. יש להקפיד על הפרש של 48 שעות בין המפיג'ין לציטוטק.

תגיות: מזון, בחילות, תזמון

שאלה: האם אקבל ימי מחלה?

תשובה: מומלץ על 3 ימי מנוחה מנטילת הציטוטק; יש לפנות לרופא קופ"ח לקבלת אישור תקף.

תגיות: ימי מחלה, מנוחה

שאלה: שכחתי לקחת את הציטוטק? שכחתי לקחת את הכדורים?

תשובה: ניתן ליטול עד 72 שעות מנטילת המפיג'ין, אך היעילות יורדת משמעותית. מעבר ל-72 שעות נדרשת הערכה מחודשת של רופא.

תגיות: שכחה, 48 שעות

שאלה: מה קורה אם הקאתי לאחר נטילת הכדור?

תשובה: אם הקאת בתוך פחות מ-20 דקות, צרי קשר עם המרפאה (ייתכן שתצטרכי מנה נוספת). מעל 20 דקות – סביר שהתרופה נספגה. לאחר נטילת הציטוטק אין משמעות להקאה שכן הספיגה מתבצעת דרך הנרתיק.

תגיות: הקאה, ספיגה, כדור

שאלה: אני לא מצליחה למצוא את הכדורים. איבדתי את הכדורים/ הציטוטק

תשובה: פני מייד למיון נשים לקבלת חלופיים; עיכוב עלול לפגוע בסיכויי ההצלחה.

תגיות: התרופות, אובדן

שאלה: מה לעשות אם אין מפיג'ין? מה לעשות אם אני אלרגית למפיג'ין?

תשובה: ניתן להשתמש בציטוטק בלבד, אך יש לקחת בחשבון שיעילות הטיפול יורדת מעט.

תגיות: מפיג'ין, ציטוטק

6. תופעות גופניות וזמן החלמה

תהליך ההחלמה הגופנית לאחר הפלה נדחית כרוך בשינויים הורמונליים חדים ובחזרה הדרגתית של הרחם לגודלו ומצבו הרגיל. טבעי לחוות דימומים לא סדירים שיימשכו עד שבועיים ולעיתים עד הווסת הבאה. הורמון ההריון (HCG) מתפנה מהדם באיטיות, ולכן תסמינים הריוניים עשויים להימשך גם לאחר שהרחם התרוקן.

אלה הן תופעות הלוואי של הטיפול:

- מפי'ין: תסמינים דומים לתחילת וסת, לעיתים דימום קל, כאבים קלים.
- ציטוטק: דימום רב (חזק יותר מהמחזור), כאבי בטן קשים (6-7 שעות ראשונות), חולשה, שלשול, בחילות, חום עד 38°C , צמרמורות.
- שכיחות: בחילה (43%-66%), שלשול (23%-35%), כאב ראש (13%-40%), חום/צמרמורות (32%-69%)

שאלה: אילו תופעות לוואי צפויות? מה אני ארגיש?

תשובה: התופעות השכיחות הן דימום המלווה בקרישי דם, כאבי בטן, התכווצויות, בחילות, לעיתים חום נמוך, רגישות בחזה, חולשה, גלי חום.

תגיות: תופעות לוואי, תחושות

שאלה: כמה זמן דימום נחשב תקין?

תשובה: צפוי דימום משמעותי של כ-3-4 ימים לאחר נטילת הציטוטק ולאחר מכן ייתכן דימום קל אך ממושך למשך כשבועיים ולעיתים עד לווסת. ייתכנו גם ימי הפסקה בדימום והישנות לאחר מכן.

תגיות: דימום, זמן החלמה

שאלה: מהן התופעות התקינות? מה צפוי לי שלא מצריך פניה לרופא/מיון?

תשובה: נצפה לראות קרישי דם וגושים הדומים ל"כבד", וכן כאבים חזקים והתכווצויות בבטן תחתונה (משמעותיים יותר מכאבי מחזור). למי שילדה בעבר, ניתן להשוות זאת ליממה הראשונה לאחר הלידה. תגיות: נורמליות, קרישי דם, כאב

שאלה: האם חום נמוך הוא תופעה שכיחה?

תשובה: כן, חום נמוך מופיע אצל 30%-70% מהמטופלות. במידה ומדובר בחום מעל 39 מעלות או חום שאינו מגיב להורדת חום – יש לפנות לבדיקת רופא במייד.

תגיות: חום, תופעות לוואי

שאלה: האם זה נורמלי שעדיין יש בחילות?

תשובה: בחילות הן תופעת לוואי שכיחה (43-66%). יחד עם זאת, ייתכן ומדובר בהמשך סימני הריון לאחר הטיפול, מומלץ לציין זאת בפני הרופא בעת הביקורת.

תגיות: בחילות, תסמינים הריוניים

שאלה: האם אני אראה את העובר נפלט?

תשובה: רוב הנשים אינן רואות או מבחינות בדבר מיוחד בזמן פליטת תוכן ההיריון. חלק מהנשים עשויות לראות את שק ההיריון, שצבעו לבן מעורבב בקרישי דם. אם ההיריון הוא סביב שבוע 9 ומעלה, ייתכן שניתן יהיה להבחין גם בעובר קטן. את יכולה לבחור שלא להסתכל על התחבושות, פשוט לעטוף אותן ולהשליך אותן לפח כפי שאת עושה בזמן הדימום החודשי.

תגיות: פליטת עובר, מה אני ארגיש

שאלה: מתי לעשות בדיקת הריון ביתית?

תשובה: אין צורך בביצוע בדיקת הריון ביתית לאחר השלמת התהליך, בדיקת הריון אינה מהווה סמן להצלחת או כישלון התהליך. לא לפני שחלפו 3-4 שבועות. הורמון ההיריון beta-HCG מתפנה מהגוף באיטיות והוא יכול להישאר מוגבר לאורך יותר מ-3-4 שבועות, גם לאחר הצלחת התהליך וסיומו.

תגיות: בדיקת הריון, מעקב, beta-HCG

7. ניהול כאב ומשככי כאבים

התכווצויות הרחם הנדרשות לפליטת תוכן ההיריון מלוות באופן טבעי בכאב, הנובע מהפרשת פרוסטגלנדינים. ניהול נכון של הכאב מתבסס על שימוש מושכל בתרופות נוגדות דלקת (NSAIDs), הפועלות ישירות לעיכוב מנגנון הכאב הרחמי. אין צורך לסבול כאב עז; נטילת משככים עם הופעת התסמינים הראשונים מאפשרת לעבור את התהליך בביטחון ובנוחות מרבית.

שאלה: האם מותר לקחת משככי כאבים? האם מותר לשלב ביניהם?

תשובה: כן, כל משכך כאבים שעוזר בזמן מחזור מתאים גם כאן (נורופן, אדוויל, אקמול, אופטלגין). יש להקפיד על הוראות הרוקח.

תגיות: משככי כאבים, המלצות

שאלה: האם מומלץ לקחת משככי כאבים לפני תחילת הטיפול או רק כשמופיעים הכאבים?

MISSED ABORTION

תשובה: ניתן לקחת כהכנה, אך הדבר תלוי בהעדפתך. חשוב שהם יהיו זמינים למקרה הצורך, ותמיד להקפיד על המינון.

תגיות: ניהול כאב, תזמון

שאלה: האם אני צריכה לקחת אנטיביוטיקה?

תשובה: אין צורך באנטיביוטיקה מונעת; היא תינתן רק אם יעלה חשד לזיהום לפי שיקול דעת רפואי.

תגיות: אנטיביוטיקה, זיהום, מניעה

שאלה: האם מותר להשתמש בטמפונים או רק בפדים?

תשובה: מומלץ להשתמש בפדים בלבד כדי לאפשר מעקב אחר כמות הדימום ולהפחית סיכון לזיהום.

תגיות: טמפונים, פדים, זיהום

שאלה: האם מותר לטוס?

תשובה: מומלץ להמתין עד לאחר הביקורת או לפחות עד לאחר שהדימום הכבד ביותר יחלוף (לרוב 3-5 ימים לאחר נטילת הציטוטק), כדי לוודא שאת נמצאת בקרבת מענה רפואי אם יתעורר צורך.

תגיות: טיסה, החלמה

שאלה: האם מותר לעשות אמבטיות? להיכנס לבריכה או לים?

תשובה: כדי למנוע זיהום בזמן שצוואר הרחם עדיין מעט פתוח, יש להימנע מאמבטיות, בריכות ורחצה בים למשך כשבועיים או עד הביקורת. מקלחת רגילה מותרת ואף מומלצת.

תגיות: מקווה, זיהום, אמבטיה

שאלה: מתי אפשר לחזור לקיים יחסי מין?

תשובה: מומלץ להמתין עד לאחר ביקורת תקינה. יש להקפיד על אמצעי מניעה שכן ניתן להרות שוב עוד לפני הביקורת. במקרה של קיום יחסים טרם הביקורת, במהלך הביקורת הרופא לא יוכל להבחין בין הריון חדש צעיר לבין כישלון הטיפול התרופתי.

תגיות: יחסי מין, אמצעי מניעה

שאלה: מה אם בזמן פעילות גופנית קלה אני שמה לב שהדימום מתגבר? האם זה נורמלי?

תשובה: התגברות דימום עקב מאמץ או שינוי תנוחה היא תופעה תקינה. עם זאת, אם מופיע דימום מוגבר מאוד, המצריך החלפת פד ספיג אחת לשעתיים, יש להיבדק מיד.

8. דגלים אדומים ומתי לפנות למיון

למרות שהפסקת הריון תרופתית היא הליך בטוח ביותר עם שיעור סיבוכים נמוך מאוד, זיהוי מוקדם של סימנים חריגים הוא קריטי. הסיכונים העיקריים כוללים דימום מאסיבי שעלול להוביל לאנמיה או זיהום רחמי. במקרים אלו, פנייה מהירה למיון נשים מאפשרת מתן טיפול אנטיביוטי או התערבות כירורגית מהירה למניעת סיבוכים ארוכי טווח

דגלי אזהרה – מתי לפנות לרופא מוקדם מהרגיל?

- דימום כבד ביותר ("ברז" יותר משתי תחבושות גדולות בשעה לשעתיים רצופות)
- חום מעל 38 מעלות צלזיוס שאינו מגיב לטיפול במשככי כאבים
- כאב חריג שאינו מוקל במשככי כאבים
- חולשה חריגה, סחרחורת או סימני עילפון

הפרשה נרתיקית חריגה או ריח חריג.

שאלה: איזה סימפטומים דורשים פנייה מיידית?

תשובה: חום מעל 38.5 מעלות, דימום כבד בלתי פוסק (החלפת פד ספוג מעל פעם בשעתיים), חולשה משמעותית המפריעה לתפקוד, סחרחורת משמעותית, קושי בנשימה, כאבים שאינם מגיבים למשככי כאב או איבוד הכרה.

תגיות: סימפטומים, מיון, חירום

שאלה: מהם דגלי האזהרה הרפואיים המצריכים פניה מיידית לבדיקה רפואית?

תשובה: דימום מוגבר במיוחד (יותר משתי תחבושות גדולות בשעה); חום מעל 38°C שאינו יורד תחת טיפול במשככי כאבים; כאב חריג/בלתי נסבל שאינו משתפר במשככי כאבים; חולשה משמעותית, עילפון או סחרחורת; הפרשה נרתיקית חריגה מאוד; המשך סימני הריון או חוסר דימום מוחלט שבוע לאחר הטיפול.

תגיות: דגלי אזהרה, הפניה למיון, חום, הפרשות, דימום מוגבר

MISSED ABORTION

שאלה: יש לי חום מעל 38 מעלות שנמשך מעל יומיים, או חום מעל 39 מעלות. מה לעשות?

תשובה: המצב שאת מתארת מצריך בדיקה דחופה. יש לגשת במייד לבדיקת רופא נשים זמין או למיון נשים בבית החולים וולפסון (טלפון: 03-5028318, זמין 24/7).

תגיות: חום, דגל אדום, מיון נשים, דחוף

שאלה: אני חווה דימום מוגבר במיוחד (יותר משתי תחבושות גדולות בשעה). מה לעשות?

תשובה: המצב שאת מתארת מצריך בדיקה דחופה. דימום כבד כזה דורש הערכה רפואית מיידית במיון נשים (טלפון: 03-5028318).

תגיות: דימום מוגבר, דגל אדום, מיון נשים, דחוף

שאלה: יש לי חום מעל 38°C שלא יורד גם אחרי שלקחתי משככי כאבים (אקמול/אופטלגין/נורופן). מה לעשות?

תשובה: המצב שאת מתארת מצריך בדיקה דחופה. חום שאינו מגיב לטיפול דורש שלילת זיהום במיון נשים באופן מידי (טלפון: 03-5028318).

תגיות: חום, משככי כאבים, דגל אדום, מיון נשים

שאלה: אני מרגישה כאב חריג או בלתי נסבל שלא משתפר עם משככי כאבים רגילים. מה לעשות?

תשובה: המצב שאת מתארת מצריך בדיקה דחופה. יש לגשת במייד לבדיקת רופא נשים במיון (טלפון: 03-5028318).

תגיות: כאב עז, דגל אדום, מיון נשים, דחוף

שאלה: יש לי הפרשה נרתיקית חריגה מאוד (ריח רע, כמות גדולה או צבע מוזר). מה לעשות?

תשובה: המצב שאת מתארת עשוי להעיד על זיהום ומצריך בדיקה דחופה. יש לגשת במייד לבדיקת רופא נשים זמין במיון (טלפון: 03-5028318).

תגיות: הפרשה חריגה, ריח רע, דגל אדום, מיון נשים

MISSED ABORTION

שאלה: אני חווה חולשה משמעותית, עילפון, סחרחורת או נפילה. מה לעשות?

תשובה: המצב שאת מתארת מצריך בדיקה דחופה עקב חשש לאובדן דם משמעותי או תגובה המודינמית. יש לגשת במייד למיון נשים (טלפון: 03-5028318).

תגיות: עילפון, סחרחורת, חולשה, דגל אדום, מיון נשים

שאלה: אני חווה קוצר נשימה או קושי בדיבור. מה לעשות?

תשובה: המצב שאת מתארת מחייב בדיקה רפואית דחופה ביותר. יש לגשת במייד למיון (טלפון: 03-5028318).

תגיות: קוצר נשימה, דגל אדום, מיון, דחוף

שאלה: מהם סימני הזיהום שדורשים פנייה למיון?

תשובה: שילוב של חום, צמרמורות, דימום מוגבר והפרשה חריגה מהווים דגל אדום. במקרה כזה יש לגשת במייד לבדיקת רופא נשים במיון (טלפון: 03-5028318).

תגיות: זיהום, חום, צמרמורות, דגל אדום

9. טריאז' רפואי: דגלים כתומים (בדיקה בהקדם)

דגלים כתומים מעידים על מצבים שאינם מהווים סכנת חיים מיידיית אך מצריכים בירור רפואי בטווח של עד 3 ימים. מקרים אלו כוללים לרוב חשד לכישלון הטיפול התרופתי או חריגות בבדיקות מעבדה.

שאלה: אין לי דימום בכלל יותר משבוע אחרי הטיפול התרופתי. מה לעשות?

תשובה: המצב שאת מתארת (דגל כתום) עשוי להעיד על כישלון הטיפול התרופתי. מומלץ לפנות לבדיקת רופא נשים בימים הקרובים (תוך 3 ימים) לצורך הערכה ואולטראסאונד.

תגיות: חוסר דימום, דגל כתום, כישלון טיפול

MISSED ABORTION

שאלה: אני עדיין חווה סימני הריון (כמו בחילות או רגישות בחזה) אחרי הטיפול התרופתי. מה לעשות?
תשובה: המשך סימני הריון (דגל כתום) עשוי להעיד על כך שההריון עדיין ויאבילי או שהטיפול לא הושלם. מומלץ לפנות לבדיקת רופא נשים בהקדם (עד 3 ימים).

תגיות: סימני הריון, בחילות, דגל כתום, כישלון טיפול

שאלה: קיבלתי תוצאה חריגה בבדיקת מעבדה. למי לפנות?

תשובה: חריגה בבדיקת מעבדה (דגל כתום) דורשת התייחסות של רופא. יש להפנות את השאלה לרופא הנשים שלך או לרופא שתפגשי בביקור הראשון טרם המשך הטיפול.

תגיות: בדיקות מעבדה, דגל כתום, רופא נשים

10. רקע רפואי ומצבים מיוחדים

לפני תחילת הליך של הפסקת הריון, חיוני לשקלל את ההיסטוריה הרפואית שלך. מחלות כרוניות, הפרעות קרישה או מיקומים חריגים של ההריון (כמו בצלקת ניתוחית) משפיעים על בחירת שיטת הטיפול ורמת המעקב הנדרשת.

שאלה: יש לי רקע רפואי מיוחד (מחלה כרונית, הפרעות קרישה, טיפול במדללי דם או אירוע מוחי בעבר). האם זה משפיע על הטיפול?

תשובה: כן, רקע רפואי מורכב מחייב התאמה אישית של הטיפול. עליך להפנות את המידע לרופא הנשים שלך או לרופא המטפל בביקור הראשון בבית החולים טרם התחלת התהליך. ניתן ליצור קשר עם מזכירות המרפאה לתיאום: 03-5028490.

תגיות: רקע רפואי, הפרעות קרישה, מחלות כרוניות, בטיחות

שאלה: מה המשמעות של הריון חוץ רחמי או הריון בצלקת ניתוח קיסרי?

תשובה: מצבים אלו הם מצבי חירום רפואיים שאינם מטופלים בהפסקת הריון רגילה. במידה ואובחנת עם הריון חוץ רחמי או הריון בצלקת, יש לגשת במידי לבדיקת רופא נשים במיון (טלפון: 03-5028318).

תגיות: הריון חוץ רחמי, הריון בצלקת, דגל אדום, מיון

11. מעקב וביקורת

הביקורת הרפואית, מתקיימת כשבוע לאחר נטילת הציטוטק וכוללת אולטרסאונד וגינלי, היא השלב הסופי וההכרחי לוודא הצלחת התהליך. מטרתה העיקרית היא לשלול נוכחות של "שארית" (רקמה הריונית שנותרה ברחם), שעלולה לגרום לדימומים כרוניים, זיהומים או הצטלקות של חלל הרחם. רק לאחר אישור רפואי על חלל רחם נקי ניתן להכריז על סיום התהליך בביטחון מלא. אם במהלך הביקורת מזוהה שארית ברחם יש צורך בטיפול נוסף (מנה נוספת של ציטוטק, או גרידה). במידה ותקבלי טיפול תרופתי נוסף- תוזמני לביקורת נוספת כעבור שבוע.

שאלה: איך אדע שהטיפול הצליח? האם נדרש מעקב? איך אני עושה ביקורת?

תשובה: נתאם לך תור לביקורת כשבוע לאחר נטילת הציטוטק. במהלך הביקורת תבוצע בדיקת אולטרסאונד לוודא שהרחם התרוקן. אם יש שארית – יש צורך בטיפול נוסף (מנה נוספת של ציטוטק או גרידה, לפי המלצת הרופא ורצונך).

אם עובי הרירית בבדיקת ה-US הוא 15 מ"מ או פחות – מסתיים הטיפול.
באם עובי הרירית יותר מ-15 מ"מ ישנה אפשרות לטיפול נוסף בציטוטק או לגרידה לפי העדפת המטופלת והחלטת הרופא.

תגיות: ביקורת, הצלחת הטיפול, אולטרסאונד

שאלה: האם אפשר לבצע את המעקב בבית?

תשובה: לא. הדרך היחידה לוודא שהרחם התרוקן היא באמצעות בדיקת אולטרסאונד בביקורת רפואית.

תגיות: מעקב ביתי, אולטרסאונד, ביקורת

שאלה: האם הביקורת יכולה להתבצע בבית החולים הקרוב לביתי או במרפאה בקופ"ח?

תשובה: העדיפות היא לבצע את הביקורת בבית החולים בו ניתן הטיפול. ניתן לבצע בבמוסד רפואי אחר או בקופת החולים בתנאי שלרופא זמין אולטרסאונד והוא מנוסה בזיהוי תוצאות הטיפול ויכול להפנותך להמשך טיפול במידת הצורך.

תגיות: מקום הביקורת, קופת חולים

שאלה: מה להביא לביקורת?

MISSED ABORTION

תשובה: יש להביא את מכתב הסיכום מן הביקור הקודם. כדאי להגיע בצום מלא למקרה שיהיה צורך בגרידה והפעולה תתאפשר באותו היום.

תגיות: מסמכים, הכנה לביקורת

שאלה: למה אני צריכה ללכת לרופא נשים שלי לאחר הוסת?

תשובה: לעיתים נותרת שארית קטנה שלא זוהתה קודם, הבדיקה המיטבית לזיהוי כזה נעשית מיד בסיום הווסת לאחר שהרחם התרוקן.

תגיות: וסת ראשונה, ביקורת בקהילה

שאלה: אם אני מרגישה טוב, האם אפשר לבטל את התור?

תשובה: לא. חובה להגיע לביקורת. גם אם את מרגישה מצוין והדימום פסק, רק אולטרסאונד ורופא נשים יכול לאשר שהתהליך הסתיים ואין שארית.

תגיות: ביקורת, מעקב, חובה

שאלה: מה לעשות במידה ופספסתי את הביקורת?

תשובה: יש ליצור קשר עם המרפאה ולתאם תור חדש בהקדם, ולשים לב לסימפטומים חריגים בינתיים.

תגיות: ביקורת, פספוס

שאלה: האם יש סימנים גופניים לכך שהרחם התרוקן?

תשובה: סימן עיקרי הוא הפסקת הדימום הכבד ושיפור בהרגשה הכללית, אך הדרך היחידה לוודא זאת בוודאות היא אולטרסאונד.

תגיות: סימני הצלחה, ריקון רחם

12. אורח חיים והנחיות כלליות

ניהול נכון של אורח החיים בתקופת ההחלמה נועד למזער את הסיכון לזיהומים עולים בזמן שצוואר הרחם נותר מעט פתוח. חשוב לשמור על היגיינה (מקלחות מותרות ומומלצות), אך להימנע ממים עומדים (אמבטיות, בריכות) ומקיום יחסי מין עד לאחר הביקורת. הקפדה על הנחיות אלו מגנה על רירית הרחם המתחדשת ומאפשרת חזרה מהירה ובטוחה לפוריות.

שאלה: מהן ההנחיות לתקופה התהליך?

תשובה: יש להקפיד על הכללים הבאים מתחילת ההליך ועד לסיומו-

1. להימנע משימוש בטמפונים במשך כל זמן הדימום
 2. להימנע משימוש בריכות מים עומדים (אמבטיה, בריכה, ים, ג'אקוזי)
 3. להימנע מקיום יחסי מין בזמן הדימום
 4. במקרה של עליית חום, כאבים חזקים או דימום מוגבר עלייך להיבדק ע"י רופא נשים
 5. ביקורת נוספת אצל גניקולוג מטפל לאחר הופעת ווסת
- תגיות: הנחיות כלליות, בריכה, ים

שאלה: האם ישנן הגבלות בזמן הטיפול? מהן?

תשובה: אנו ממליצים להימנע מקיום יחסי מין, כניסה לים ולבריכה, פעילות גופנית מאומצת ושתיית אלכוהול. חזרה לפעילות שגרתית אפשרית לרוב תוך 3-4 ימים לאחר הציטוטק. לקיום יחסים וכניסה לים/בריכה יש להמתין עד לאחר הביקורת כעבור שבועיים. תגיות: הגבלות, יחסי מין, ספורט

שאלה: האם מותר לטבול במקווה אחרי הטיפול?

תשובה: יש להימנע מבריכות מים עומדים (אמבטיה, בריכה, ים, מקווה) במשך כל זמן הדימום ועד לאחר הביקורת כעבור שבועיים.

תגיות: מקווה, זיהום

שאלה: האם עלי להודיע לרופא הנשים שלי?

תשובה: מומלץ להיוועץ ברופא המטפל לאחר הפלה נדחית. בנוסף, קיימת המלצה לביקורת אצל גניקולוג מטפל לאחר הופעת הווסת.

תגיות: רופא מטפל, מעקב שגרתי

שאלה: כמה זמן לאחר ההפלה ניתן לנסות שוב להרות?

תשובה: ניתן להתחיל לנסות להרות שוב לאחר הווסת הראשונה. מומלץ עד להגעת הווסת להשתמש באמצעי מניעה, כדי למנוע מצב שבו בבדיקת האולטרסאונד לא ניתן יהיה להבחין בין הריון חדש צעיר לבין שארית של תוכן הריוני מההפלה הקודמת.

תגיות: הריון עתידי, תזמון, אמצעי מניעה

שאלה: האם עישון משפיע על היעילות?

תשובה: עישון אינו מונע מהתרופות לעבוד ואינו משפיע על הצלחת התהליך, אך הוא מעלה פגיעה בכלי דם

ועלול להאט את קצב ההחלמה של הגוף ולעלות את שיעור הסיבוכים. כמו כן עישון פוגע משמעותית בפירון ויכול להוביל לקושי בהשגת הריון והפלות חוזרות. מומלץ להפסיק לעשן.

תגיות: עישון, סיבוכים

שאלה: האם מותר לשתות אלכוהול או לצרוך קנאביס במהלך הטיפול?

תשובה: מומלץ להימנע משימוש בסמים ואלכוהול עד להשלמת כל התהליך וביקורת תקינה.

תגיות: אלכוהול, קנאביס

שאלה: אני מניקה, האם ניתן להמשיך להניק?

תשובה: כן, ניתן להמשיך בהנקה שכן התרופות אינן עוברות לתינוק דרך חלב האם.

תגיות: הנקה, תרופות

שאלה: האם ניתן לנהוג במהלך הטיפול התרופתי?

תשובה: מומלץ להימנע מנהיגה ב-24 השעות לאחר נטילת הציטוטק בשל סכנת סחרחורות או כאבים עזים.

תגיות: נהיגה, בטיחו

13. סודיות ודיסקרטיות

הטיפול בהפסקות הריון על כל סוגיהן כפוף לכללי סודיות רפואית מחמירים, וקיימים פרוטוקולים מנהלתיים בבתי החולים המאפשרים יצירת "תיק חסוי". מנגנון זה מבטיח כי המידע על התהליך לא יופיע בתיק הרפואי הממוחשב הכללי של קופת החולים ולא יהיה גיש לגורמים חיצוניים, כולל בני משפחה, ללא הסכמתה המפורשת של המטופלת.

ככלל, הצוות הרפואי אינו רשאי למסור מידע לכל אדם אחר בניגוד לרצונך. במקרים חריגים ייוועץ הצוות הרפואי עם גורמים רלוונטיים בבית החולים או בקהילה.

שאלה: האם הטיפול תועד בתיק הרפואי שלי? האם זה דיסקרטי?

תשובה: ניתן לבקש לשמור את הטיפול בגיליון חסוי בארכיון בית החולים, כך שלא תהיה גישה אליו לגורמים חיצוניים או לעובדים לא רלוונטיים.

תגיות: דיסקרטי, סודיות, תיק רפואי

שאלה: אני לא רוצה שהקרובים שלי ידעו

תשובה: רופאים, אחיות או עובדים סוציאליים מחויבים לשמור על פרטיך בסוד ולא למסור מידע ללא

MISSED ABORTION

הסכמתך. ניתן לבקש גיליון חסוי שלא יהיה נגיש לקופות החולים או לכלל צוות בית החולים. הסיבה היחידה למסירת מידע ללא הסכמתך היא להגן עליך מפני פגיעה או התעללות (אם את מתחת לגיל 18), ובמקרה זה על הצוות ליידע אותך.

תגיות: סודיות, דיסקרטיות, קטינות

שאלה: האם יש סודיות רפואית מול הבעל?

תשובה: יש לך זכות מלאה לסודיות רפואית. אין צורך חוקי בידיעת הבעל או אישורו לביצוע ההליך.

תגיות: סודיות, זכויות המטופלת

14. פוריות, וסיכונים עתידיים

הטיפול הרפואי באובדן היריון מוקדם (הפלה נדחית), בין אם הוא מבוצע בגישה תרופתית ובין אם בגישה כירורגית, נחשב להליך בטוח ביותר ברפואת נשים המודרנית. חשוב להדגיש כי אין כל עדות מדעית לכך שאובדן היריון שטופל באופן מבוקר פוגע בפרייון או מקשה על כניסה להיריון בעתיד. הרחם הוא איבר בעל יכולת שיקום וריפוי יוצאת דופן; רירית הרחם (האנדומטריום) מתחדשת באופן מלא ומהיר מיד לאחר סיום התהליך, והגוף חוזר למעגל הורמונלי תקין תוך זמן קצר. מחקרים ארוכי טווח מוכיחים כי אירוע של אובדן היריון אינו מעלה את הסיכון לסיבוכים בהריונות הבאים, כגון הריונות חוץ-רחמיים או לידות מוקדמות. כחלק מהמעטפת הרפואית שנועדה להגן על בריאותך ועל סיכוייך להרות שוב בבטחה, במידה וסוג הדם שלך הוא Rh שלילי, תקבלי זריקת אנטי-D בתוך 72 שעות מהתהליך. זריקה זו חיונית למניעת היווצרות נוגדנים ובכך מבטיחה את תקינותם המלאה של הריונות עתידיים.

שאלה: האם הטיפול בטוח? האם יש פגיעה לאם או לעובר הבא?

תשובה: כן, הטיפול בטוח מאוד עד שבוע 9 ופחות מ-1% מהמקרים מצריכים פנייה דחופה למיון. אין סכנה לפגיעה בפוריות עתידית.

תגיות: סיכונים, בטיחות

שאלה: האם בעקבות הטיפול יש סכנה להריון חוץ רחמי? מה הסיכון לסיבוכים בהריונות הבאים?

תשובה: הטיפול אינו מעלה שכיחות של הריון חוץ-רחמי ואינו קשור לסיבוכים כלשהם בהריונות עתידיים.

תגיות: פוריות, הריונות עתידיים

שאלה: האם הטיפול התרופתי יכול לסכן אותי בעתיד? מבחינת פרייון, וסת או תסמונת קדם וסתית?

תשובה: לא, הטיפול בטוח ואינו משפיע לרעה על פוריות, סדירות הווסת או תסמונת קדם-וסתית.

תגיות: פוריות, מחזור, תסמונת קדם-וסתית

שאלה: האם הטיפול במפיג'ין וציטוטק מתאים גם להריון חוץ רחמי?

תשובה: לא, הטיפול מיועד להריון תוך-רחמי בלבד. במקרה של הריון חוץ-רחמי יש צורך בטיפול אחר ופנייה מיידית לרופא.

תגיות: הריון חוץ-רחמי, דגל אדום

שאלה: זאת פעם שלישית שאני עוברת הפסקת הריון, האם יש בכך סיכונים מצטברים?

תשובה: מבחינה רפואית, אין מניעה לעבור יותר מהפסקת הריון אחת, והדבר אינו פוגע בסיכויים להרות בעתיד. מחקרים מראים כי הפסקות חוזרות, ובמיוחד בשיטה התרופתית, אינן גורמות לנזק מצטבר ואינן מעלות סיכון לסיבוכים בהריונות הבאים. בשיטה הניתוחית קיים סיכון תאורטי נמוך מאוד להידבקויות, אך שימוש בטכניקות מודרניות ממזער זאת. הדבר החשוב ביותר הוא מניעת זיהומים ע"י פיקוח רפואי.

תגיות: הפסקות הריון חוזרות, סיכונים, פוריות עתידית, בטיחות ההליך

שאלה: אפשר הסבר קצר על אמצעי המניעה השונים?

תשובה: המאגר כולל פירוט על קונדום (הגנה ממחלות), גלולות משולבות (יעילות גבוהה, דורש מרשם), טבעת וגינאלית (החלפה כל 3 שבועות), מדבקה (החלפה שבועית), mini pill (לנשים מניקות או עם קרישיות יתר) והתקן תוך רחמי (היעיל ביותר, עד 5 שנים).

תגיות: אמצעי מניעה, גלולות, התקן, טבעת, קונדום, מחלות מין

15. היבטים רגשיים ותמיכה

הפלה נדחית היא לעיתים קרובות אירוע מטלטל הכרוך בתחושת אובדן. חשוב לדעת כי מנעד הרגשות – מעצב ועד הקלה או בלבול – הוא טבעי ולגיטימי לחלוטין. התמודדות הרגשיות מושפעות גם מהצניחה ההורמונלית החדה המתרחשת לאחר הפסקת ההריון. קבלת תמיכה מקצועית או מהסביבה הקרובה היא צעד בריא בתהליך העיבוד וההחלמה האישיים.

שאלה: האם יש תמיכה נפשית בבית חולים וולפסון לאחר ההפלה?

תשובה: כן, ניתן לפנות לשירות הסוציאלי במרכז הרפואי וולפסון לקבלת ליווי ותמיכה.

תגיות: תמיכה רגשית, שירות סוציאלי

שאלה: האם זה נורמלי שאני מרגישה כל כך עצובה ובוכה הרבה?

תשובה: כן, זה טבעי להרגיש עצב עמוק אחרי הפסקת הריון. הרבה נשים בוכות ומרגישות דכדוך בתקופה הזאת. בדרך כלל העצב החזק נחלש בהדרגה ככל שעובר הזמן.

תגיות: עצב, החלמה רגשית

שאלה: אני כועסת – למה דווקא לי זה קרה – ואני אפילו מקנאה בנשים בהריון. זה נורמלי לנעוץ

ככה? תשובה: כן, תחושות כעס וקנאה הן טבעיות. הרבה נשים שואלות "למה זה קרה דווקא לי?". זה חלק מההתמודדות עם האובדן, והכעס לרוב שוכך עם הזמן.

תגיות: כעס, קנאה, תסכול

שאלה: אני פשוט לא מרגישה כלום מאז ההפלה. זה בסדר?

תשובה: תחושת קהות או חוסר רגש היא לא נדירה. לעיתים הנפש נכנסת למצב "הגנה" כדי למנוע כאב מיידי. בדרך כלל הרגשות חוזרים בהדרגה.

תגיות: קהות רגשית, ניתוק, הגנה

שאלה: אני ובן הזוג שלי מתווכחים המון מאז ההפלה. האם זה קשור?

תשובה: כן, האירוע יכול ליצור מתח רב. כל אחד מעבד את החוויה אחרת, מה שמוביל לאי-הבנות. חשוב לנסות לדבר על כך בפתיחות.

תגיות: זוגיות, מתח, תקשורת

שאלה: קשה לי מאוד לראות תינוקות או נשים בהריון כרגע. האם אני צריכה להימנע מהם?

תשובה: זוהי תגובה נורמלית של הגנה עצמית. מותר לך לקחת פסק זמן ולהימנע מסיטואציות שקשות לך עד שתרגישי חזקה יותר.

תגיות: טריגרים, הגנה עצמית, הימנעות

שאלה: האם זה בסדר לחזור לקיים יחסי מין אם אני עדיין מרגישה עצובה?

תשובה: מבחינה רפואית יש להמתין עד לאחר הביקורת, אך רגשית – רק את ובן זוגך תדעו מתי זה נכון. יש נשים שהאינטימיות מנחמת אותן ואחרות זקוקות לזמן.

תגיות: אינטימיות, יחסי מין, רגש

שאלה: אני לא מבינה למה זה קרה דווקא לי, האם הגוף שלי לא יכול להיות בהריון? משהו בי פגום? משהו בבעלי פגום?

תשובה: התחושות של בלבול, אשמה וחשש שמהו בך או בבן זוגך "פגום" הן טבעיות לחלוטין לאחר אובדן, אך מבחינה רפואית המציאות הפוכה: אובדן הריון מוקדם הוא אירוע שכיח מאוד (קורה בכ-15-20% מההריונות) וברוב המוחלט של המקרים הוא נובע מ"טעות" גנטית מקרית וחד-פעמית שקרתה בחיבור שבין הביצית לזרע או בחלוקת התאים הראשונית של העובר. זה לא מעיד על בעיה בפוריות שלך או של בעלך, אלא על תהליך של "ברירה טבעית" שבו הגוף מזהה שההריון הספציפי הזה אינו ויאבילי (לא יכול להתפתח לתינוק בריא) ועוצר אותו. העובדה שהרית מוכיחה שהמערכות של שניכם מתפקדות, וברוב המוחלט של המקרים, ההריון הבא יהיה תקין לחלוטין. את ובן זוגך אינכם "אשמים" במה שקרה, ואין שום דבר פגום בכם, מדובר בסטטיסטיקה ביולוגית שאינה פוסחת על אף אחת.

תגיות: סיבות להפלה, אשמה, ברירה טבעית, פוריות עתידית

16. ביטוי מצוקה (דגלים אדומים)

בדומה לסיבוכים פיזיים, קיימים מצבי מצוקה רגשית הדורשים התייחסות מקצועית. אם חלוף הזמן לא מביא הקלה, אם ישנה פגיעה בתפקוד היומיומי, הפרעות שינה קשות או תחושת ייאוש, מומלץ לפנות לייעוץ רגשי דרך שירותי בריאות הנפש או השירות הסוציאלי כדי לקבל כלים להתמודדות וחזרה לאיזון.

שאלה: "מצב הרוח שלי לא משתפר, אני מרגישה ככה כבר הרבה זמן" / "עברו כמה שבועות ואני לא מרגישה הקלה"

תשובה: ממה שאת מתארת עולה שהקושי הרגשי נמשך ומתחיל להשפיע עליך. בשלב כזה מומלץ לפנות לעזרה מקצועית בתחום בריאות הנפש. פנייה לפסיכולוגית, עובדת סוציאלית או גורם טיפולי אחר היא צעד מקובל ונכון.

תגיות: מצוקה מתמשכת, דגל אדום

שאלה: "קשה לי לתפקד ביום-יום" / "אפילו דברים קטנים מרגישים לי בלתי אפשריים"

תשובה: ממה שאת מתארת עולה שהקושי הרגשי משפיע על התפקוד שלך. מומלץ לפנות לעזרה מקצועית בתחום בריאות הנפש כדי לקבל תמיכה שתעזור לך לחזור לשגרה.

תגיות: פגיעה בתפקוד, דגל אדום

שאלה: "אני מרגישה מוצפת כמעט כל הזמן" / "אני לא מסתדרת עם זה לבד"

MISSED ABORTION

תשובה: הצפה רגשית היא סימן לכך שהעומס גדול מדי כרגע. מומלץ לפנות לעזרה מקצועית דרך רופא המשפחה או שירות הסוציאלי בוולפסון כדי לקבל כלים להתמודדות.

תגיות: הצפה רגשית, דגל אדום

שאלה: "אני כמעט לא ישנה בלילה כבר הרבה זמן"

תשובה: הפרעות שינה מתמשכות הן סימן לעומס רגשי משמעותי. מומלץ לפנות לקבלת תמיכה מקצועית כדי לאפשר לגוף ולנפש לנוח ולהתאושש.

תגיות: הפרעות שינה, דגל אדום

שאלה: "אני מרגישה לבד לגמרי וחסרת תקווה"

תשובה: תחושת בדידות עמוקה או חוסר תקווה הן נורות אזהרה למצוקה. פנייה לגורם טיפולי יכולה לספק מרחב בטוח לשיתוף וקבלת תמיכה מקצועית שתעזור לך לראות את הדרך קדימה.

תגיות: בדידות, ייאוש, דגל אדום

17. מידע שימושי ואנשי קשר במרכז הרפואי וולפסון

ריכוז פרטי ההתקשרות של היחידות השונות במרכז הרפואי וולפסון מאפשר לך לקבל מענה מהיר בכל שעה. לכל צורך – החל מזימון תורים ועד למצבי חירום בלילה – קיים ערוץ תקשורת ייעודי.

שאלה: מהו מספר הטלפון של מיון נשים בוולפסון ומתי הוא פעיל?

תשובה: מיון נשים פעיל 24/7. טלפון: 03-5028318 (דחוף) או 03-5028490. כתובת: הלוחמים 62, חולון.

תגיות: מיון נשים, טלפון, וולפסון, 24/7

שאלה: איך ניתן ליצור קשר עם מרפאת הנשים (לא בשעות חירום)?

תשובה: המרפאה פעילה בימים א'-ה' בין השעות 08:00-14:30.

- טלפון: 03-5028490
- WhatsApp (הודעות בלבד): 03-5028111
- מייל: Nashimirp@wmc.gov.il
- תגיות: מרפאת נשים, וואטסאפ, שעות פעילות

שאלה: איך פונים לשירות הסוציאלי בוולפסון?

MISSED ABORTION

תשובה: השירות הסוציאלי פעיל בימים א'-ה' בין השעות 08:00-15:30.

- טלפון: 03-5028455
- מייל: vaadas@wmc.gov.il
- תגיות: שירות סוציאלי, עובדת סוציאלית