



## Fuentes detalladas de alimentación alternativa

Criar gallinas ponedoras con alimentación alterna para producir huevos semicriollos

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA



La alimentación alternativa en aves es un tema de gran importancia dentro de la producción avícola, ya que permite complementar la dieta de las gallinas mediante el uso de recursos disponibles en el entorno. Esto contribuye al aprovechamiento eficiente de los insumos de la finca y al fortalecimiento de sistemas productivos más sostenibles. Este enfoque integra diversas fuentes alimenticias de origen vegetal, animal y agrícola que, utilizadas de manera adecuada, pueden aportar nutrientes esenciales para el crecimiento, la postura y el bienestar de las aves.

Además de su valor nutricional, la alimentación alternativa representa una oportunidad para reducir costos de producción, diversificar las fuentes de alimento y promover prácticas de manejo más responsables con el ambiente. Comprender este tema permite reconocer la importancia de implementar estrategias complementarias que no sustituyen por completo el alimento balanceado, pero que sí enriquecen la dieta y favorecen una producción avícola más eficiente, natural y acorde con las condiciones del contexto rural.

En este sentido, existen diferentes fuentes de alimentación alternativa que pueden complementar la dieta de las aves y contribuir al mejoramiento de la producción avícola. Estas opciones permiten aprovechar recursos disponibles en el entorno, aportar nutrientes importantes para el crecimiento, la postura y el bienestar animal, además de favorecer prácticas productivas más sostenibles y económicas.

A continuación, se presentan algunas de las principales fuentes de alimentación alternativa utilizadas en la alimentación de las gallinas:



## 01 Forrajes verdes

Las gallinas pueden consumir diferentes tipos de plantas y pastos que aportan vitaminas, minerales y fibra.



Ejemplos:

- ▶ Pasto tierno
- ▶ Alfalfa
- ▶ Trébol
- ▶ Hojas de bore
- ▶ Hojas de yuca

Estos alimentos ayudan a mejorar la digestión y aportan pigmentos naturales que pueden intensificar el color de la yema del huevo.

## 02 Residuos agrícolas

Algunos subproductos de la agricultura pueden utilizarse como complemento alimenticio para las aves.

Ejemplos:

- Cáscaras de frutas
- Restos de verduras
- Maíz quebrado
- Arroz partido
- Subproductos del trigo

Es importante que estos residuos estén **frescos y libres de contaminación**, ya que alimentos en mal estado pueden causar enfermedades en las aves.



## 03 Proteínas alternativas



Las aves también pueden consumir fuentes de proteína natural disponibles en el entorno.

Ejemplos:

- Insectos
- Lombrices
- Larvas
- Restos de pescado o carne (en pequeñas cantidades)

Estas fuentes aportan proteínas y aminoácidos esenciales que favorecen el crecimiento y la producción de huevos.





## 04 Banco de proteínas

El **banco de proteínas** es una estrategia utilizada en sistemas agropecuarios para producir forrajes con alto contenido proteico que pueden ser utilizados como suplemento alimenticio para los animales, incluyendo las aves.

Consiste en establecer áreas dentro de la finca donde se siembran **plantas forrajeras ricas en proteína**, las cuales pueden ser cosechadas y suministradas directamente a las gallinas como complemento del alimento balanceado.

Los bancos de proteína permiten aprovechar recursos vegetales de la finca y reducir la dependencia de alimentos comerciales.



### Plantas utilizadas en bancos de proteína:

Algunas de las plantas más utilizadas para bancos de proteína en sistemas avícolas son:

- **Matarratón** (*Gliricidia sepium*)
- **Leucaena** (*Leucaena leucocephala*)
- **Botón de oro** (*Tithonia diversifolia*)
- **Moringa** (*Moringa oleifera*)
- **Nacedero** (*Trichanthera gigantea*)

### Matarratón (*Gliricidia sepium*)

Composición nutricional aproximada

- Proteína cruda: **18 – 30 %**
- Fibra: **15 – 25 %**
- Digestibilidad: **60 – 65 %**
- Calcio: **1.5 – 2 %**



Las hojas son altamente utilizadas como suplemento forrajero por su contenido de proteína y minerales.



### Establecimiento

- **Propagación:** estacas o semillas
- **Altitud:** 0 – 1500 msnm
- **Clima:** tropical cálido
- **Distancia de siembra:** 1 – 2 m
- **Primer corte:** 4 – 6 meses

## Leucaena (Leucaena leucocephala)

### Composición nutricional

- Proteína cruda: 22 – 30 %
- Fibra: 12 – 20 %
- Calcio: 1.3 %
- Fósforo: 0.25 %



Es una de las **leguminosas** más usadas en sistemas silvopastoriles por su alto valor proteico.



### Establecimiento

- Propagación: **semilla escarificada**
- Distancia: 1 – 3 m
- Altitud: 0 – 1800 msnm
- Corte: cada 45 – 60 días

## Botón de Oro (Tithonia diversifolia)

### Composición nutricional

- Proteína cruda: 18 – 25 %
- Fibra: 15 – 22 %
- Calcio: 2 – 3 %
- Alta digestibilidad



### Establecimiento

- Propagación: **estacas**
- Distancia: 1 – 1.5 m
- Altitud: 0 – 2400 msnm
- Corte: cada 45 – 60 días



## Moringa (Moringa oleifera)

### Composición nutricional

- Proteína cruda: 25 – 30 %
- Fibra: 7 – 15 %
- Calcio: 2 – 2.5 %
- Vitaminas A, B y C



### Establecimiento

- Propagación: semilla o estaca
- Distancia: 0.5 – 1 m
- Altitud: 0 – 1500 msnm
- Corte: cada 40 – 60 días

## Nacedero (Trichanthera gigantea)

El **nacedero** es un arbusto forrajero tropical utilizado como suplemento proteico para aves, cerdos y rumiantes. Se caracteriza por sus hojas grandes y su rápida regeneración después del corte, lo que lo convierte en una planta ideal para bancos de proteína en sistemas pecuarios.

### Composición nutricional

- Proteína cruda: 18 – 22 %
- Fibra: 15 – 20 %
- Calcio: 2 %



### Establecimiento

- Propagación: estacas
- Distancia: 1 m
- Altitud: 0 – 2000 msnm
- Corte: cada 50 – 60 días

## Bore (Alocasia macrorrhiza)

### Composición nutricional

- Proteína cruda: 12 – 16 %
- Fibra: 10 – 15 %
- Alto contenido de **carbohidratos**



### Establecimiento

- Propagación: **rizomas o cormos**
- Distancia: **1.5 m**
- Clima: **tropical húmedo**
- Altitud: **0 – 1600 msnm**

## Morera (Morus alba)

La **morera** es un árbol forrajero ampliamente utilizado en sistemas silvopastoriles y bancos de proteína. Sus hojas poseen alto contenido de proteína y buena digestibilidad, por lo que se emplean como suplemento en la alimentación de aves, bovinos y otros animales. La planta presenta crecimiento rápido y gran producción

### Composición nutricional

- Proteína cruda: 18 – 24 %
- Fibra: 10 – 15 %
- Digestibilidad: 70 – 80 %



### Establecimiento

- Propagación: **estacas**
- Distancia: **1 – 1.5 m**
- Altitud: **0 – 2000 msnm**
- Corte: **cada 45 – 60 días**



### Importancia en avicultura

Estas plantas se utilizan en bancos de proteína para:

- Reducir costos de concentrado
- Aportar **proteína vegetal, vitaminas y minerales**
- Complementar la dieta de **gallinas ponedoras** mejorar la sostenibilidad de la producción avícola.

Estas plantas poseen alto contenido de proteína, minerales y vitaminas, lo que las convierte en un buen suplemento para la alimentación de las aves.

Ventajas del banco de proteínas

- Aporta proteína natural a la dieta de las aves.
- Reduce los costos de alimentación.
- Permite producir alimento dentro de la finca.
- Mejora la sostenibilidad de los sistemas productivos.
- Puede complementar el consumo de concentrado.

Las hojas de estas plantas pueden ofrecerse **picadas o mezcladas con el alimento**, facilitando su consumo por parte de las aves.



## 05 Acceso a pastoreo



En sistemas semi-intensivos o de libre pastoreo, las gallinas pueden buscar parte de su alimento en el suelo.

Durante el pastoreo las aves consumen:

- Semillas
- Insectos
- Hierbas
- Pequeños organismos del suelo

Este comportamiento natural contribuye al bienestar animal y complementa la dieta.



Ahora se analizarán las ventajas y recomendaciones para el uso de alimentación alternativa.

### Ventajas de la alimentación alternativa

La implementación de alimentos alternativos puede ofrecer varios beneficios en la producción avícola:

- Reduce los costos de alimentación.
- Permite aprovechar recursos disponibles en la finca.
- Mejora el bienestar de las aves al permitir comportamientos naturales de búsqueda de alimento.
- Puede mejorar la calidad nutricional de los huevos.

### Recomendaciones para su uso

Para utilizar correctamente la alimentación alternativa se deben tener en cuenta las siguientes

- No sustituir completamente el alimento balanceado.
- Suministrar alimentos frescos y libres de contaminantes.
- Introducir los alimentos alternativos de manera gradual.
- Evitar alimentos tóxicos o en estado de descomposición.
- Mantener siempre disponible agua limpia para las aves.



Igualmente se pueden identificar **plantas utilizadas como banco de proteínas**, como moringa, botón de oro o matarratón, cuyas hojas son suministradas a las aves para aportar proteína vegetal.

Este tipo de alimentación permite que las aves aprovechen recursos naturales disponibles en la finca, contribuyendo a una producción más sostenible.

