

## Protocolo de vacunación para ganado lechero











Vacunar contra bruceslosis

Viroguard Prevención contra el complejo Respiratorio y abortivo bovino










Refuerzo Viroguard

**Aplicar Bacterina** Biobac 11 vías

Viroguard prevención contra el complejo respiratorio y adultivo bovino

**INICIO DEL SECADO** 

## **NACIMIENTO BECERRA**



**NOTA** 








2.5 meses (75 Días)



## NOTA

Para disminuir los gastos de crianza sin disminuir su eficiencia proporcionar Growlac® Farm en la etapa de lactancia como lactoreeemplazador.



Viroguard revención contra el complejo respiratorio

y adultivo bovino

## **NOTA**

Ya como en esta etapa son comunes los problemas respiratorios se recomienda el refuerzo con Bacterina contra la Pasteurelosis. También puede realizarse el refuerzo

3 Meses (90 Días)

4 Meses (122 Días)

6 Meses (183 Días)

7 Meses (213 Días)



Refuerzo Viroguard Vacunar contra brucelosis

Aplicar Bacterina Biobac 11 vías contra Clostridios, enfermedades Respiratorias bacterianas e Histophilussmni

Aplicar vacuna contra la Fiebre Carbonosa para prevencion del antrax.

11 Meses (335 Días)

13 a 15 Meses (396 a 456 Días)



20 a 22 Meses (220 días de gestación)



Vacunar contra brucelosis

NOTA

**Aplicar Viroguard** un mes antes de la inseminación de la vaquilla para prevenir reabsorciones embrionarias y abortos

Viroguard