


Alteraciones internas y externas del huevo

Novedades en la recolección del huevo, defectos externos o de cascaron:



Roturas grandes



Roturas finas



Huevos en fáfara o en cáscara fina



Cáscara rugosa



Huevos deformes




Huevos estriados



Huevos de cáscara granular



Huevos con agujeros



Huevos con cáscara moteada



Huevos con pecas



Huevos con marcas de jaula



Huevos sucios



Huevos contaminados por hongos



Huevos con marcas de insectos



otros contaminantes



Roturas grandes: son aberturas de la cáscara que rompen la membrana y afectan la presentación del huevo.

Roturas finas: son agrietamientos delgados a lo largo de la cáscara de huevo, necesita de ovos copia para determinar la lesión.

Huevos en fáfara o cáscara fina: la cáscara del huevo es débil, generalmente se puede presentar en las primeras semanas de postura.

Huevos con cáscaras rugosas: la superficie es áspera debido al acumulo irregular de calcio, dando esta apariencia poco llamativa en los procesos de comercialización.

Huevos deformes: se presentan en aves iniciando el ciclo de producción, se puede presentar en aves con doble ovulación.

Huevos estriados: su característica la presencia de un anillo alrededor del huevo, debido al estrés causado por ruidos fuertes y aumento de la edad de las aves.

Huevos con cáscara granular: esta condición se puede presentar por el consumo excesivo de calcio y las aves de edad avanzada.

Huevos con agujeros: se presenta este defecto en el huevo debido al consumo exagerado de calcio por parte de las aves de postura también se presenta en aves de edad avanzada que están en finalización de la producción de huevo.

Huevos con cáscara moteada: se caracteriza por una cascara muy fina y frágil, se puede presentar en posturas donde las aves se encuentran en estado de hacinamiento o evolución de un proceso infeccioso además de la edad de las aves.

Huevo con pecas: esta presentación del huevo se da más por problemas nutricionales causadas por el exceso de calcio en la dieta, y posibles lesiones presentadas en el tracto reproductor.

También se pueden presentar novedades por defectos internos del huevo, tales como:



**Olor a
pescado**



**Inclusiones
internas**



**Albumen
acuoso**



**Yemas
pálidas**



**Yemas
veteadas**



**Huevos
podridos**



**Parásitos en
el huevo**

Nota: Adaptado de Avicol (s.f).