

Chapitre I : Intégrales généralisées ou impropre

* f continue ou continue par morceaux sur $[a; b]$.

$\int_a^b f(t) dt$ converge ssi $\lim_{x \rightarrow b^-} \int_a^x f(t) dt$ existe et est finie.

On a alors $\int_a^b f(t) dt = \lim_{x \rightarrow b^-} \int_a^x f(t) dt$

* f continue ou continue par morceaux sur $]a; b[$ et $c \in]a; b[$

$\int_a^b f(t) dt$ converge si $\int_a^c f(t) dt$ et $\int_c^b f(t) dt$ convergent

et $\int_a^b f(t) dt = \int_a^c f(t) dt + \int_c^b f(t) dt$

* **Fonctions de Riemann :**

• f définie sur $]0; +\infty[$ par $t \mapsto \frac{1}{t^\alpha}$, $\alpha \in \mathbb{R}$

• $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^\alpha} dt$ converge $\Leftrightarrow \alpha > 1$

$\int_0^1 \frac{1}{t^\alpha} dt$ converge $\Leftrightarrow \alpha < 1$

* f continue ou continue par morceaux sur $[a; b]$

$\int_a^b f(t) dt$ est impropre ssi $f(t)$ converge.

* f continue ou continue par morceaux sur $[a; +\infty[$.

Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \neq 0$, alors $\int_a^b f(t) dt$ diverge et est appelée intégrale faiblement impropre

* Soit f continue ou continue par morceaux sur $]a; b[$.

Si $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ est finie, alors $\int_a^b f(t) dt$ converge

* $a \in \mathbb{R}^+$ et f continue ou continue par morceaux sur $]-a; a[$

→ Si f est paire et $\int_{-a}^a f(t) dt$ converge, $\int_{-a}^a f(t) dt = 2 \int_0^a f(t) dt$

→ Si f est impaire et $\int_{-a}^a f(t) dt$ converge, $\int_{-a}^a f(t) dt = 0$

Fonctions strictement positives :

* f continue ou continue par morceaux sur $]a; b[$

Si $\int_a^b |f(t)| dt$ converge, $\int_a^b f(t) dt$ absolument convergent.

Méthode:

Démontrer la convergence :

→ On démontre que la fonction est continue ou continue par morceaux.

→ Si besoin ou apparent on démontre qu'elle est à valeurs positives.

→ On démontre la convergence :

- Critère de Riemann

- Négligeabilité

- Équivalence

- Développements limités

- Comparaison (cos et sin)

- Calcul de la limite de l'intégrale

Remarque: Avant chaque intégrale entre a et $+\infty$, faire la limite de la fonction ; si elle est différente de 0, il est inutile de calculer l'intégrale car elle divergera à coup sûr.

Dans certains cas (f continue ou continue par morceaux sur $]a; b[$)

- Changement de variable si nécessaire

- Étude aux deux bornes

Calculer l'intégrale ou la limite de l'intégrale :

- IPP

- Chasles

- Changement de variable