BÖLÜM 14

b)
$$\sigma_1^2$$
 ve σ_2^2 bilinmiyor $(\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2)$

1) Hipotez kurulur

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1: \mu_1 < \mu_2$$

$$H_1: \mu_1 > \mu_2$$

$$H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$

2) Test istatistiği

$$t_{t} = \frac{\left(\overline{X}_{1} - \overline{X}_{2}\right) - \left(\mu_{1} - \mu_{2}\right)}{\sqrt{\frac{S_{1}^{2}}{n_{1}} + \frac{S_{2}^{2}}{n_{2}}}}$$

Serbestlik derecesi bilinmiyor;

$$v(serbestlik derecesi) = \frac{\left(\frac{S_{1}^{2}}{n_{1}} + \frac{S_{2}^{2}}{n_{2}}\right)^{2}}{\frac{\left(\frac{S_{1}^{2}}{n_{1}}\right)^{2}}{n_{1} - 1} + \frac{\left(\frac{S_{2}^{2}}{n_{2}}\right)^{2}}{n_{2} - 1}}$$

3) Karar

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$


$$H_1: \mu_1 < \mu_2$$

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1: \mu_1 > \mu_2$$


$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$




 $t_{t}<-t_{lpha;
u}$ olduğunda

 H_0 hipotezi red edilir



 $t_{i}>t_{lpha;
u}$ olduğunda

 H_0 hipotezi red edilir



 $t_{\alpha/2;
u}$ $t_{\alpha/2;
u}$

 $t_{i}>t_{\alpha /2; \nu}$ olduğunda

 H_0 hipotezi red edilir

Güven Aralığı;

$$P\!\!\left(\!\left(\overline{x}_{\!\scriptscriptstyle 1}-\overline{x}_{\!\scriptscriptstyle 2}\right)\!-t_{\alpha/2;\mathcal{V}}\sqrt{\frac{S_{\!\scriptscriptstyle 1}^2}{n_{\!\scriptscriptstyle 1}}\!+\!\frac{S_{\!\scriptscriptstyle 2}^2}{n_{\!\scriptscriptstyle 2}}}\!<\mu_{\!\scriptscriptstyle 1}-\mu_{\!\scriptscriptstyle 2}\!<\!\left(\overline{x}_{\!\scriptscriptstyle 1}-\overline{x}_{\!\scriptscriptstyle 2}\right)\!+t_{\alpha/2;\mathcal{V}}\sqrt{\frac{S_{\!\scriptscriptstyle 1}^2}{n_{\!\scriptscriptstyle 1}}\!+\!\frac{S_{\!\scriptscriptstyle 2}^2}{n_{\!\scriptscriptstyle 2}}}\right)\!=\!1-\alpha$$

$$(\overline{x}_1 - \overline{x}_2) \pm t_{\alpha/2:V} \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}$$

Örnek: Bir ilaç firması, ilacı şişelere doldurmak için 2 makine kullanıyor. Birinci makineden $n_1 = 10$ ikinci makineden $n_2 = 12$ şişe seçiliyor. Bu şişeler incelendiğinde 1.makine ortalama $\overline{x}_1 = 30.87$ birim sıvı, ikinci makine ortalama $\overline{x}_2 = 30.68$ birim sıvı dolduruyor. Birinci ve ikinci makinanın varyanslarıda $S_1^2 = 0.0225$ ve $S_2^2 = 0.0324$ olarak hesaplanıyor.

- a) $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ olsun. %95 güven düzeyinde birinci makinenin daha fazla sıvı doldurup doldurmamasını test ediniz.
- b) %95 güven düzeyinde kitle ortalamaları arasındaki fark için güven aralığını bulunuz.

Çözüm:

a)
$$1-\alpha = 0.95 \Rightarrow \alpha = 0.05$$

 $n_1 = 10$, $\overline{x}_1 = 30.87$, $S_1^2 = 0.0225$
 $n_2 = 12$, $\overline{x}_2 = 30.68$, $S_2^2 = 0.0324$

1) Test istatistiği

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1: \mu_1 > \mu_2$$


2) Test istatistiği

$$t_{t} = \frac{\left(\overline{X}_{1} - \overline{X}_{2}\right) - \left(\mu_{1} - \mu_{2}\right)}{\sqrt{\frac{S_{1}^{2}}{n_{1}} + \frac{S_{2}^{2}}{n_{2}}}} = \frac{\left(30.87 - 30.68\right) - 0}{\left(\frac{0.0225}{10} + \frac{0.0324}{12}\right)} = 2.657$$

Serbestlik derecesi

$$v = \frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}\right)^2}{\left(\frac{S_1^2}{n_1}\right)^2 + \left(\frac{S_2^2}{n_2}\right)^2} = \frac{\left(\frac{0.0225}{10} + \frac{0.0324}{12}\right)^2}{\left(\frac{0.0225}{10}\right)^2 + \left(\frac{0.0324}{12}\right)^2} = \frac{(0.00495)^2}{\frac{(0.00225)^2}{9} + \frac{(0.0027)^2}{11}} = \frac{0,0000245}{0.000001225} = 20$$

3) Karar



$$1-\alpha=0.95 \Longrightarrow \alpha=0.05$$

$$v = 20$$
 serbestlik derecesi

$$t_{0.05:\nu} = t_{0.05:20} = 1.725$$

$$t_t = 2.657 > t_{0.025;20} = 1.725$$

 ${\cal H}_0\,$ hipotezi red edilir.

a) Güven aralığı

$$P\left(\left(\overline{x}_{1}-\overline{x}_{2}\right)-t_{\alpha/2;\mathcal{V}}\sqrt{\frac{S_{1}^{2}}{n_{1}}+\frac{S_{2}^{2}}{n_{2}}}<\mu_{1}-\mu_{2}<\left(\overline{x}_{1}-\overline{x}_{2}\right)+t_{\alpha/2;\mathcal{V}}\sqrt{\frac{S_{1}^{2}}{n_{1}}+\frac{S_{2}^{2}}{n_{2}}}\right)=1-\alpha$$

$$(\overline{x}_{1}-\overline{x}_{2})\pm t_{\alpha/2;\mathcal{V}}\sqrt{\frac{S_{1}^{2}}{n_{1}}+\frac{S_{2}^{2}}{n_{2}}}$$

$$1-\alpha = 0.95 \Rightarrow \alpha = 0.05 \Rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0.025$$

$$t_{\alpha/2:\nu} = t_{0.025:20} = 2.086$$

$$\hat{\theta}_1 = (\overline{x}_1 - \overline{x}_2) - t_{\alpha/2:V} \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}} = (30.87 - 30.68) - 2.086 \sqrt{\frac{0.0225}{10} + \frac{0.0324}{12}} = 0.04324$$

$$\hat{\theta}_2 = (\overline{x}_1 - \overline{x}_2) + t_{\alpha/2:V} \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}} = (30.87 - 30.68) + 2.086 \sqrt{\frac{0.0225}{10} + \frac{0.0324}{12}} = 0.3367$$

%95 güven düzeyinde kitle ortalamasını içeren aralık: (0.04324;0.3367)

KAYNAKLAR

1. Uygulamalı İstatistik (1994)

Ayşen APAYDIN, Alaettin KUTSAL, Cemal ATAKAN

2. Olasılık ve İstatistik Problemler ve Çözümleri ile (2008)

Prof. Dr. Semra ERBAŞ

3. Olasılık ve İstatistik (2006)

Prof. Dr. Fikri Akdeniz

4. Olasılık ve İstatistiğe Giriş I-II (2011)

Prof. Dr. Fikri Öztürk

5. Fikri Öztürk web sitesi

 $\underline{http://80.251.40.59/science.ankara.edu.tr/ozturk/index.html}$