

# Diferansiyel Denklemler

PROF.DR. METİN YAMAN

# BÖLÜM 4.2

DEĞİŞKEN KATSAYILI LİNEER  
DİFERANSİYEL DENKLEMLER

### Tanım 4.2.1

$$a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = Q(x)$$

denklemine  **$n$ . mertebeden değişken katsayılı lineer denklem** denir.

Bu bölümde mertebe düşürme yönteminden ve bir özel denklem olan Euler denkleminden bahsedeceğiz.

$$x^2y'' - 2xy' + 2y = e^x \text{ Euler tipi lineer denklemdir.}$$

$$y'' - 5xy' + 2y = e^x \text{ değişken katsayılı lineer denklemdir.}$$

## Mertebe Düşürme Yöntemi

$n$ . mertebeden lineer denklemin bir özel çözümü verildiğinde uygun dönüşüm ile denklemin  $(n-1)$ . mertebeye düşürülmesi esasına dayanan bir yöntemdir.

### Teorem 4.2.1

$$a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0 \quad (4.2.1)$$

homojen lineer denkleminin bir özel çözümü  $y_1 = y_1(x)$  verildiğinde

$$y = uy_1$$

dönüşümü yapılırsa (4.2.1)denklemi  $(n-1)$ . mertebeden bir denkleme dönüşür.

**İspat.** Kolaylık olsun diye 2.mertebe denklem üzerinde ispatı yapalım.

$$a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0 \quad (4.2.2)$$

homojen denklemin bir özel çözümü  $y_1 = y_1(x)$  verilsin. Yani

$$a_2(x)y_1'' + a_1(x)y_1' + a_0(x)y_1 = 0$$

sağlanır.  $y = uy_1$ ,  $y' = u'y_1 + uy_1'$ ,  $y'' = u''y_1 + 2u'y_1' + uy_1''$   
türevleri (4.2.2) denkleminde yazılırsa

$$a_2(x)[u''y_1 + 2u'y_1' + uy_1''] + a_1(x)[u'y_1 + uy_1'] + a_0(x)uy_1 = 0$$

veya

$$[a_2 y_1'' + a_1 y_1' + a_0 y_1]u + [2a_2 y_1' + a_1 y_1]u' + a_2 y_1 u'' = 0$$

bulunur. Soldaki ilk terim sıfır olacağından

$$a_2 y_1 u'' + (2a_2 y_1' + a_1 y_1) u' = 0$$

elde edilir. Üsteki denklemde  $u' = v$ ,  $u'' = v'$  dönüşümleri yapılırsa

$$a_2 y_1 v' + (2a_2 y_1' + a_1 y_1) v = 0$$

1. mertebeden lineer denklem bulunur.

**Örnek 4.2.1**  $(1 + x^2)y'' - 2xy' + 2y = 0$  denkleminin bir özel çözümü  $y_1 = x$  ise genel çözümü merteye düşürerek bulunuz.

**Çözüm.**  $y = ux$ ,  $y' = u'x + u$ ,  $y'' = u''x + 2u'$  türevleri denklemde yerine yazılırsa

$$(1 + x^2)[u''x + 2u'] - 2x[u'x + u] + 2ux = 0$$

veya

$$x(1 + x^2)u'' + 2u' = 0$$

elde edilir.  $u' = v$ ,  $u'' = v'$  dönüşümü ile  $x(1 + x^2)v' + 2v = 0$  lineer denklemi veya

$$\frac{dv}{v} = -\frac{2dx}{x(1+x^2)}$$

değişkenlerine ayrılabilir denklem elde edilir. İntegral alınarak

$$\ln v = -\int \left( \frac{2}{x} - \frac{2x}{(1+x^2)} \right) dx = -2\ln x + \ln(1+x^2) + \ln c_1$$

veya

$$v = \frac{c_1(1+x^2)}{x^2} = c_1 \left( \frac{1}{x^2} + 1 \right)$$

elde edilir.



$$v = c_1 \left( \frac{1}{x^2} + 1 \right) = u' \text{ eşitliğinden}$$

$$u = c_1 \int \left( \frac{1}{x^2} + 1 \right) dx = c_1 \left( \frac{-1}{x} + x \right) + c_2$$

bulunur.

Genel çözüm  $y = ux$  şeklinde olmalı. Yani

$$y = ux = \left( c_1 \left( \frac{-1+x^2}{x} \right) + c_2 \right) x \text{ veya}$$

$$y = c_1(x^2 - 1) + c_2x$$

bulunur.

**Örnek 4.2.2**  $xy'' - (x^2 + 1)y' = x^3$  denkleminin genel çözümünü mertebe düşürerek bulunuz.

**Çözüm.**  $y' = u$  dersek  $y'' = u'$  olur. Buna göre üsteki denklem

$$xu' - (x^2 + 1)u = x^3$$

veya

$$u' - \left(\frac{x^2+1}{x}\right)u = x^2$$

şeklide yazılır. Bu 1.mertebeden lineer denklemdir.

$$\alpha(x) = e^{-\int \left(x + \frac{1}{x}\right) dx} = \frac{1}{xe^{\frac{x^2}{2}}}$$

bu denklemin integral çarpanı olmak üzere lineer denklemin çözümü

$$u(x) = xe^{\frac{x^2}{2}} \left( \int \left( \frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{x} \right) x^2 dx + c_1 \right) = xe^{\frac{x^2}{2}} \left( \int xe^{-\frac{x^2}{2}} dx + c_1 \right)$$

veya

$$u(x) = -x + c_1 xe^{\frac{x^2}{2}}$$

şeklinde bulunur.

Genel çözüm;

$$u = y' = -x + c_1 x e^{\frac{x^2}{2}}$$

eşitliğinden

$$y = \int \left( -x + c_1 x e^{\frac{x^2}{2}} \right) dx = -\frac{x^2}{2} + c_1 e^{\frac{x^2}{2}} + c_2$$

veya

$$y = c_1 e^{\frac{x^2}{2}} + c_2 - \frac{x^2}{2}$$

şeklinde bulunur.

## PROBLEMLER

1.  $xy'' + 2y' = 2x$  denkleminin homojen kısmının bir özel çözümü  $y = x^{-1}$  ise genel çözümü bulunuz.

C:  $y = c_1 + c_2x^{-1} + \frac{1}{3}x^2$

2.  $xy''' - y'' = x^2$  denkleminin  $y'' = u$  dönüşümü ile mertebesini düşürerek genel çözümünü bulunuz

C:  $y = c_1 + c_2x + c_3\frac{x^3}{6} + \frac{1}{12}x^4$

3.  $(x - 1)y'' - xy' + y = 0$  denkleminin bir özel çözümü  $y = e^x$  ise genel çözümü bulunuz.

C:  $y = c_1e^x + c_2x$

## Euler Diferansiyel Denklemi

Euler denklemi değişken katsayılı lineer denklem olup Euler dönüşümü adını vereceğimiz bir dönüşüm ile sabit katsayılı lineer denkleme dönüşeceğini göreceğiz.

### Tanım 4.2.2

$$a_n x^n y^{(n)} + a_{n-1} x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 x y' + a_0 y = Q(x) \quad (4.2.3)$$

şeklinde yazılabilen lineer denkleme **Euler diferansiyel denklemi** denir.

### Örnek 4.2.3

$$x^2 y'' + 2xy' + 2y = \ln x$$

$$xy'' - \frac{1}{x}y = \ln x$$

$$x^3 y''' - 4xy' + 2y = 0$$

denklemleri Euler diferansiyel denklemdir.

(4.2.3) denkleminin çözümü için  $x = e^t$  dönüşümü kullanılır. Bu dönüşüme **Euler dönüşümü** denir.

**Uyarı:** Bu dönüşüm öncekilerden farklıdır. Çünkü burada bağımsız değişken üzerinde dönüşüm yapılmaktadır. Öncekilerde bağımlı değişken üzerinde dönüşüm yapılıyordu.

### Teorem 4.2.2

$$a_n x^n y^{(n)} + a_{n-1} x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 x y' + a_0 y = Q(x) \quad (4.2.4)$$

denklemini  $x = e^t$  Euler dönüşümü kullanılarak

$$b_n y^{(n)} + b_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + b_1 y' + b_0 y = \bar{Q}(t) \quad (4.2.5)$$

sabit katsayılı lineer denkleme dönüşür.

**İspat.**  $x = e^t$  veya  $t = \ln x$  dönüşümü altında

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt} \Rightarrow x \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt},$$



$$\begin{aligned}
\frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left( \frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dx} \left( \frac{1}{x} \frac{dy}{dt} \right) = \frac{-1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \frac{d}{dx} \left( \frac{dy}{dt} \right) \\
&= \frac{-1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \frac{d}{dt} \left( \frac{dy}{dt} \right) \frac{dt}{dx} = \frac{-1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x^2} \frac{d^2 y}{dt^2} \\
&= \frac{1}{x^2} \left( \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) \\
&= \frac{1}{x^2} \frac{d}{dt} \left( \frac{d}{dt} - 1 \right) y
\end{aligned}$$

yazılır. Buradan  $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt} \left( \frac{d}{dt} - 1 \right) y$

elde edilir. Yani  $x^2 y''(x) = y''(t) - y'(t)$  yazılır.

$$\begin{aligned}\frac{d^3 y}{dx^3} &= \frac{d}{dx} \left( \frac{d^2 y}{dx^2} \right) = \frac{d}{dx} \left( \frac{1}{x^2} \left( \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) \right) \\&= \frac{-2}{x^3} \left( \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) + \frac{1}{x^2} \frac{d}{dx} \left( \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) \\&= \frac{-2}{x^3} \left( \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) + \frac{1}{x^2} \frac{d}{dt} \left( \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) \frac{dt}{dx} \\&= \frac{-2}{x^3} \left( \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) + \frac{1}{x^3} \left( \frac{d^3 y}{dt^3} - \frac{d^2 y}{dt^2} \right) \\&= \frac{1}{x^3} \left( \frac{d^3 y}{dt^3} - 3 \frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} \right)\end{aligned}$$

$$\frac{d^3 y}{dx^3} = \frac{1}{x^3} \left( \frac{d^3 y}{dt^3} - 3 \frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} \right)$$

$$= \frac{1}{x^3} \frac{d}{dt} \left( \frac{d}{dt} - 1 \right) \left( \frac{d}{dt} - 2 \right) y \quad \text{yazılır. Buradan}$$

$$x^3 \frac{d^3 y}{dx^3} = \frac{d^3 y}{dt^3} - 3 \frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt} \left( \frac{d}{dt} - 1 \right) \left( \frac{d}{dt} - 2 \right) y$$

elde edilir. Yani  $x^3 y''(x) = y'''(t) - 3y''(t) + 2y'(t)$  yazılır.

Benzer şekilde

$$x^n \frac{d^n y}{dx^n} = \frac{d}{dt} \left( \frac{dy}{dt} - 1 \right) \left( \frac{dy}{dt} - 2 \right) \dots \left( \frac{dy}{dt} - (n-1) \right) y$$

eşitlikleri bulunur.

Bulunan türevler (4.2.4) denkleminde yazılırsa (4.2.5) **sabit katsayılı denklem** elde edilir.

**Örnek 4.2.4**  $x^2 y'' + 4xy' + 2y = \ln x$  Euler diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulalım.

**Çözüm.**  $x = e^t$  Euler dönüşümü kullanacağız.

$xy'(x) = y'(t)$  ve  $x^2 y''(x) = y''(t) - y'(t)$  ifadelerini denklemde yerine yazarsak

$$y''(t) - y'(t) + 4y'(t) + 2y(t) = \ln(e^t) \text{ veya}$$

$$y'' + 3y' + 2y = t$$

sabit katsayılı lineer denklem bulunur.

Şimdi bu denklemi çözelim.

$$y'' + 3y' + 2y = t$$

denkleminin genel çözümü  $y_g(t) = y_h(t) + y_{\ddot{o}}(t)$  şeklinde olup homojen çözüm;

(karakteristik denklem ;  $k^2 + 3k + 2 = 0$  , kökler;  $k = -1, k = -2$  )

$$y_h(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{-2t}$$

şeklindedir. Sağ taraf için özel çözüm  $y_{\ddot{o}}(t) = At + B$  şeklinde aranır.

$A = 1/2$  ,  $B = -3/4$  bulunur.

Genel çözüm;  $y_g(t) = y_h(t) + y_{\ddot{o}}(t) = c_1 e^t + c_2 e^{2t} + \frac{1}{2}t - \frac{3}{4}$  veya

$$y_g(x) = c_1 x + c_2 x^2 + \frac{1}{2} \ln x - \frac{3}{4} \text{ şeklinde yazılır.}$$

**Örnek 4.2.5**  $xy'' + 3y' + \frac{1}{x}y = \ln x$  denkleminin genel çözümünü bulalım.

**Çözüm.** Denklemi  $x$  ile çarparsak Euler denklemi formunda yazmış oluruz. Yani;  $x^2y'' + 3xy' + y = x\ln x$ .

$xy'(x) = y'(t)$  ve  $x^2y''(x) = y''(t) - y'(t)$  ifadelerini denklemde yerine yazarsak

$$y''(t) - y'(t) + 3y'(t) + y(t) = te^t \text{ veya}$$

$$y'' + 2y' + y = te^t$$

sabit katsayılı lineer denklem bulunur.

denkleminin genel çözümü  $y_g(t) = y_h(t) + y_{\ddot{o}}(t)$  şeklinde olup homojen çözüm

(karakteristik denklem ;  $k^2 + 2k + 1 = 0$  , kökler;  $k = -1, k = -1$  )

$$y_h(t) = (c_1 + c_2 t)e^{-t}$$

şeklindedir. Sağ taraf için özel çözüm  $y_{\ddot{o}}(t) = (At + B)e^t$  şeklinde aranır.  $A = 1/4$  ,  $B = -1/4$  bulunur.

Genel çözüm;  $y_g(t) = y_h(t) + y_{\ddot{o}}(t) = (c_1 + c_2 t)e^{-t} + \frac{1}{4}t - \frac{1}{4}$  veya

$$y_g(x) = c_1 x^{-1} + c_2 x^{-1} \ln x + \frac{1}{4} \ln x - \frac{1}{4} \text{ şeklinde yazılır.}$$

### Uyarı 4.2.1

$$a_n x^n y^{(n)} + a_{n-1} x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 x y' + a_0 y = 0 \quad (4.2.6)$$

homojen Euler denklemi  $y = x^k$  ( $k$  sabit) dönüşümü kullanılarak da çözülebilir.

### İspat.

$$y' = kx^{k-1}, y'' = k(k-1)x^{k-2}, \dots, \\ y^{(n)} = k(k-1) \dots (k-(n-1))x^{k-n}$$

türevleri (4.2.5) denkleminde yerine yazılırsa

$$\{a_n[k(k-1) \dots (k-(n-1))] + \dots + a_1 k + a_0\} x^k = 0$$



eşitliği elde edilir.  $x \neq 0$  şartı altında

$$a_n[k(k-1) \dots (k-(n-1))] + \dots + a_1k + a_0 = 0 \quad (4.2.7)$$

denklemi bulunur. Bu (4.2.7) denklemi  $n$ . dereceden cebirsel bir denklem olup (4.2.6) denkleminin karakteristik denklemi adını alır.

(4.2.7) denkleminin reel ve farklı kökleri  $k_1, k_2, \dots, k_n$  ise her köke karşılık  $y_i = x^{k_i}$ , ( $i = 1, 2, \dots, n$ ) lineer bağımsız özel çözümleri bulunur. Genel çözüm

$$y_g = c_1 x^{k_1} + c_2 x^{k_2} + \dots + c_n x^{k_n}$$

şeklinde yazılır.

Köklerden  $m$  ( $m < n$ ) adedi katlı kök ise lineer bağımsız çözüm kümesi

$\{x^{k_m}, x^{k_m} \ln x, x^{k_m} (\ln x)^2, \dots, x^{k_m} (\ln x)^{m-1}\}$  olup genel çözüm

$$y_g = (c_1 + c_2 \ln x + \dots + c_m (\ln x)^{m-1}) x^{k_m} + c_{m+1} x^{k_{m+1}} + \dots + c_n x^{k_n}$$

şeklinde yazılır.

**Örnek 4.2.6**  $x^2 y'' + 4xy' + 2y = 0$  Euler diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulalım.

**Çözüm.**  $y = x^k$ ,  $xy' = kx^k$ ,  $x^2 y'' = k(k-1)x^k$  ifadelerini denklemden yerine yazarsak  $(k(k-1) + 4k + 2)x^k = 0$  denklemi bulunur.

Karakteristik denklem  $k^2 + 3k + 2 = 0$ , kökler  $k_1 = -1$ ,  $k_2 = -2$  dir.

Genel çözüm

$$y_g = c_1 x^{-1} + c_2 x^{-2}$$

şeklinde yazılır.

**Örnek 4.2.7**  $x^3 y''' - x^2 y'' + xy' = 0$  Euler diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulalım.

**Çözüm.**  $y = x^k$ ,  $xy' = kx^k$ ,  $x^2 y'' = k(k-1)x^k$ ,  
 $x^3 y''' = k(k-1)(k-2)x^k$  ifadelerini denklemden yerine yazarsak  
 $(k(k-1)(k-2) - k(k-1) + k)x^k = 0$  denklemi bulunur.

Karakteristik denklem  $k^3 - 4k^2 + 4k = 0$  şeklinde olup kökler  
 $k_1 = 0, k_2 = 2, k_3 = 2$  bulunur.

Genel çözüm  $y_g = c_1 x^0 + c_2 x^2 + c_3 x^2 \ln x$  veya

$y_g = c_1 + c_2 x^2 + c_3 x^2 \ln x$  şeklinde yazılır.

## PROBLEMLER

1.  $xy'' + 2y' = 2x$  denkleminin genel çözümü bulunuz.

C:  $y = c_1 + c_2x^{-1} + \frac{1}{3}x^2$

2.  $x^2y'' - xy' + 5y = x^2$  denkleminin genel çözümünü bulunuz

C:  $y = x(c_1 \cos(\ln x) + c_2 \sin(\ln x)) + \frac{x^2}{5}$

3.  $x^3y''' - x^2y'' + 2xy' - 2y = 0$  denkleminin genel çözümü bulunuz.

C:  $y = x(c_1 + c_2 \ln x) + c_3x^2$

4.  $x^2y'' - xy' + 4y = 0$  denkleminin genel çözümünü bulunuz

C:  $y = x(c_1 \cos(\sqrt{3} \ln x) + c_2 \sin(\sqrt{3} \ln x))$

Aşağıda verilen başlangıç değer problemlerini çözünüz.

5.  $xy'' + 2y' = x^3$ ,  $y(1) = \frac{1}{20}$ ,  $y'(1) = \frac{2}{3}$

C:  $y = \frac{1}{20}x^4 - \frac{1}{5}x^{-1} + \frac{1}{5}$

6.  $x^2y'' - 4xy' + 6y = 0$ ,  $y(2) = 0$ ,  $y'(2) = 4$

C:  $y = -2x^2 + x^3$

7.  $x^2y'' - 3xy' + 3y = x^3$ ,  $y(1) = 0$ ,  $y'(1) = 1$

C:  $y = -\frac{1}{4}x + \frac{1}{4}x^3 + \frac{1}{4}x^3 \ln|x|$