
கால்பகுதி	குறிகள்
I பகுதி XOY	$x>0, y>0$ எனில் ஆயத்தொலைவுகள் (+,+) எடுத்துக்காட்டுகள்: (5,7) (2,9) (10,15)
II பகுதி X'OY	$x<0, y>0$ எனில் ஆயத்தொலைவுகள் (−,+) எடுத்துக்காட்டுகள்: (−2,8) (−1,10) (−5,3)
III பகுதி X'OY'	$x<0, y<0$ எனில் ஆயத்தொலைவுகள் (−,−) எடுத்துக்காட்டுகள்: (−2,−3) (−7,−1) (−5,−7)
IV பகுதி XOY'	$x>0, y<0$ எனில் ஆயத்தொலைவுகள் (+,−) எடுத்துக்காட்டுகள் : (1,−7) (4,−2) (9,−3)



ஆய அச்சுகள் மீது ஒரு புள்ளியின் ஆயத் தொலைவுகள்:

- y = 0 எனில் $(x, 0)$ என்ற புள்ளி 'X' அச்சின் மீது அமைந்திருக்கும்.
  (எ.கா) **(2,0), (−5,0), (7,0)** ஆகிய புள்ளிகள் 'X' அச்சின் மீது உள்ளன.
- $x = 0$ எனில் (0,y) என்ற புள்ளி 'Y' அச்சின் மீது அமைந்திருக்கும்.
  (எ.கா) (0,3), (0,−4), (0,9) ஆகிய புள்ளிகள் 'Y' அச்சின் மீது உள்ளன.

3.9.6 கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகளை வரைபடத்தாளில் குறித்தல்

கீழ்க்கண்ட புள்ளிகளை எடுத்துக்கொள்வோம். (4,3), (−4,5), (−3,−6), (5,−2), (6,0), (0,−5)

(i) (4,3) என்ற புள்ளியைக் குறிக்க.


ஆதிப்புள்ளி 'O' இலிருந்து OX வழியாக 4 அலகுகள் நகர்ந்து பிறகு 4இலிருந்து OYஇக்கு இணையாக 3 அலகுகள் நகர்ந்தால் புள்ளி M(4,3) ஐக் குறிக்கலாம்.

(ii) (−4,5) என்ற புள்ளியைக் குறிக்க.

ஆதிப்புள்ளி 'O'இலிருந்து OX' வழியாக 4 அலகுகள் நகர்ந்து பிறகு −4 இலிருந்து OY இக்கு இணையாக 5 அலகுகள் நகர்ந்தால் புள்ளி N(−4,5) ஐக் குறிக்கலாம்.

(iii) (− 3, − 6) என்ற புள்ளியைக் குறிக்க.

ஆதிப்புள்ளி 'O' இலிருந்து OX′ வழியாக 3 அலகுகள் நகர்ந்து பிறகு −3இலிருந்து OY'இக்கு இணையாக 6 அலகுகள் நகர்ந்தால் புள்ளி P(−3, −6) ஐக் குறிக்கலாம்.



8th_Maths_Tamil Medium_Chapter 3.indd 114 23/11/2022 16:10:26