**Method I**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| –1 | 1 | 13 | 32 | 20 | |
| | 0 | –1 | –12 | –20 | |
| –2 | 1 | 12 | 20 | 0 | (remainder) |
| | 0 | –2 | –20 | | |
| | 1 | 10 | 0 | (remainder) | |

$p(x) = (x+1)(x+2)(x+10)$

Hence,

$x^3 + 13x^2 + 32x + 20$
$= (x+1)(x+2)(x+10)$

**Method II**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| –1 | 1 | 13 | 32 | 20 |
| | 0 | –1 | –12 | –20 |
| | 1 | 12 | 20 | 0 (remainder) |

Then $p(x) = (x+1)(x^2+12x+20)$

Now $x^2 + 12x + 20 = x^2 + 10x + 2x + 20$
$= x(x+10) + 2(x+10)$
$= (x+2)(x+10)$

Hence, $x^3 + 13x^2 + 32x + 20$
$= (x+1)(x+2)(x+10)$

**Example 3.40**

Factorise $x^3 - 5x^2 - 2x + 24$

***Solution***

Let $p(x) = x^3 - 5x^2 - 2x + 24$

When $x = 1, p(1) = 1 - 5 - 2 + 24 = 18 \neq 0$ $(x-1)$ is not a factor.

When $x = -1$, $p(-1) = -1 - 5 + 2 + 24 = 20 \neq 0$ $(x+1)$ is not a factor.

Therefore, we have to search for different values of $x$ by trial and error method.

When $x = 2$

$p(2) = 2^3 - 5(2)^2 - 2(2) + 24$
$= 8 - 20 - 4 + 24$
$= 8 \neq 0$ Hence, $(x-2)$ is not a factor

When $x = -2$

$p(-2) = (-2)^3 - 5(-2)^2 - 2(-2) + 24$
$= -8 - 20 + 4 + 24$

$p(-2) = 0$

Hence, $(x+2)$ is a factor

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| –2 | 1 | –5 | –2 | 24 | |
| | 0 | –2 | +14 | –24 | |
| 3 | 1 | –7 | 12 | 0 | (remainder) |
| | 0 | 3 | –12 | | |
| | 1 | –4 | 0 | (remainder) | |

Thus, $(x+2)(x-3)(x-4)$ are the factors.

Therefore, $x^3 - 5x^2 - 2x^2 + 24 = (x+2)(x-3)(x-4)$

**Note**

Check whether 3 is a zero of $x^2 - 7x + 12$. If it is not, then check for –3 or 4 or –4 and so on.



3 Algebra_Term1.indd 113 02/12/2022 21:40:00