$f$ = இடைநிலை அளவு பிரிவின் நிகழ்வெண்

$c$ = இடைநிலை அளவு பிரிவின் நீளம்

$N$ = நிகழ்வெண்களின் கூடுதல் $\left(\sum f\right)$

$m$ = இடைநிலை அளவுப் பிரிவின் குவிவு நிகழ்வெண்ணுக்கு உடனடியான முந்தைய குவிவு நிகழ்வெண்

**எடுத்துக்காட்டு 8.12** கொடுக்கப்பட்டுள்ள 200 குடும்பங்களின் வாராந்திரச் செலவுக் குறிப்புகளின் இடைநிலை அளவு காண்க.

| வாராந்திரச் செலவு (₹) | 0-1000 | 1000-2000 | 2000-3000 | 3000-4000 | 4000-5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை | 28 | 46 | 54 | 42 | 30 |

தீர்வு

| வாராந்திரச் செலவு (₹) | குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை | குவிவு நிகழ்வெண் |
|---|---|---|
| 0-1000 | 28 | 28 |
| 1000-2000 | 46 | 74 |
| 2000-3000 | 54 | 128 |
| 3000-4000 | 42 | 170 |
| 4000-5000 | 30 | 200 |
| | $N$=200 | |

இடைநிலை அளவு $= \left(\frac{N}{2}\right)$ ஆவது மதிப்பு $= \left(\frac{200}{2}\right)$ ஆவது மதிப்பு

$=$ 100 ஆவது மதிப்பு

இடைநிலைப் பிரிவு $=$ 2000 – 3000

$\frac{N}{2} = 100 \quad l = 2000$

$m = 74, \quad c = 1000, \quad f = 54$

இடைநிலை அளவு $= l + \frac{\left(\frac{N}{2} - m\right)}{f} \times c$

$= 2000 + \left(\frac{100 - 74}{54}\right) \times 1000$

$= 2000 + \left(\frac{26}{54}\right) \times 1000 = 2000 + 481.5$

$= 2481.5$

**முன்னேற்றத்தைச் சோதித்தல்**

1. முதல் நான்கு முழு எண்களின் இடைநிலை அளவு _____.
2. முதல் நான்கு முழு எண்களுடன் நான்கு என்ற எண்ணைச் சேர்க்கும் போது இடைநிலை அளவு காண்க.
3. இரு இடைநிலை அளவுகளுக்கிடையே உள்ள வேறுபாடு___.



8-Stats TM.indd 299 02/12/2022 21:17:26