- வீசும் காற்றின் தன்மை
- மலைகளின் இடையூறு
- மேக மூட்டம்
- கடல் நீரோட்டங்கள்
- இயற்கைத் தாவரங்கள்

### நிலநடுக்கோட்டிலிருந்து தூரம்

நிலநடுக்கோட்டுப் பிரதேசங்களில் சூரியனின் கதிர்கள் செங்குத்தாக விழுவதால் அப்பகுதிகளில் வெப்ப நிலை அதிகமாக காணப்படும். நிலநடுக்கோட்டு பகுதியிலிருந்து தொலைவில் அமைந்துள்ள பகுதிகளிலும், துருவப் பகுதிகளிலும் சூரியனின் கதிர்கள் சாய்வாக விழுவதால் வெப்பநிலை குறைவாகக் காணப்படுகின்றது. இவ்வெப்ப வேறுபாட்டிற்கு புவி கோள வடிவில் உள்ளதே காரணமாகும்.

**செயல்பாடு**

கொடுக்கப்பட்ட இடங்களை அட்சம் மற்றும் வெப்பநிலை ஆகிய இருகூறுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு இணைக்கவும்

| வானிலை | | காலநிலை | |
|---|---|---|---|
| பகுதியான வெயில்  | 1. ஒரு நாளில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் ஏற்படும் வளிமண்டல மாற்றத்தைப் பற்றி அறிவது 'வானிலை' ஆகும். | 1. நீண்ட காலத்திற்கு மிகப்பரந்த நிலப்பரப்பில் ஏற்படும் வானிலையின் சராசரியே காலநிலையாகும். | வெப்பமான காலநிலை  |
| காற்று  | 2. ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கும் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் அடிக்கடி மாறக் கூடியதாக உள்ளது. | 2. ஏறக்குறைய மாறுதலுக்கு உட்படாமல் இருக்கிறது. | பருவக்காற்று  |
| மழை  | 3. ஒரே நாளில் ஓர் இடத்தில் காலைநேரத்தில் வெப்பமாகவும் நண்பகலில் மழைப் பொழிவும் என வேறுபட்ட வானிலை நிகழ்வுகள் ஏற்படும் | 3. ஓரிடத்தில் ஒரே வகையான காலநிலை காணப்படும். | ஈரப்பத காலநிலை  |
| கடுங்குளிர்  | 4. வானிலை ஆராய்ச்சி மையங்களில் ஒவ்வொரு நாளும் வானிலை விவரங்கள் சேகரிக்கப்படுகின்றன | 4. வானிலைத் தகவல்களின் சராசரியே காலநிலை ஆகும். | தீவிர காலநிலை  |
| காற்றுடன் கூடிய மழை  | 5. வானிலையைப் பற்றிய படிப்பு வானிலையியல் ஆகும். | 5. காலநிலையைப் பற்றிய படிப்பு காலநிலையியல் ஆகும். | புயல்  |

| நகரம் | அட்சம் | வெப்பநிலை அளவு (ஆகஸ்ட் மாதத்தில்) |
|---|---|---|
| கன்னியாகுமரி (தமிழ்நாடு) | | |
| புதுடெல்லி (இந்தியா) | | |
| மாஸ்கோ (இரஷ்யா) | | |

### கடல் மட்டத்திலிருந்து உயரம்

ஓர் இடத்தின் உயரத்தை சராசரி கடல்மட்டத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடுகிறோம். ஒவ்வொரு கிலோ மீட்டர் உயரத்திற்கும் 6.5°C வெப்பநிலை குறையும். இதனை இயல்பு வெப்ப குறைவு விகிதம் (Normal Lapse Rate) என்று அழைக்கின்றோம். இதனால் உயரமானப் பகுதிகளில் வெப்பநிலை குறைவாக உள்ளது.



IX_Std_Geography_TM_Unit _3.indd 195 12/19/2022 5:19:22 PM