



படம் 2.17: *செலாஜினெல்லா* வேரின் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம்

தண்டு



படம் 2.18: *செலாஜினெல்லா* தண்டின் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம்

தண்டின் உள்ளமைப்பு புறத்தோல், புறணி, ஸ்டீல் ஆகிய பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது (படம் 2.18). புறத்தோல் தடித்த கியூட்டிக்கிளைக் வெளிப்புறத்தில் கொண்ட பாரன்கைமா செல்களால் ஆனது. புறணி செல் இடைவெளிகளின்றி அமைந்த பாரன்கைமா செல்களால் ஆனது. *செ. லெபிடோஃபில்லா*வில் ஸ்கிலிரன்கைமா செல்களால் ஆன புறத்தோலடித்தோல் காணப்படுகிறது. ஆரப்போக்கில் நீண்ட டிரபிக்குலங்கள் எனப்படும் அகத்தோல் செல்கள் காணப்படுவது செலாஜினெல்லாவின் சிறப்புப் பண்பாகும். பக்கச்சுவரில் காஸ்பாரியன் பட்டைகள் காணப்படுகின்றன. புறணியின் உள்ளடுக்கிலுள்ள செல்கள் ஸ்டீலினை ஒப்பிடும்போது அதிகமாக நீட்சியடைவதால் ஸ்டீலைச் சுற்றி காற்று இடைவெளிகள் தோன்றி ஸ்டீல் டிராபிக்குலங்கள் பயன்படுத்தி மிதப்பது போன்ற தோற்றத்தைத் தருகிறது. வெளிநோக்கு சைலம் கொண்ட புரோட்டோஸ்டீல் காணப்படுகிறது. வாஸ்குலக் கற்றைகளின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் மோனோஸ்டீல் வகை (*செ. ஸ்பைனுலோசா*), டைஸ்டீல் வகை (*செ. கிராசியானா*) மற்றும் பாலிஸ்டீல் வகை (*செ. லெவிகேட்டா*) என வேறுபடுகிறது. ஒருமுனை (*செ. கிராசியானா*) அல்லது இருமுனை (*செ. ஓரிகானா*) சைலம் காணப்படுகிறது. டிரக்கீடுகள் காணப்படுகின்றன. *செ. டென்சா, செ. ரூபஸ்ட்ரிஸ்* ஆகியவற்றில் சைலக்குழாய்கள் காணப்படுகின்றன.

இலை

இலையில் மேற்புறத்தோல் மற்றும் கீழ்ப்புறத்தோல் காணப்படுகிறது.புறத்தோல்செல்களில்பசுங்கணிகம் காணப்படுகிறது.இருபுறங்களிலும்இலைத்துளைகள் காணப்படுகின்றன. இலையிடைத்திசு செல்லிடைவெளிகளுடன் கூடிய பாரன்கைமா செல்களால் ஆனது. மையத்தில் கற்றை உறையால் சூழப்பட்ட வாஸ்குலக் கற்றையுள்ளது. இதில் ஃபுளோயம் சைலத்தைச் சூழ்ந்து காணப்படுகிறது.


இனப்பெருக்கம்

உடல இனப்பெருக்கம்

துண்டாதல், சிறுகுமிழ் மொட்டுகள், கிழங்குகள், ஓய்வுநிலை மொட்டுகள் உருவாதல் ஆகிய முறைகளில் உடல இனப்பெருக்கம் நடைபெறுகிறது.

பாலினப்பெருக்கம்

பாலினப்பெருக்கத்தின் போது வித்துகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. செலாஜினெல்லா மாற்றுவித்து வகையைச் சார்ந்தது. இரண்டு வகை வித்துகளை உருவாக்குகிறது (படம் 2.19). நுண்வித்துகள் நுண்வித்தகத்திலிருந்தும், பெருவித்துகள் பெருவித்தகத்திலும் தோன்றுகின்றன. வித்தகங்கள் பெருவித்தக இலைகள் மற்றும் நுண்வித்தக இலைகளின் கோணத்தில் தோன்றுகின்றன.



படம் 2.19 : *செலாஜினெல்லாவின்* இனப்பெருக்கம்

வித்தக இலைகள் மைய அச்சைச் சூழ்ந்து நெருக்கமாக சுழல்முறையில் அமைந்து கூம்புகள் அல்லது ஸ்ட்ரோபைலஸ்களை உருவாக்குகின்றன. வித்தகங்கள் அமைந்திருக்கும் முறையில் சிற்றினங்களுக்கிடையே வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன. *செ. செலாஜினெல்லாய்டிஸ்,*

11th Botany_TM_Chapter 2.indd 54 12/01/2023 16:57:02