






விதி	விளக்க எடுத்துக்காட்டு
வளையமானது அதனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள ஆல்கைல் தொகுதியில் காணப்படும் கார்பன்களின் எண்ணிக்கையை விட குறைவான கார்பன் அணுக்களைக் கொண்டிருந்தால் அச்சேர்மமானது ஆல்கேனின் பெறுதியாக பெயரிடப்பட வேண்டும். மேலும் வளையமானது பதிலியாக கருதப்பட வேண்டும். மாறாக வளையத்தில் அதிக கார்பன் அணுக்கள் இருப்பின் அச்சேர்மம் வளைய ஆல்கேனின் பெறுதியாக பெயரிடப்பட வேண்டும்.	 2-Propylcyclobutane (derivative of cycloalkane) 2-புரேப்பைல்சைக்ளோபியூட்டேன் (சைக்ளோஆல்கேனின் பெறுதி)  2-Cyclopropylbutane (derivative of alkane) 2-சைக்ளோபுரப்பைல்பியூட்டேன் (ஆல்கேனின் பெறுதி)  3-Chlorocyclobut-1-ene (Double bond get prefernce over substituent-Cl for numbering) 3-குளோரோசைக்ளோபியூட்-1-ஈன் (எண்ணிடுவதற்கு - Cl ஐக் காட்டிலும் இரட்டை பிணைப்பு முன்னுரிமை பெறுகிறது)
பக்க சங்கிலியானது வினைச் செயல் தொகுதியைக் கொண்டிருப்பின் வளையத்தில் எத்தனை கார்பன் அணுக்கள் இருப்பினும் அலிசைக்ளிக் வளையமானது பதிலியாகவே கருதப்படவேண்டும்	 2-cyclobutylpropanal 2-சைக்ளோபியூட்டைல்புரப்பனல்  3-cyclohexylpentan-2-one 3-சைக்ளோஹெக்சைல்பென்டன்-2-ஒன்
வளையமானது இரட்டைப் பிணைப்பினை பெற்றிருந்து, பக்கச் சங்கிலியானது வினைச் செயல் தொகுதியைப் பெற்றிருப்பின், சேர்மமானது பக்கச் சங்கிலியின் பெறுதியாக பெயரிடப்பட வேண்டும் மேலும் வளையமானது பதிலியாக கருதப்படவேண்டும்	
வளையம் மற்றும் பக்கச்சங்கிலி ஆகிய இரண்டும் வினைச் செயல் தொகுதிகளைப் பெற்றிருப்பின், முன்னுரிமை வரிசைப்படி முதலில் அமைந்துள்ள வினைச் செயல் தொகுதியை எது பெற்றுள்ளதோ அதன் அடிப்படையில் மூல ஹைட்ரோகார்பன் (மூல வார்த்தை) தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும்.	 3-(3-nitrocyclopentyl) - prop-2-enoicacid 3-(3-நைட்ரோசைக்ளோபென்டைல்) -புரப்-2-ஈனாயிக்அமிலம்

11th Chemistry Chapter-11 Vol-2 TM.indd 134 20-01-2023 14:55:55