$$x_{H_2O} = \frac{1.67}{1.67 + 0.016} = \frac{1.67}{1.686} = 0.99$$

$$\therefore\ x_{H_2O} + x_{\text{குளுக்கோஸ்}} = 1$$

$$0.99 + x_{\text{குளுக்கோஸ்}} = 1$$

$$x_{\text{குளுக்கோஸ்}} = 1 - 0.99$$

$$= 0.01$$

$3.10\%\ \frac{W}{V}$ என்பது 10g

100ml கரைசலில் 10 கி கரைபொருள் உள்ள தென குறிக்கும்

$\therefore$ அயடோ போவிடோனின் எடை $1.5\text{ ml} = \frac{10\text{ g}}{100\text{ ml}} \times 1.5\text{ ml}$

$$= 0.15\text{ g}$$

4. $\frac{\text{கரைக்கப்பட்ட திடப்பொருள் நிறை}}{\text{நீரின் நிறை}} \times 10^6$

$$\frac{5 \times 10^{-3}\text{ g}}{1.05 \times 10^{3}\text{ g}} \times 10^6 = 4.76\text{ ppm}$$

5. (a) 1.5 மோல் $CoCl_2$-ன் நிறை $= 1.5 \times 129.9$

$= 194.85$ g

194.85 g நீரற்ற கோபால்ட் குளோரைடு நீரில் கரைக்கப்பட்டு லிட்டர் திட்டக்குடுவையில் பயன்படுத்தி கரைசல் தயாரிக்கப் பட வேண்டும் .

6. 6% $\frac{V}{V}$ நீர்க்கரைசலானது கரைசலில் 6g கிராம் மெத்தனாலைக் கொண்டுள்ளது.

$\therefore$ 500 ml 6% $\frac{V}{V}$ மெத்தனால் கரைசலைத் தயாரிக்க 500 ml திட்டக்குடுவையில் 30g மெத்தனால் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு போதுமான அளவு நீர் சேர்க்கப்பட்டு 500 ml கரைசல் தயாரிக்கப்படுகிறது.

6. $C_1V_1 = C_2V_2$

$6\text{ M } (V_1) = 0.25\text{ M} \times 500\text{ ml}$

$$V_1 = \frac{0.25 \times 500}{6}$$

$$V_1 = 20.83\text{ mL}$$

7. மொத்த அழுத்தம் = 1 atm

$P_{N_2} = \left(\frac{80}{100}\right) \times$ அதிக அழுத்தம் $= \frac{80}{100} \times 1\text{ atm} = 0.8\text{ atm}$

$P_{O_2} = \left(\frac{20}{100}\right) \times 1 = 0.2\text{ atm}$

ஹென்றி விதிப்படி

$P_{\text{கரைபொருள்}} = K_H \times_{\text{கரைசலில் கரைபொருள்}}$

$\therefore P_{N_2} = (K_H)_{\text{நைட்ரஜன்}} \times$ கரைசலில் நைட்ரஜனின் மோல் பின்னம்

$$\frac{0.8}{8.5 \times 10^4} = x_{N_2}$$

$$x_{N_2} = 9.4 \times 10^{-6}$$

இதைப்போலவே,

$$x_{O_2} = \frac{0.2}{4.6 \times 10^4}$$

$$= 4.3 \times 10^{-6}$$

9. $P^o_{\text{தூய பென்சீன்}} = 50.71\text{ mm Hg}$

$P^o_{\text{நாப்தலீன்}} = 32.06\text{ mm Hg}$

பென்சீன் மோல்களின் எண்ணிக்கை $= \frac{39}{78} = 0.5$ மோல்

நாப்தலீன் மோல்களின் எண்ணிக்கை $= \frac{128}{128} = 1$ மோல்

பென்சீனின் மோல்பின்னம் $= \frac{0.5}{1.5} = 0.33$

நாப்தலீனின் மோல்பின்னம் $= 1 - 0.33 = 0.67$

பென்சீனின் பகுதி ஆவிஅழுத்தம் $= P^o_{\text{பென்சீன்}} \times$ பென்சீனின் மோல்பின்னம்

$= 50.71 \times 0.33$

$= 16.73$ mm Hg

நப்தலீனின் பகுதி ஆவி அழுத்தம் $= 32.06 \times 0.67$

$= 21.48$ mm Hg

பென்சீன் ஆவியின் மோல்பின்னம்

$$= \frac{16.73}{16.73 + 21.48} = \frac{16.73}{38.21} = 0.44$$

ஆவிநிலையில் உள்ள நப்தலீனின் மோல்பின்னம்

$= 1 - 0.44 = 0.56$

10. $P^o_A = 10$ torr , $P_{\text{solution}} = 9$ torr

$W_A = 20$ g $\quad W_B = 1$ g

$M_A = 200\text{ g mol}^{-1}$ $M_B = ?$

$$\frac{\Delta P}{P^o_A} = \frac{W_B \times M_A}{M_B \times W_A}$$

$$\frac{10 - 9}{10} = \frac{1 \times 200}{M_B \times 20}$$

$$M_B = \frac{200}{20} \times 10 = 100\text{ g mol}^{-1}$$

11th Chemistry Key Answers-Glossary Vol-2 TM.indd 323 13-01-2023 16:06:35