



பிளனேரியா



கல்லீரல் புழு



நாடாப்புழு

படம் 2.12 தட்டை புழுக்களுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்

போன்ற தட்டைப்புழுக்கள் முழுமையற்ற செரிமான மண்டலத்தைக் கொண்டுள்ளன. கழிவுநீக்கமும், ஊடுகலப்பு ஒழுங்குபாடும் சிறப்புத்தன்மை வாய்ந்த, கழிவு நீக்கச் செல்களான **சுடர் செல்களால்** (*Flame cells*) நடைபெறுகின்றன. இருபால் உயிரிகளான இவற்றில் உட்கருவுருதல் நடைபெறுகிறது. **மிராசீடியம், ஸ்போரோசிஸ்ட், ரீடியா, செர்க்கேரியா** போன்ற பல லார்வாக்களைக் கொண்ட மறைமுக வளர்ச்சி காணப்படுகிறது. இவற்றின் வாழ்க்கைச் சுழற்சியில் **பலகரு நிலையும்**, (*Polyembryony*) பிளனேரியா போன்ற விலங்குகளில் **இழப்பு மீட்டல்** பண்பும் காணப்படுகின்றன.

எடுத்துகாட்டுகள்: *டீனியா சோலியம்* (நாடாபுழு), *ஃபேசியோலா ஹெப்பாட்டிக்கா* (கல்லீரல் புழு), *சிஸ்டோசோமா* (இரத்தப் புழு (படம் 2.12).

2.3.5 தொகுதி ஆஸ்கெல்மின்தஸ் (உருளைப் புழுக்கள்) (Aschelminthes– Round Worms)

(கிரே. ஆஸ்கஸ் குழி; ஹெல்மின்தஸ் - புழுக்கள்) (*G.Askes–cavity; helminths–worms*)

நெமட்டோடா என்று முன்னர் அழைக்கப்பட்ட இத்தொகுதி புழுக்கள், தற்போது ஆஸ்கெல்மின்தஸ் என அழைக்கப்படுகின்றன. இப்புழுக்களின் உடல் வெட்டுத் தோற்றத்தில், வட்ட வடிவில் காணப்பட்டதால் உருளைப்புழுக்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இவ்வகை புழுக்கள் தனித்தோ அல்லது நீர், நிலத் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளில் **ஒட்டுண்ணியாகவோ** வாழக்கூடியவை. இருபக்க சமச்சீருடைய மூவடுக்கு உயிரிகளான இவை உறுப்பு மண்டல அளவிலான உடற்கட்டமைப்பையும் போலி உடற்குழியையும் கொண்டவை. கியூட்டிகிள் எனப்படும் ஒளி ஊடுருவும் தன்மையுடைய கடினமான, பாதுகாப்பான **கொலாஜன் சவ்வினால்** இவை மூடப்பட்டுள்ளன. இவற்றின் உடலில் கண்டங்களில்லை. முழுமையான வளர்ச்சியடைந்த செரிமான மண்டலத்தில், நன்கு வளர்ச்சியடைந்த வாய், தசையினாலான தொண்டை மற்றும் மலவாய் ஆகியவை உள்ளன. கழிவுநீக்கம் **ரென்னட் சுரப்பிகளால்** (*Rennet glands*) நடைபெறுகிறது. இவை ஒருபால் உயிரிகள். எனவே ஆண் பெண் புழுக்களுக்கிடையே பால் வேறுபாட்டு தன்மை உண்டு. பொதுவாகச் சில பெண் புழு ஆண் புழுவைவிடச் சற்று நீண்டதாகக் காணப்படும்.



அஸ்காரிஸ்



யானைக்கால் புழு



கொக்கிப் புழு

படம் 2.13 உருளைப் புழுக்களுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்

XI Std Zoology Chapter-2 TM.indd 25 30/12/2022 16:04:13