www.tntextbooks.in

எனில், p (p, c) [p, c := p + 1, c + 1]

= p - c [p, c := p + 1, c + 1]

= (p + 1) - (c + 1)

= p - c

= p (p, c)

(p - c) [p, c := p + 1, c + 1] = p - c என்பதால், p – c என்பது p, c := p + 1, c + 1. என்ற மதிப்பிருத்தலின் மாற்றமிலி.

எடுத்துக்காட்டு 8.4.

m, n := m + 2, n – 1 என்று மதிப்பிருத்தலின் m, n என்பவை இரண்டு மாறிகள் என்க. எனில், m+3n என்ற கோவை ஒரு மாற்றமிலியா என காண்க:

P (m, n) = m + 3n எனில்,

P (m, n) [m, n := m + 3, n – 1]

= m + 3n [m, n := m + 3, n – 1]

= (m + 3) + 3(n – 1)

= m + 3 + 3n – 3

= m + 3n

= P (m, n)

(m + 3n) [m, n := m + 3, n - 1] = m + 3n என்பதால் m +3n என்பது m, n := m + 3, n – 1 என்ற மதிப்பிருத்தலின் ஒரு மாற்றமிலியாகும்.

8.2 மடக்கு மாற்றமிலி

ஒரு மடக்கில், L என்பது மடக்கின் உடற்பகுதியாகிய Bயின் மாற்றமிலியானால், L அந்த "மடக்கு மாற்றமிலி" என்றழைக்கப்படுகிறது.

while C

-- L

B

-- L

மடக்கு மாற்றமிலி, மடக்கின் உடற்பகுதிக்கு முன்பும், உடற்பகுதிக்குப் பின்பும், ஒவ்வொரு சுற்றிலும் மெய் என இருக்கிறது. L என்பது முதல் சுற்றின் தொடக்கத்தில் மெய் என இருப்பதால், மடக்கின் தொடக்கத்திலும் மெய்யாக இருக்கிறது. L கடைசி சுற்றின் முடிவிலும் மெய் என இருப்பதால், மடக்கு முடியும் போதும் மெய் எனவே இருக்கிறது. இவ்வாறு, L ஒரு மடக்கு மாற்றமிலியானால், கீழ்க்காணும் நெறிமுறையில் குறிக்கப்பட்டுள்ளபடியும், 8.1ஆவது பாய்வுபடத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளபடியும், நெறிமுறையின் நான்கு முக்கியமான இடங்களில் L மெய்யாக உள்ளது.

1. மடக்கின் தொடக்கத்தில் (அதாவது, மடக்கிற்கு முன்பு)
2. ஒவ்வொரு சுற்றின் தொடக்கத்தில் (அதாவது மடக்கின் உடற்பகுதிக்கு முன்பு)
3. ஒவ்வொரு சுற்றின் முடிவில் (அதாவது மடக்கின் உடற்பகுதிக்குப் பின்பு)
4. மடக்கின் இறுதியிலும் (அதாவது, மடக்கிற்குப் பின்பு)

1 -- L மடக்கின் தொடக்கம்

while

C

2 -- L சுற்றின் தொடக்கம்

B