எடுத்துக்காட்டு,:

$CH_3\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{—}Cl$
குளோரோ புரப்பேன்
$\xrightarrow[Zn/HCl]{[H]}$
$CH_3\text{-}CH_2\text{-}CH_3 + HCl$
புரப்பேன்

ii) உர்ட்ஸ் வினை

உலர் ஈதரில் உள்ள ஹாலோ ஆல்கேன் கரைசலை உலோக சோடியத்துடன் வினைபடுத்தும்போது, உயர் ஆல்கேன்கள் உருவாகுகின்றன. இரட்டைபடை எண்ணிக்கையில் உள்ள உயர் ஆல்கேன்களைத் தயாரிக்க இம்முறைப் பயன்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு:

$CH_3\text{-}Br + 2Na + Br\text{—}CH_3 \xrightarrow[\text{ஈதர்}]{\text{உலர்}} CH_3\text{-}CH_3 + NaBr$
மெத்தில் புரோமைடு — ஈத்தேன்

iii) கோரி ஹவுஸ் வினைவழிமுறை

ஆல்கைல் ஹாலைடும், லித்தியம் டை ஆல்கைல் குப்ரேட்டும் வினைபட்டு உயர் ஆல்கேனைத் தருகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு:

$CH_3CH_2Br + (CH_3)_2LiCu \longrightarrow CH_3CH_2CH_3 + CH_3Cu + LiBr$
எத்தில் புரோமைடு — புரப்பேன்

4) கிரிக்னார்டு காரணிகளிலிருந்து ஆல்கேன்களை தயாரித்தல்

ஈதர் முன்னிலையில் ஹாலோ ஆல்கேன்கள் மெக்னீசியத்துடன் வினைபட்டு, ஆல்கைல் மெக்னீசியம் ஹாலைடுகளைத் தருகின்றன. இது, கிரிக்னார்டு காரணி எனப்படுகிறது. இங்கே ஆல்கைல் தொகுதி, மெக்னிசியத்துடன் நேரடியாக இணைந்திருப்பதால், இது கார்பன் எதிர் அயனியாக செயல்படுகின்றது. எனவே, எளிதில் இடப்பெயர்ச்சி அடையும் ஹைட்ரஜனை கொண்டுள்ள சேர்மங்கள், கிரிக்னார்டு காரணியுடன் வினைப்பட்டு இணையான ஆல்கேன்களைத் தருகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு:

$CH_3\text{—}Cl + Mg \xrightarrow[\text{ஈதர்}]{\text{உலர்}} CH_3MgCl$
குளோரோ மீத்தேன் — மெத்தில் மெக்னீசியம் புரோமைடு

$CH_3MgCl + H_2O \longrightarrow CH_4 + Mg(OH)Cl$
மீத்தேன்

தன் மதிப்பீடு

2) கிரிக்னார்டு காரணியை நீரானது சிதைக்கின்றது. ஏன்?

3) கோல்ப் மின்னாற் பகுப்பு முறையின் படி மீத்தேனை தயாரிக்க முடியுமா?