
அ) ஜெம் டை ஹாலைடுகள்

CH_3CHCl_2

எத்திலீன் டைகுளோரைடு

1,1 - டைகுளோரோ ஈத்தேன்




ஐசோபுரோப்பிலிடின் டைகுளோரைடு

2,2-டைகுளோரோபுரப்பேன்


ஆ) விசினைல் டை ஹாலைடுகன்

எடுத்துக்காட்டு



எத்திலீன் டைகுளோரைடு அல்லது எத்திலீன் குளோரைடு

1, 2 -டைகுளோரோ ஈத்தேன்



ஐசோபியுடிலின் டைபுரோமைடு

1, 2-டைபுரோமோ-2-மெத்தில்புரப்பேன்

14.6.1 தயாரித்தல்

அ) ஜெம் டை ஹாலைடுகள்


எத்திலிடின் டை குளோரைடு (1,1-டைகுளோரோ ஈத்தேன்) பின்வருமாறு தயாரிக்கப்படுகிறது.

(i) அசிட்டால்டிஹைடை PCl_5 உடன் வினைப்படுத்துதல்



அசிடால்டிஹைடு — எத்திலின் டைகுளோரைடு

(ii) அசிட்டிலீனுடன் HCl சேர்க்கை வினை



அசிட்டிலீன் — வீனைல் குளோரைடு


$CH_3 - CHCl_2$

எத்திலிடின்டை குளோரைடு

ஆ) விசினைல் டை ஹாலைடுகள்


எத்திலீன் டை குளோரைடை (1,2-டை-குளோரோ ஈத்தேன்) பின்வரும் முறைகளில் தயாரிக்கலாம்.

i) எத்திலீனுடன் குளோரினின் சேர்க்கை வினை



எத்திலீன் — எத்திலீன் டைகுளோரைடு

ii) PCl_5 (அல்லது HCl), எத்திலீன் கிளைக்காலுடன் வினை



எத்திலீன் கிளைக்கால் — எத்திலீன் டைகுளோரைடு

பண்புகள்

இயற்பண்புகள்


(i) இவை இனிப்பு மணமுடையவை, நிறமற்ற திரவங்கள், அதிக கொதிநிலையைப் பெற்றுள்ளன.

(ii) எத்திலீன் டை குளோரைடைக் காட்டிலும் எத்திலீடின் குளோரைடின் கொதிநிலை அதிகம்.

வேதிப்பண்புகள்

1) நீர்த்த NaOH அல்லது பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்ஸைடுடன் நீராற்பகுப்பு.

ஜெம் டை ஹாலைடுகளை நீர்த்த KOH ஆல் நீராற்பகுக்கும் போது ஆல்டிஹைடு அல்லது கீட்டோனைத் தருகின்றது. விசினைல் டை ஹாலைடுகளை நீர்த்த KOH ஆல் நீராற்பகுக்கும் போது கிளைக்கால்களைத் தருகிறது.



எத்திலீன் டைகுளோரைடு — நிலையற்றது — அசிட்டால்டிஹைடு