18. $\frac{1-2x}{3+2x-x^2} = \frac{A}{3-x} + \frac{B}{x+1}$ எனில், $A+B$–ன் மதிப்பு

(1) $\frac{-1}{2}$ (2) $\frac{-2}{3}$ (3) $\frac{1}{2}$ (4) $\frac{2}{3}$

19. $(x+3)^4 + (x+5)^4 = 16$–ன் மூலங்களின் எண்ணிக்கை

(1) 4 (2) 2 (3) 3 (4) 0

20. $\log_3 11 \ \log_{11} 13 \ \log_{13} 15 \ \log_{15} 27 \ \log_{27} 81$–ன் மதிப்பு

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

## பாடத்தொகுப்பு (Summary)

- $\pi$ மற்றும் $\sqrt{p}$ ($p$ ஒரு பகா எண்) ஆகியவை விகிதமுறா எண்கள்.
- $|x-a| = r \iff r \geq 0$ மற்றும் $x-a = \pm r$.
- $|x-a| \leq r \iff -r \leq x-a \leq r$ அல்லது $a-r \leq x \leq a+r$.
- $|x-a| > r \implies x < a-r$ மற்றும் $x > a+r$ அல்லது $x \in (-\infty, a-r) \cup (a+r, \infty)$
- பொதுவாக அசமன்பாடுகள் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட தீர்வுகளை உடையது.
- தன்மைகாட்டி $D = b^2 - 4ac$ ஆனது $ax^2 + bx + c = 0$–ன் மூலங்களின் தன்மைகளைக் காட்டுகிறது.
- $a$ என்ற மெய்யெண் $f(x)$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையின் ஒரு பூஜ்ஜியமாக இருக்க, தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனை $(x-a)$ என்பது பல்லுறுப்புக் கோவை $f(x)$–ன் காரணியாக இருக்க வேண்டும்.
- $f(x)$–ன் படி $g(x)$–ன் படியை விடக் குறைவு எனில், $\frac{f(x)}{g(x)}$–ஐ அதன் பகுதி பின்னங்களின் கூடுதலாக எழுத இயலும்.
- பொதுவாக படிக்குறிச் சார்புகளும் மடக்கைச் சார்புகளும் ஒன்றுக்கு ஒன்று நேர்மாறு சார்புகளாகும்.



XI_Maths_Ch-2_V-1_TM.indd 107 11/11/2024 12:21:16