Type I

Integrals of the form $\int \frac{dx}{a^2 \pm x^2}$, $\int \frac{dx}{x^2 - a^2}$, $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 \pm x^2}}$, $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}}$

(i) $$\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \log \left| \frac{a + x}{a - x} \right| + c$$

(ii) $$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \log \left| \frac{x - a}{x + a} \right| + c$$

(iii) $$\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \left(\frac{x}{a} \right) + c$$

(iv) $$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \sin^{-1} \left(\frac{x}{a} \right) + c$$

(v) $$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \log \left| x + \sqrt{x^2 - a^2} \right| + c$$

(vi) $$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \log \left| x + \sqrt{x^2 + a^2} \right| + c$$

Proof

(i) Let $I = \int \frac{dx}{a^2 - x^2}$.

$$= \int \frac{dx}{(a - x)(a + x)}$$

$$= \frac{1}{2a} \int \left[\frac{1}{a + x} + \frac{1}{a - x} \right] dx \qquad \left\{ \begin{matrix} \text{Resolving into} \\ \text{partial fractions} \end{matrix} \right.$$

$$= \frac{1}{2a} \left[\log |a + x| - \log |a - x| \right] + c$$

$$= \frac{1}{2a} \log \left| \frac{a + x}{a - x} \right| + c$$

$$\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \log \left| \frac{a + x}{a - x} \right| + c$$

(ii) Let $I = \int \frac{dx}{x^2 - a^2}$.

$$= \int \frac{dx}{(x - a)(x + a)}$$

$$= \frac{1}{2a} \int \left[\frac{1}{x - a} - \frac{1}{x + a} \right] dx \qquad \left\{ \begin{matrix} \text{Resolving into} \\ \text{partial fractions} \end{matrix} \right.$$

11_11th-Maths-Vol2-Unit11.indd 214 16-12-2022 11:07:49