www.tntextbooks.in

சுரப்புப் பொருளும் இணைந்து **சக்கஸ் என்டரிகஸ்** (*succus entericus*) எனும் சிறுகுடல் நீரை உருவாக்குகின்றது.

சிறுகுடல் நீரில் உள்ள நொதிகளான **மால்டேஸ் லாக்டேஸ், சுக்ரேஸ்** (இன்வர்ட்டேஸ்), **டைபெப்டிடேஸ்கள், லிபேஸ்கள், நியூக்ஸியோசைடேஸ்**கள் ஆகியன பித்த நீர் மற்றும் கணையநீரால் செரிக்கப்பட்ட உணவின் மீது வினையாற்றுகின்றன.

மால்டோஸ் —மால்டேஸ்→ குளுக்கோஸ் + குளுக்கோஸ்

சுக்ரோஸ் —சுக்ரேஸ்→ குளுக்கோஸ் + ∴பிரக்டோஸ்

லாக்டோஸ் —லாக்டேஸ்→ குளுக்கோஸ் + காலக்டோஸ்


டைபெப்டைடுகள் டிரைபெப்டைடுகள் —பெப்டிடேஸ்→ அமினோ அமிலங்கள்

நியூக்ளிடைடுகள் —நியூக்ளியோடைடேஸ்→ நியூக்ளியோசைடு+ பாஸ்பாரிக் அமிலம்

நியூக்கிளியோசைடு —நியூக்கிளியோசைடேஸ்→ சர்க்கரை + நைட்ரஜன் காரங்கள்

டைகிளிசரைடுகள் மற்றும் மோனோகிளிசரைடுகள் —லிபேஸ்கள்→ கொழுப்பு அமிலங்கள் + கிளிசரால்

கணையத்திலிருந்து தோன்றும் கோழையும், பைகார்பனேட் அயனிகளும் உணவைக் காரத் தன்மை கொண்ட ஊடகமாக (pH – 7.8) மாற்றிச் செரிமான நொதிகள் செயல்பட ஏதுவான சூழலை உருவாக்குகின்றன செரித்தலின் முடிவில் உணவிலிருந்த அனைத்துப் பெரிய மூலக்கூறுகளும் அதனதன் சிறிய அலகுகளாக மாற்றப்படுகின்றன.



படம் 5.9 செரித்தல் மற்றும் உட்கிரகித்தல் செயல்முறைகள்