www.tntextbooks.in



படம் 11.14 முன் கழுத்துக் கழலை



படம் 11.15 அடிசனின் நோய்

முன் கழுத்துக் கழலை (Simple goitre)

இது **மண்டலக்கழலை** (*Endemic goitre*) என்றும் அழைக்கப்படும். இது தைராக்ஸின் சுரப்பு குறைவதால் ஏற்படுகின்றது. தைராய்டு சுரப்பி வீங்குதல், சீரத்தில் தைராக்ஸின் அளவு குறைதல், *TSH* சுரத்தல் அதிகரிப்பு ஆகியன முன் கழுத்துக் கழலையின் சில அறிகுறிகளாகும் (படம் 11.14).

அடிசனின் நோய் (Addison's disease)


இந்நிலை அட்ரினல் கார்டெக்ஸில் இருந்து குளுக்கோ கார்டிகாய்டுகள் மற்றும் தாதுகலந்த குறைதல், முடிச்சு உருவாதல், எலும்புகள் மென்மையாதல், தசைச்சுருக்க செயலிழப்பு, பொதுவான பலவீனம் மற்றும் சிறுநீரகக் கோளாறுகள் போன்றவை ஏற்படுகின்றன.

டெட்டனி (Tetany)

பாராதைராய்டு ஹார்மோன் (*PTH*) சுரப்பு குறைவதால் இந்நிலை ஏற்படுகின்றது. *PTH* குறைவதால் இரத்தத்தில் கால்சியத்தில் அளவு குறைகின்றது (*Hypocalcemia*). இதன் விளைவாக, இரத்தப் பாஸ்பேட் அளவு அதிகரித்து கால்சியம் மற்றும் பாஸ்பேட் சிறுநீரகத்தின் வழியே வெளியேறுவது குறைகின்றது. வலிப்பு, தாடைகள் கிட்டிப்போதல், மிகை இதயத்துடிப்பு வீதம், மிகை உடல் வெப்பநிலை, தசைஇறுக்கம் போன்றன டெட்டனி நோயின் அறிகுறிகள் ஆகும்.

ஹைபர்பாரா தைராய்டிசம் (Hyperparathyroidism)

இந்நிலை *PTH* அளவு இரத்தத்தில் உயர்வதால் தோன்றுகின்றது. இதனால், எலும்புகளில் தாதுப்புகள்



படம் 11.16 குஷிங்கின் குறைபாடு