www.tntextbooks.in

(Tachardia lacca) எனும் பூச்சியிலிருந்து அரக்கு தயாரிக்கப்படுகிறது. இப்பூச்சி முன்னர் ***லேக்சி:பர் லேக்கா*** *(Laccifer lacca)* என்று அழைக்கப்பட்டது. இப்பூச்சி மிகச்சிறிய பிசுபிசுப்பான ஊர்ந்து செல்லும் செதில் பூச்சி வகையை சார்ந்தது. இது தன்னுடைய நீண்ட உறிஞ்சுகுழலை தாவரத்தின் திசுக்களினுள் நுழைத்து தேவையான உணவை உறிஞ்சி வளரும். இது தன் உடலின் பின் முனையிலிருந்து சுரக்கும் அரக்கால் தனது உடலை மூடி பாதுகாப்பை ஏற்படுத்திக்கொள்ளும்.


கருங்காலி *(Acacia catechu)*, கருவேலை *(Acacia nilotica)* மற்றும் கும்பாதிரி *(Schleicchera oleosa)* ஆகியவை அரக்குப் பூச்சிகளின் ஓம்புயிரி தாவரங்களாகும். அரக்கின் தரமானது ஓம்புயிரி தாவரத்தின் தரத்தை சார்ந்தது. பெண் அரக்குப் பூச்சிகள் ஆண் பூச்சிகள் விட பெரியவை. பெண் பூச்சிகள் அதிகளவில் அரக்கு உற்பத்தி செய்கின்றன.

இனச் சேர்க்கையை தொடர்ந்து ஆண் பூச்சிகள் இறந்துவிடும். பெண்பூச்சிகள் வேகமாக வளர்ந்து கருவுருதலுக்குப் பின் 200 முதல் 500 முட்டைகளை இடும் (படம்13.7). ஆறு வாரங்களுக்குப் பின் முட்டை பொரிந்து லார்வாவாக மாறும். லார்வாக்கள் அனைத்தும் ஒரே நேரத்தில்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஒட்டுண்ணியாக வாழும் ஒரு உயிரியின் மீது மற்றொரு ஒட்டுண்ணி (இரண்டாம் நிலை ஒட்டுண்ணி) வாழுதல் அல்லது ஒட்டுண்ணி மேல் ஒட்டுண்ணியாக வாழும் தன்மை ஹைபர் பாரசைட்டிசம் எனப்படும்.

ஓம்புயிரி தாவரத்தை நோக்கி செல்லும் தன்மை **மொய்த்திரள்** அல்லது **ஸ்வார்மிங்** (swarming) எனப்படும். ஓம்புயிரி தாவரத்தில் நிலை கொண்ட லார்வாவானது தொடர்ந்து உண்டு அரக்கினை சுரக்க ஆரம்பிக்கும். நாளடைவில் லார்வா அரக்கினால் முழுமையாக மூடப்படும். பின்னர், அவற்றிற்கான அறையில் உருமாற்றமடையும். ஆண், பெண் அறைகள் மாறுபட்டு காணப்படுகின்றன. ஆண் அறைகள் நீண்ட வடிவிலும் பெண் அறைகள் வட்ட வடிவிலும் காணப்படும். சிலவகைப் பூச்சிகள் அரக்கு பூச்சிகளை உண்டு வாழும் தன்மையுடையனவாகும். இப்பூச்சிகளின் கம்பளிப்புழுக்கள் (caterpillars) அரக்குப்பூச்சிகளை உண்டு அவற்றின் மேல் ஒட்டுண்ணிகளாக வாழ்கின்றன. அவ்வாறு ஒட்டுண்ணியாக வாழும்



படம் 13.7 அரக்குப்பூச்சியின் வாழ்க்கை சுழற்சி