www.tntextbooks.in

சிப்பிகள், கையாண்டதில் ஏற்பட்ட அழுத்தத்திலிருந்து விடுபடுவதுடன் அவை ஆழமற்றநீர் சூழலுக்குஏற்பஉடற்செயலியலையும் மாற்றிக் கொள்கின்றன.

iii. உட்கருவை உள் நுழைத்தல்

இது உயிருள்ள சிப்பி ஒன்றில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு சிறு துண்டு மேன்டில் பகுதியை பொருத்தமான உட்கருவுடன் சேர்த்து பிரிதொரு உயிருள்ள சிப்பியின் திசுவிற்குள் நுழைத்தல் ஆகும். இந்நிகழ்ச்சி கீழ்காணும் படிநிலைகளைக் கொண்டது.

அ) தேர்ந்தெடுக்கப்படும் சிப்பியின் தகுதி : தேர்வு செய்யப்பட்ட சிப்பி நலமுடனும் உட்கரு நுழைத்தலின் போது ஏற்படும் அதிர்ச்சிகளைத் தாங்கத் தேவையான உறுதியுடனும் இருப்பது அவசியம்.

ஆ) ஒட்டுத்திசுவை தயார்படுத்துதல்: ஒட்டுத்திசு (*Graft*) என்பது சிப்பியின் மேன்டில் பகுதியின் உள்ளே நுழைக்கப் பயன்படும் சிறு திசுத்துண்டு ஆகும். ஒட்டுத் திசுவின் புற விளிம்புகள் வெளியே தெரியும் படி இருத்தல் அவசியமாகும். ஏனெனில், நேக்ரி சுரக்கும் செல்கள் மேன்டிலின் புற விளிம்பில் உள்ளன. எனவே ஒட்டுத்திசுவின் புற விளிம்பு நுழைக்கப்பட்ட உட்கருவுடன் ஒட்டி இருந்தல் அவசியமாகும்.

இ) உட்கரு தயாரித்தல்: ஏதேனும் ஒரு சிறிய துகளே முத்து உருவாக்கத்தைத் தூண்டும் உட்கருவாக செயல்பட போதுமானது. ஆனாலும், கால்சியப் பொருளால் ஆன உட்கருவே நாக்ரி பொருளை உருவாக்க சிறந்ததென தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏனெனில், கால்சியத்தினாலான உட்கருவின் மீது நேக்ரி அதிகளவில் படிவதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

ஈ) உட்கருவை உள்ளே நுழைத்தல்: உட்கருவை உள்ளே நுழைக்க, சிப்பியை மேஜை மீது வலது பக்க ஓடு மேலே இருக்கும்படி பொருத்திட வேண்டும். மேன்டில் மடிப்புகளை மெதுவாக விலக்கி பாதம் மற்றும் உடல் பகுதியை வெளிப்படுத்த வேண்டும். இதனைத் தொடர்ந்து பாதத்தின் எபிதீலியத்தில் மெலிதாக கீறி உடல் பகுதியில் சிறிய கால்வாய் அமைத்து உட்கருவுடன் திசு ஒட்டு செய்யப்பட வேண்டும், இது உட்கரு படுக்கையாகச் செயல்படுகின்றது.

உ) அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிந்தைய கவனிப்பு: உட்கரு உட்செலுத்தப்பட்ட சிப்பிகளைக் கூண்டுகளில் வைத்து மிதவையில் பொருத்தி கடல் நீரில் 2 முதல் 3 மீட்டர் ஆழத்தில் 6 முதல் 7 நாட்கள் வரை (இயல்பு நிலையை அடைய) தொங்க விட வேண்டும். இந்த காலத்திற்கு **மீட்சிக்காலம்** என்று பெயர். 3000 முதல் 3600 உட்கரு ஒட்டு செய்யப்பட்ட சிப்பிகளை வெவ்வேறு கூண்டுகளில் வைத்து 2 முதல் 3 மீட்டர் ஆழத்தில் 3 முதல் 6 வருடங்கள் வரை தொந்தரவு செய்யாமல் (பார்வையிடுதல் மற்றும் சுத்தம் செய்யும் காலம் தவிர) தொங்க விட வேண்டும்.

iv. முத்து அறுவடை செய்தல்

பொதுவாக முத்து அறுவடை டிசம்பர் மாதம் முதல் பிப்ரவரி மாதம் வரை மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. எனினும், தட்பவெப்ப நிலைக்கேற்ப இது மாறுபடுகிறது. 3 ஆண்டுகள் வளர்ச்சிக்குப்பின் முத்து அறுவடை செய்யப்பட்டு முத்துச்சிப்பிகளிலிருந்து முத்து வெளியே எடுக்கப்படுகிறது.

v.முத்துக்களை சுத்தப்படுத்துதல்:

சிப்பிகளில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட முத்துக்களை சோப்புக் கரைசலைக் கொண்டு நன்கு சுத்தம் செய்தல் அவசியம்.

முத்தின் பகுதிப்பொருட்கள்

நீர் : 2 – 4 %
கால்சியம் கார்பனேட் : 90%
கரிமப்பொருட்கள் : 3.5 – 5.9 %
கசடுகள் : 0.1 – 0.8 %

முத்தின் தரம்

முத்துக்கள் பல்வேறு வடிவங்களிலும் அளவுகளிலும் கிடைக்கின்றன. வெண்மை, இளமஞ்சள், வெளிர் சிவப்பு, இளம் சிவப்பு ஆகிய நிறங்களில் உள்ளது. வானவில் நிறத்தையுடைய கோள வடிவ முத்து அரிதாகக் காணப்படுகிறது. கடலில் இருந்து கிடைக்கும் உயர்தர முத்து லிங்கா முத்து ஆகும். நன்னீரில் இருந்து உருவாகும் முத்து கடல்நீரில் உருவாகும் முத்து போல் மதிப்புடையதல்ல (மிஷ்ரா 1961).