www.tntextbooks.in

(Teleomorph) என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. இரு நிலைகள் காணப்படும் பூஞ்சைகள் முழு உடலி (Holomorph) என்றும் கூறலாம்.

பொதுவாகப் பூஞ்சைகளின் பாலினப் பெருக்கத்தில் மூன்று படிநிலைகள் உள்ளன.

1. இரண்டு செல்களின் சைட்டோபிளாச இணைவு (Plasmogamy) 2. உட்கரு இணைவு (Karyogamy) 3. குன்றல் பகுப்பு (Meiosis) வழி ஒற்றைமடியவித்துகள் உண்டாதல்.

பூஞ்சையில் நடைபெறும் இனப்பெருக்க முறைகளுக்கான படம் 1.20-ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

1.5.3 பூஞ்சையில் நடைபெறும் இனப்பெருக்க முறைகள்

பாலிலா இனப்பெருக்கம்

1. இயங்குவித்துகள்: இவை இயங்கு வித்தகங்களில் (Zoosporangia) தோற்றுவிக்கப்படும் கசையிழையுடைய அமைப்புகளாகும். (எடுத்துக்காட்டு: *கைட்ரிடுகள்*)

2. கொனிடியங்கள்: கொனிடியத் தாங்கிகளின் மீது உருவாகும் வித்துகள். (எடுத்துக்காட்டு: *ஆஸ்பெர்ஜில்லஸ்*).

3. ஆய்டிய வித்துகள் (Oidia) / உடலவித்துகள் (Thallospores) / கணுவித்துகள் (Arthrospores): ஹைஃபாக்கள் பிளவுற்றுத் தோன்றும் வித்துகள் ஆய்டிய வித்துகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. (எடுத்துக்காட்டு: *எரிசைஃபி*).

4. பிளவுறுதல் (fission): உடலச் செல் பிளவுற்று இரண்டு சேய்செல்களைத் தருகிறது.(எடுத்துக்காட்டு: *சைசோசாக்கரோமைசிஸ் - ஈஸ்ட்*)

5. மொட்டுவிடுதல் (budding): பெற்றோர் செல்லிருந்து சிறிய மொட்டு போன்ற வளர்ச்சி தோன்றி அவை பிரிந்துச்சென்று தனித்து வாழ்கின்றன. (எடுத்துக்காட்டு: *சாக்கரோமைசிஸ் - ஈஸ்ட்*).

6. கிளாமிடவித்துகள் (Chlamydospores): தடித்த சுவருடைய ஓய்வுநிலை வித்துகளாகும்.. (எடுத்துக்காட்டு: *ஃபியு/சேரியம்*)

பாலினப்பெருக்கம்


1. இயக்கக் கேமீட்களின் இணைவு: (Planogametic copulation)

நகரும் தன்மையுடைய கேமீட்களின் இணைவிற்கு இயக்க கேமீட்களின் இணைவு என்று பெயர். இது மூன்று வகைப்படும்.


அ. ஒத்தகேமீட் இணைவு (Isogamy) – புறஅமைப்பு, செயலியலில் ஒத்த கேமீட்களின் இணைவு. (எடுத்துக்காட்டு: *சின்கைட்ரியம்*).

ஆ. சமமற்ற கேமீட் இணைவு (Anisogamy) - புறஅமைப்பு அல்லது செயலியலில் வேறுபட்ட கேமீட்களின் இணைவு. (எடுத்துக்காட்டு: *அல்லோமைசிஸ்*).


இ. முட்டை கருவுறுதல் (Oogamy) –




(அ) மொட்டுவிடுதல் – ஈஸ்ட்



(ஆ) பிளவுறுதல் – ஈஸ்ட்



(இ) கொனிடியங்கள் தோன்றுதல் – பெனிசிலியம்



(ஈ) உடல வித்து – எரிசைஃபி

(உ) கிளாமிடவித்து – ஃபியூசேரியம்