
www.tntextbooks.in




(அ) மார்ச்செல்லா




(ஆ) பெசைசா




(இ) கிளிஸ்டோதீசியம்



(ஈ) பெரிதீசியத்தின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம்



(உ) அப்போதீசியத்தின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம்



(ஊ) ஆஸ்கஸ் தோன்றுதலின் நிலைகள்

படம் 1.22: ஆஸ்கோமைசீட்களின்அமைப்பு மற்றும் இனப்பெருக்கம்

மற்றும் கடல்நீரிலும் வாழ்கின்றன.

- மைசீலியம்கிளைத்து,நன்குவளர்ச்சியடைந்து எளிய தடுப்புச்சுவரைப் பெற்றுள்ளது.
- பெரும்பாலானவை சாற்றுண்ணிகளாகவும், சில ஒட்டுண்ணிகளாகவும்அறியப்படுகின்றன (எடுத்துக்காட்டு: மாவொத்த பூசணங்கள் – எரிசை஻ஃபி).
- பாலிலா இனப்பெருக்கம் பிளவுறுதல், மொட்டுவிடுதல், ஆய்டியவித்துகள் (Oidia), கொனிடியங்கள், கிளாமிடவித்துகள் (Chlamydospores) வழி நடைபெறுகிறது.
- இரண்டு ஒத்தஉட்கருக்கள் இணைவதன் வழி பாலினப்பெருக்கம் நடைபெறுகிறது.
- சைட்டோபிளாச இணைவைத் தொடர்ந்து உட்கரு இணைவு உடனே நடைபெறுவதில்லை. பதிலாக இரட்டைஉட்கருநிலையிலேயே (Dikaryotic) நீண்ட காலம் ஹை஻பாக்கள் காணப்படுகின்றன.
- ஆஸ்கஸ் உருவாக்கச் சிறப்பு ஹை஻பாக்கள் (Ascogenous hyphae) தோன்றுகின்றன.
- ஆஸ்கஸ் உருவாக்க ஹை஻பாக்களின் நுனி பின்புறமாக வளைந்து கொக்கி போன்ற அமைப்புடைய செல்லினைத் தோற்றுவிக்கிறது. இதற்குக் கொக்கி செல்