
www.tntextbooks.in


வெளியேறி நீரில் மிதந்து சாதகமான வளர்தளத்தை அடைந்தவுடன் இரண்டு செல்களாக பகுப்படைந்து அதில் அடிப்புறச் செல்



(அ) இயங்குவித்து தோன்றுதல்



(ஆ) குட்டை ஆண்கிளை



(இ) குட்டை ஆண்கிளை

படம் 2.6 : ஊடோகோணியத்தின் இனப்பெருக்கம்

பற்றுறுப்பாகவும் பசுமையான மேற்புறச் செல் இழை உடலத்தையும் தோற்றுவிக்கிறது (படம் 2.6)

ஊடோகோணியத்தில் முட்டைகருவுறுதல் முறையில் பாலினப் பெருக்கம் நடைபெறுகிறது. ஆண் கேமீட்டகம் ஆந்திரீடியம் எனவும், பெண் கேமீட்டகம் ஊகோணியம் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. பாலின உறுப்புகள் காணப்படுவதின் அடிப்படையில் ஊடோகோணியம் கீழ்கண்ட இரண்டு சிற்றினங்களாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அவை (*i*) பெருஆண் சிற்றினங்கள் (*Macrandrous*) (*ii*) குட்டைஆண் சிற்றினங்கள் (*Nannandrous*)

பெருஆண் இருபால்வகை (Macrandrous monoecious)

இவ்வகை சிற்றினங்களில் ஆந்திரீடியங்களும், ஊகோணியங்களும் ஒரே உடலிழையில் அமைந்துள்ளன. எடுத்துக்காட்டு: *ஊடோகோணியம் ஃபிரஜைல்* (*Oedogonium fragile*).

பெருஆண் ஒருபால்வகை (Macrandrous dioecious)

இவ்வகை சிற்றினங்களில் ஆந்திரீடியங்களும், ஊகோணியங்களும் வெவ்வேறு உடலிழைகளில் அமைந்துள்ளன. எடுத்துக்காட்டு: *ஊடோகோணியம் கிராசம்* (*Oedogonium crassum*).

குட்டைஆண் தாவர சிற்றினங்கள் (Nannandrous species)

குட்டை ஆண்வகை இழைகளில் வளர்ச்சி குன்றிய ஆண் இழைகளான குட்டை ஆண்தாவரங்கள் தோன்றுகின்றன (*ஊ. கான்கட்டாநேட்டம்*). இச்சிற்றினங்களில் ஆந்த்ரிடியங்கள் இரண்டு முதல் நான்கு செல்களைக் கொண்ட இழைகளிலிருந்து தோன்றுகிறது. இவை ஆண்வித்தகத்திலிருந்து (*Androsporangium*) வெளியேறும் ஆண்வித்துகளிலிருந்து (*Androspores*) தோன்றுகிறது. ஆண்வித்தகமும் ஊகோணியமும் ஒரே இழையில் தோன்றினால் அது 'பெண் ஆண் வித்தகம்' (*Gynandrosporous*) எனப்படும். எடுத்துக்காட்டு: *ஊ.கான்கட்டாநேட்டம்*. இவை வெவ்வேறு இழைகளில் தோன்றுமாயின் 'தனி ஆண்பெண் வித்தகம்' (*Idioandrosporous*) எனப்படும்.எடுத்துக்காட்டு:*ஊ.கான்ஃபிரேட்டம்*.