www.tntextbooks.in

நுண்வித்தகத்திலுள்ள நுண்வித்துதாய்செல் குன்றல் பிளவுற்று ஒற்றைமடிய நுண்வித்துகளைத் தருகிறது. இதேபோல் பெருவித்தக தாய்செல் குன்றல் பகுப்படைந்து நான்கு பெருவித்துகளைத் தருகின்றன. நுண்வித்து மற்றும் பெருவித்து முறையே ஆண் மற்றும் பெண் கேமீட்டகத்தாவரத்தை குறிக்கிறது. மேலும் இவை வித்தகத்தினுள் இருக்கும்போது முளைக்கிறது. நுண்வித்துகள் இரு கசையிழையுடைய நகரும் ஆண் கேமீட்டுகளைத் தருகிறது. பெருவித்து ஆர்க்கிகோணியத்தைத் தருகிறது. நகரும் ஆண் கேமீட் நீரில் நீந்தி ஆர்க்கிகோணியத்தை அடைகின்றது. ஆண் மற்றும் பெண் கேமீட்டுகள் இணைத்து கருவுறுதல் நடைபெற்று உருவாகும் இரட்டைமடிய கருமுட்டை வித்தகத்தாவரத்தின் முதல் செல்லாகும். இது பல குன்றலில்லா பகுப்பிற்கு உட்பட்டு கருவாக மாறி, பின் வளர்ந்து முதிர்ந்த வித்தகத்தாவரமாகிறது.

செலாஜினெல்லாவின் வாழ்க்கைச்சுழற்சியில் வித்தகத்தாவர, கேமீட்டகத்தாவர சந்ததிகள் மாறி மாறி தோன்றுவதால் தெளிவான சந்ததிமாற்றம் காணப்படுகிறது.

2.5.5 அடியாண்டம்

பிரிவு – டீராப்சிடா

வகுப்பு–லெப்டோஸ்போராஞ்சியாப்சிடா

துறை:. – பிலிக்கேல்ஸ்

குடும்பம் – பாலிபோடியேசி

பேரினம் – அடியாண்டம்

அடியாண்டம் பொதுவாக 'மங்கையர் கூந்தல் பெரணி (Maiden hair fern) அல்லது 'நடக்கும் பெரணி (Walking fern) என அழைக்கப்படுகிறது. உலகின் வெப்பமண்டலமற்றும்மிதவெப்பமண்டலப்பகுதிகளில் பரவிக் காணப்படுகின்றன. அடியாண்டம் கேப்பில்லஸ்-வெனிரிஸ், அ. பெடேட்டம், அ. காடேட்டம், அ.வெனுசுட்டம் ஆகியவைஇந்தியாவில் பொதுவாக காணப்படும் சில சிற்றினங்களாகும். வித்தகத்தாவரம் வேர், மட்நிலத்தண்டு, இலைகள் என வேறுபாடைந்துள்ளது(படம்2.31).

புறஅமைப்பு

மட்டநிலத்தண்டு (Rhizome)


மட்டநிலத்தண்டு கவட்டைக்கிளைத்தல் (Dichotomous) கொண்ட, பல்லாண்டு வாழக்கூடிய தரைக்கீழ்ப் பகுதியாகும். அடியாண்டம் கேப்பில்லஸ்-வெனிரிஸில் இது படரும்தன்மை கொண்டும் அ. காடேட்டத்தில் நிமிர்ந்ததன்மை கொண்டும் காணப்படுகிறது. இது நிலைத்த இலையடிப் பகுதிகளாலும் ரமெண்டா (Ramenta) எனப்படும் மயிரிழை போன்றபுறத்தோன்றிகளாலும்மூடப்பட்டுள்ளது.

வேர்

மட்டநிலத்தண்டிலிருந்து வேற்றிட வேர்கள் தோன்றுகின்றன.

இலை

இலைகள் 'ப்ராண்டுகள்' (Fronds) எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. இவை சிறகு கூட்டிலைகளைக் கொண்டுள்ளன. (ஒருமடிக்கூட்டிலை (Unipinnate) – அ. காடேட்டம், இருமடிக்கூட்டிலை (Bipinnate)– அ. கேப்பில்லஸ்-வெனிரிஸ்). இளம் இலைகள் அச்சுநோக்கிசுருண்ட அமைப்பில் (Circinate vernation) உள்ளன. நீண்ட, கரிய நிறம், பளபளப்பான இலைக்காம்பு காணப்படுகிறது. அனைத்து சிற்றினங்களிலும் நரம்பமைவு கவட்டைக்கிளைத்தல் முறையில் பிரிந்து விசிறி போல் இலைத்தாள் முழுவதும் பரவியுள்ளது. இலை விளிம்புகளில் போலி இன்டூசியத்தால் சூழப்பட்ட வித்தகத்தொகுப்புகள் (Sori) காணப்படுகின்றன.



படம் 2.31 : அடியாண்டம் வளரியல்பு