

வித்தகங்கள் திரண்டு வித்தகத் தொகுப்பை உருவாக்குகின்றன. வித்தகத்தொகுப்பு விளிம்பில் அமைந்துள்ளது. இருப்பினும் இறகு சிற்றிலையின் விளிம்பு பின்புறமாக மடிந்து சவ்வு போன்ற அமைப்பை ஏற்படுத்துகிறது. இது **போலி இண்டூசியம்** (*False indusium*) என அறியப்படுகிறது.



படம் 2.35 : அடியாண்டம் ஸ்போரகயிலையின் நீள் வெட்டுத்தோற்றம்

இவை வித்தகத்தொகுப்பினை பாதுகாக்கின்றன (படம் 2.35). வித்தகத்தின் வளர்ச்சிமுறை மெலிவித்தக வகையைச் சார்ந்தது (*Leptosporangiate*).

வித்தகத்தொகுப்பு எந்த ஒரு ஒழுங்கமைவையும் கொண்டிராததால் கலப்பு வகையைச் சார்ந்தது. முதிர்ந்த வித்தகம் பல செல்களாலான காம்பினையும் ஓரடுக்கு செல்களாலான கோள அல்லது நீள்முட்டைவடிவ வெடிவித்தகத்தையும் கொண்டுள்ளது. வெடிவித்தகம், தடித்த சுவரைக் கொண்ட அனுலஸ் மற்றும் மெல்லிய சுவரைக் கொண்ட **'ஸ்டோமியம்'** ஆகிய பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது. முதிர்ந்த பின் வித்தகம் வெடித்து வித்துகளை வெளியேற்றுகின்றன. வித்துகள் முளைத்து பல குன்றலில்லா பகுப்பிற்குட்பட்டு முன்உடலத்தை உருவாக்குகின்றன. **முன்உடலம்** (*Prothallus*) தட்டையாக பசுமை நிறத்துடன் இதய வடிவில் காணப்படும். இது ஒருபால் உடலத்தன்மை பெற்று, கேமீட்டக தாவர நிலையை குறிக்கிறது. ஆந்திரீடியங்கள், ஆர்க்கிகோணியங்கள் ஆகிய பாலுறுப்புகள் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. ஆந்திரீடியத்திலிருந்து வெளியேறும் பலகசையிழைகள் கொண்ட நகரும் ஆண்கேமீட்கள் நீரில் நீந்தி ஆர்க்கிகோணியத்தில் உள்ள முட்டையை அடைந்து கருவுறுதல் நடைபெறுகிறது. கருவுறுதலினால் உருவாகும் கருமுட்டை (*2n*) வித்தகத்தாவர சந்ததியின் முதல் செல்லாகும். கருமுட்டை கருவாக வளர்ச்சியடைந்து, மேலும் வேறுபாடடைந்து,



படம் 2.36 : அடியாண்டத்தின் வாழ்க்கைச் சுழற்சி