www.tntextbooks.in

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

- **பசுமையானஇலைகள்:** இவைபசுமையான,தட்டையான,பக்கவாட்டுவளரிகள் ஆகும்.இது தண்டு அல்லது கிளைகளின் கணுப்பகுதியிலிருந்து உருவாகின்றன.
- **காட்டிலிடன்ஸ்அல்லதுவிதையிலைகள்:** இவை விதையின் கருஅச்சில் ஒட்டியவையாகும். பொதுவாக விதை முளைத்தலின்போது பசுமையாக மாறி இலை போன்ற அமைப்பாக மாறுகிறது.

- **காட்டோஃபில்ஸ் அல்லது செதில் இலைகள்:** இலைகள் சிறுத்துச் செதில்களாகவும், காம்பற்றும், சில சமயங்களில் பழுப்பு நிறத்துடனும் காணப்படுகிறது. இவை மொட்டுகள் மீதமைந்த செதில்கள், ரைசோம் மீதமைந்த செதில்கள் (மட்ட நிலத்தண்டு) மற்றும் தாவரத்தின் மற்ற சில பகுதிகளில் அமைந்த செதில்கள் (மூங்கில்) ஆகும்.
- **புரோஃபில்கள்:** விதை முளைத்தவுடன் தோன்றும் முதல் இலைகளுக்குப் புரோஃபில்கள் என்று பெயர்.
- **பூவிலைகள்:** பூக்களின் பாகங்களை உருவாக்குபவை. மலரின் பாகங்களில் இரண்டு துணைபாகங்கள் (புல்லிவட்டம், அல்லிவட்டம்), இரண்டு முக்கிய பாகங்கள் (மகரந்தத்தாள் வட்டம், சூலக வட்டம்) இலையின் உருமாற்றுகளே ஆகும்.
- **ஹிப்சோஃபில் அல்லது பூவடிச் செதில் இலைகள்:** இவ்வகை இலைகள் மலர் அல்லது மஞ்சரியை அதன் அச்சில் சூழ்ந்து காணப்படுபவை ஆகும். இந்த இலைகளின் முக்கியபணி பூக்கள் மொட்டாக இருக்கும்போது பாதுகாப்பதாகும்.

III.இலைப்பரப்பு / இலைத் தாள் (Lamina / Leaf blade)

இலையின் விரிவாக்கப்பட்ட, தட்டையான, பசுமையான பகுதி இலைப்பரப்பு அல்லது இலைத் தாள் எனப்படும். இது ஒளிச்சேர்க்கை, வளி பரிமாற்றம், நீராவிப்போக்கு மற்றும் தாவரங்களின் பல வளர்ச்சிதைமாற்ற வினைகளின் இருப்பிடமாக உள்ளது. இலைத்தாளின் மையத்தில் மையநரம்பும், அதிலிருந்து பல பக்கவாட்டு நரம்புகளும், இவற்றிலிருந்து பல மெல்லிய சிறிய நரம்புகளும் பரவியிருக்கின்றன. இலைத்தாளானது வடிவம், விளிம்பு, பரப்பு, தன்மை, வண்ணம், நரம்பமைவு, பிளவுகள் போன்றவற்றில் வேறுபாடுகளைக் கொண்டுள்ளது.

இலையடிச் செதில்கள் (Stipules)

பெரும்பாலான இருவிதையிலைத் தாவரங்களில் இலையடிப்பகுதி ஒன்று அல்லது இரண்டு பக்கவாட்டு வளரிகளைக் கொண்டுள்ளது. இந்தப் பக்கவாட்டு வளரிகளுக்கு **இலையடிச் செதில்கள்** என்று பெயர். இந்தப் பக்கவாட்டு வளரிகளைக் கொண்ட இலைகள் **இலையடிச் செதில் உள்ளவை** (*Stipulate*) என்றும், பக்கவாட்டு வளரிகள் அற்ற இலைகள் **இலையடிச் செதிலற்றவை** (*Exstipulate or Estipulate*) என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.

இலையடிச் செதில்கள் பொதுவாக இருவிதையிலைத் தாவரங்களில் காணப்படுகின்றன. சில வகையான புற்களில் (ஒருவிதையிலைத் தாவரம்) இலையடிப் பகுதிக்கும், இலைப்பரப்பிற்கும் இடையில் ஒரு துணைவளரி காணப்படுகிறது. இதற்கு **லிக்யூல்** (*Ligule*) என்று பெயர். சில சமயம் சிறிய இலையடிச் செதில் போன்ற வளரிகள் கூட்டிலையின் சிற்றிலைகளின் அடிப்பகுதியில் காணப்படுகின்றன, இதற்கு **சிற்றிலையடிச்செதில்கள்** (*Stipels*) என்று பெயர். மொட்டில் உள்ள இலையைப் பாதுகாப்பதே இலையடிச்செதிலின் முக்கியப் பணியாகும்.

3.7.2 நரம்பமைவு (Venation)

இலைத்தாள் அல்லது இலைப்பரப்பில் நரம்புகளும், கிளை நரம்புகளும் அமைந்திருக்கும் முறைக்கு **நரம்பமைவு** என்று பெயர். உள்ளமைப்பில் நரம்புகள் வாஸ்குலத் திசுக்களைப் பெற்றுள்ளன.

வழக்கமாக நரம்பமைவு இரண்டு வகையாக வகைப்படுத்தப்படும். அவை முறையே வலைப்பின்னல் நரம்பமைவு, இணைப்போக்கு நரம்பமைவு ஆகும்.