www.tntextbooks.in

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

தற்காலத்திய புற அமைப்பியலாளர்களான ஹிக்கி (1973), ஹிக்கி மற்றும் உல்ஃப் (1975) ஆகியோர் கீழுள்ள முக்கிய நரம்பமைவு வகைப்பாடுகளை முதல் நிலை, இரண்டாம் நிலை மற்றும் மூன்றாம் நிலை நரம்பமைவு அடிப்படையில் விவரித்துள்ளனர். அவை பின்வருமாறு:

- **கிராஸ்பிடோட்ரோமஸ் (Craspedodromous):** இதில் இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் இலை விளிம்பில் முடிவுறுகின்றன. (துணை வகைகள்; எளிய கிராஸ்பிடோட்ரோமஸ், பாதி கிராஸ்பிடோட்ரோமஸ், கலப்பு கிராஸ்பிடோட்ரோமஸ்)

- **கேம்ப்டோட்ரோமஸ் (Camptodromous):** இதில் இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் இலை விளிம்பில் முடிவுறுவதில்லை. (துணை வகை: பிராக்கிடோட்ரோமஸ், யூகேம்டோட்ரோமஸ், கிளாடோட்ரோமஸ், ரெட்டிகுளோட்ரோமஸ்)

- **ஹைப்ஃபோட்ரோமஸ் (Hyphodromous):** இதில் முதல்நிலை நடு நரம்பு மட்டும் தெளிவாகக் காணப்பட்டு, இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் இல்லாமலோ அல்லது சிறுத்தோ அல்லது இலையிடைத்திசுவில் மறைந்தோ காணப்படும்.

- **பேர்லலோட்ரோமஸ் (Parallelodromous):** இதில் முதல் நிலை அல்லது இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் ஒன்றோடொன்று இணையாக அமைந்து இலையின் நுனியில் குவிகின்றன.

- **ஆக்டினோட்ரோமஸ் (Actinodromous):** இதில் மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட முதல்நிலை நரம்புகள் ஒரு புள்ளியிலிருந்து பரவி அமைந்திருக்கின்றன.

- **பேலினோஆக்டினோட்ரோமஸ் (Palinoactinodromous):** இது ஆக்டினோட்ரோமஸ் போன்றே காணப்பட்டாலும் முதல்நிலை நரம்புகள் கிளைகளைப் பெற்றுப் பிளவுற்று முதல் நிலை புள்ளிக்கு மேல் காணப்படுகிறது.

- **ஃப்ளபெல்லேட் (Flabellate):** இதில் பல சமஅளவுள்ள நுண்ணிய கிளைகளுடன் கூடிய நரம்புகள் இலையின் நுனிநோக்கி அமைந்திருக்கும்.

- **கேம்பைலோட்ரோமஸ் (Campylodromous):** இதில் பல முதல்நிலை நரம்புகள் தெளிவாகச் சென்று அடிப்புறத்தில் மீண்டும் வளைந்து நுனிநோக்கிக் குவிந்திருக்கும்.

- **அக்ரோட்ரோமஸ் (Acrodromous):** ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட முதல்நிலை நரம்புகள் இலையின் நுனி நோக்கிக் குவிந்த வளைவுகளுடன் காணப்படுகின்றன.

2.அங்கை வடிவ இணைப்போக்கு நரம்பமைபு – பல நடு நரம்பமைவு (Palmate parallel venation – Multicostate)

இவ்வகை நரம்பமைவில் காம்பின் நுனியிலிருந்து (இலைப்பரப்பின் அடியிலிருந்து) பல நரம்புகள் தோன்றி, பின் ஒன்றுக்கொன்று இணையாகச் சென்று நுனியில் கூடுகின்றன. இவை இரண்டு வகைப்படும்.

i. விரி நரம்பமைவு வகை (Divergent): இவ்வகை நரம்பமைவில் அனைத்து முக்கிய நரம்புகளும் இலைப்பரப்பின் அடியிலிருந்து உருவாகி விளிம்பை நோக்கி விரிகின்றன. எடுத்துக்ககாட்டு: *பொராஸஸ் ஃபிளாபெல்லிஃபர்.*

ii. குவி நரம்பமைவு வகை (Convergent type): இவ்வகை நரம்பமைவில் அனைத்து முக்கிய நரம்புகளும் இலைப்பரப்பின் அடியிலிருந்து உருவாகி, இணையாகச் சென்று நுனியில் குவிகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: மூங்கில், நெல், வெங்காயத்தாமரை.

3.7.3 இலை அடுக்கமைவு (Phyllotaxy):

தண்டில் இலைகள் அமைந்திருக்கும் முறைக்கு இலை அடுக்கமைவு என்று பெயர். (*Greek – Phyllon = leaf; taxis = arrangement*). இலைகள் நெருக்கமாக அமைவதைத் தவிர்த்து ஒளிச்சேர்க்கைக்குத் தேவையான சூரிய ஒளி இலைகளில் அதிகமாக விழச்

434DYG