www.tntextbooks.in

உவர் நில மற்றும் வறண்ட நிலத்தில் வாழும் சில தாவரங்களும், கிராசுலேசி குடும்பத்தைச் சார்ந்த சில தாவரங்களும் பொதுவாகச் சதைப்பற்றுடன் கூடிய அல்லது தடித்த இலைகளைக் கொண்டுள்ளன. இந்தச் சதைப்பற்றுள்ள இலைகள் **நீரையும், மியூசிலேஜ் அல்லது உணவையும் சேமிக்கின்றன.** இவ்வகை இலைகள் வறட்சியைத் தாங்கும்தன்மையைப் பெற்றுள்ளன. எடுத்துக்காட்டு: *அலோ, அகேவ், பிரையோஃபில்லம், காலன்சியோ,* செடம், சுயேடா (உமரி), பிராசிக்கா ஒலரேசியா (வகை-கேபிடேட்டா).

V. இலைத்தொழில் காம்பு (Phyllode)

இலைத்தொழில் காம்பு என்பது தட்டையான, பசுமையான இலை போன்று உருமாற்றம் அடைந்த **இலைக்காம்பு அல்லது கூட்டிலைக் காம்பாகும்.** இவற்றில் சிற்றிலைகள் அல்லது இலையின் பரப்பு மிகவும் குறைந்துள்ளது அல்லது உதிர்ந்துவிடுகிறது. இந்த இலைத்தொழில் காம்பானது ஒளிச்சேர்க்கை மற்றும் இலையின் பல்வேறு வேலைகளை மேற்கொள்கின்றது. எடுத்துக்காட்டு: *அகேஷியா ஆரிகுலிஃபார்மிஸ்* (ஆஸ்திரேலிய அகேஷியா), *பார்கின்சோனியா.*

VI. குடுவை (Pitcher)

குடுவைத் தாவரத்திலும் *(நெப்பந்தஸ்),* *சர்ரசினியா* தாவரத்திலும் இலையானது குடுவை வடிவத்தில் மாறுபாடு அடைந்துள்ளது. நெப்பந்தஸ் தாவரத்தில் இலையின் அடிப்பகுதியானது (இலைக்காம்பு) இலைப்பரப்பாகவும், மைய நரம்பானது சுருள் கம்பி போன்று பற்றுக் கம்பியாகவும், இலையின் மேற்பரப்பானது குடுவையாகவும், இலை நுனியானது குடுவையை மூடும் மூடியாகவும் உருமாற்றமடைந்துள்ளது.

VII. பை (Bladder)

பிளேடர்வார்ட் (*யூட்ரிகுலேரியா*) ஒரு வேரற்ற, தனித்து மிதக்கும் அல்லது சற்றே மூழ்கி வாழும், மிகவும் பிளவுபட்ட இலைகளையுடைய தாவரமாகும். இந்தப் பிளவுப்பட்ட இலைகளின் சில பகுதிகள் பை போன்று உருமாற்றம் அடைகின்றன. பை போன்ற இந்த அமைப்புகள் நீர் மூலம் உள்ளே செல்லும் சிறு உயிரினங்களைப் பிடித்து உண்ணுகின்றன.

VIII. பூவிலைகள் (Floral leaves)

பூவிதழ்களான அல்லிவட்டம், புல்லிவட்டம், மகரந்தத்தாள் வட்டம், சூலக வட்டம் ஆகியவை அனைத்தும் இலையின் உருமாற்றங்களே ஆகும். துணை வட்டங்களாகக் கருதப்படும் அல்லிவட்டமும், புல்லிவட்டமும் இலையைப் போன்று தோற்றமளிக்கின்றன. இவற்றின் பணி பாதுகாத்தலாகும். இதில் அல்லிவட்டம் மகரந்தச் சேர்க்கைக்குப் பூச்சிகளைக் கவர்வதற்கேற்றவாறு பலவண்ணங்களில் காணப்படுகிறது. மகரந்தத்தூள்களைக் கொண்டுள்ள மகரந்தத்தாள் வட்டம் **சிறு வித்தக இலை** (மைக்ரோஸ்போரோஃபில்) என்றும், சூலிலைகளைக் கொண்டுள்ள சூலக வட்டம் **பெரு வித்தக இலை** (மெகாஸ்போரோஃபில்) என்றும் அழைக்கப்படும்.

3.7.7 அரும்பிலை மடிப்பு (Ptyxis)

அரும்பிலைகள் ஒவ்வொன்றும் சுருண்டு அல்லது மடிந்து இருப்பதைப் பின்வருமாறு விவரிக்கலாம்.

1. கீழ்நோக்கி வளைந்த மடிப்பு (Reclinate):

இலைப்பரப்பின் மேல்பாதியானது கீழ்ப்பாதியுடன் சுருண்டு, வளைந்து, மடிந்து காணப்படுகின்றது. எடுத்துக்காட்டு: *எரியோபாட்ரியா ஜபோனிகா (ஜப்பான் ப்ளம்).*

2. நீள்வாட்டில் நடுவே மடிந்தவை (Conduplicate):

இவற்றில் இலைகள் மைய நரம்பை நோக்கி நீள்வாக்கில் மடிந்துள்ளன. எடுத்துக்காட்டு: *பாஹீனியா.*

3. விசிறி அல்லது பின்னிய கூந்தல் போன்று மடிந்தவை (Plicate or plaited):

விசிறி அல்லது பனை இலை போன்று இலையானது நீள்வாக்கில் பலமுறை மடிந்து காணப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: *பொராசஸ் ஃபிளாபெல்லிஃபெர்.*

4. அச்சு நோக்கிச் சுருண்டவை (Circinate):

இலையானது நுனியிலிருந்து அடிநோக்கிச் சுருண்டு நாயின் வால் போன்று காணப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: பெரணிகள்.

5. திருகு அல்லது சுருண்ட வடிவில் மடிந்துள்ளவை (Convolute):

இலையின் ஒரு விளிம்புப்பகுதி அதன் மற்றொரு விளம்புவரை சுருண்டு காணப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: வாழை மற்றும் ஏரேசி குடும்பத் தாவரங்கள்.