www.tntextbooks.in

6. உட்சுருண்ட அல்லது வட்டமைய நோக்கி மடிந்தவை (Involute):

இலையின் இரு விளிம்புகளும் மேற்புறமாக மைய நரம்பை நோக்கிச் சுருண்டு அமைந்துள்ளது.

எடுத்துக்காட்டு: நீர் அல்லி, தாமரை, ரயில்கொடி (*ஆன்டிகோனான்*), *பிளம்பாகோ*.

7. கசக்கிய மடிப்பு (Crumpled):

இலைகள் ஒழுங்கற்ற முறையில் மடிந்து சுருண்டு காணப்படும். எடுத்துக்காட்டு: முட்டைக்கோஸ்.

3.7.8 இலையின் வாழ்நாள் (Leaf duration):

இலைகள் பெரும்பாலும் தாவரங்களில் தங்கியிருத்தல் மற்றும் அதன் பணிகளைப் பொறுத்து சில நாட்கள் முதல் பல வருடங்கள் வரை வாழும். இவை பெரும்பாலும் சூழ்நிலை காரணங்களின் தகவமைப்பினால் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன.

உடன் உதிர்பவை (Cauducous – Fagacious)

இவற்றில் இலைகள் உருவான உடனே உதிர்ந்துவிடும். எடுத்துக்காட்டு: *ஓபன்ஷியா, சிஸ்சஸ் குவாட்டிராங்குலாரிஸ்.*

முதிர் உதிர்பவை (Deciduous)

இவற்றில் இலைகள் வளரும் பருவத்தின் முடிவில் முதிர்ந்து உதிர்ந்துவிடுகின்றன. மரமோ, செடியோ குளிர்காலத்திலோ அல்லது கோடைகாலத்திலோ இலைகளற்றதாகக் காணப்படும். எடுத்துக்காட்டு: *மாப்பில், புளுமேரியா, லானியா, எரித்ரினா.*

பசுமை மாறாதவை (Evergreen):

இலைகள் சீரான இடைவெளிகளில் உதிர்வதால் இத்தாவரங்களில் இலைகள் எப்பொழுதும் நிலைத்திருக்கும். எனவே தாவரம் முழுவதுமாக இலையற்றுக் காணப்படுவதில்லை. எடுத்துக்காட்டு: *மைமூசாப்ஸ், கேலோஃபில்லம்.*

உதிரா இலைகள் (Marcescent):

ஃபேகேசி குடும்பத் தாவரங்களில் இலைகள் உலர்ந்து உதிராமல் தாவரத்திலேயே இருக்கும்.

3.7.9 இலைச்சீரமைவு (Leaf symmetry)

1. மேல்கீழ் வேறுபடு இலைகள் (Dorsiventral leaf):

இலையானது தட்டையாகவும், இலைப்பரப்பு கிடைமட்டமாகவும், மேற்பரப்பு மற்றும் கீழ்பரப்பு என வேறுபாடுகளுடன் காணப்படும். இவ்வகை இலைகள் **மேல்கீழ் வேறுபடு இலைகள்** எனப்படுகின்றன. இவ்விலைகள் பெரும்பாலும் இருவிதையிலைத் தாவரங்களில் காணப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: *ட்ரைடாக்ஸ்.*

2. இருபக்க ஒத்த அமைப்புடை இலைகள் (Isobilateral leaf):

இலையானது செங்குத்தாக மேல்நோக்கி அமைந்து காணப்படுமாயின் அவ்வகை இலைகளுக்கு **இருபக்கமும் ஒத்த அமைப்புடைய** இலைகள் என்று பெயர். இவ்வகை இலைகள் பெரும்பாலும் ஒருவிதையிலைத் தாவரங்களில் காணப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: புல்.

3. ஒற்றை மைய அல்லது மையப்படுத்திய அடர்ந்த இலைகள் (Centric leaf):

இலைகள் நெருக்கமாக மையத்தை நோக்கி, உருளை வடிவில், மேல்நோக்கியோ கீழ்நோக்கியோ அமைந்து காணப்படும். எடுத்துக்காட்டு: பைன், வெங்காயம்.

4. இரு வடிவ இலை அமைவு (Heterophylly):

ஒரே தாவரத்தில் இரண்டு வகையான இலைகள் காணப்பட்டால் அதற்கு **இரு வடிவ இலை அமைவு** என்று பெயர். இவை பெரும்பாலும் நீர்வாழ்த் தாவரங்களில் அதிகமாகக் காணப்படுகின்றன. இவற்றில் மிதக்கும் இலைகள், மேல்நோக்கி வளரும் இலைகள் மற்றும் மூழ்கிய இலைகள் எனப் பலவகையான இலைகள் காணப்படுகின்றன. மிதக்கும் இலைகள் பொதுவாக நன்றாக விரிந்து அகலமாகவும், பிரிவுகள் ஏதுமின்றி அல்லது மடல்களுடன் காணப்படுகின்றன. மூழ்கியுள்ள இலைகள் குறுகலாகவும், ரிப்பன் வடிவிலும், அதிக அளவு பிளவுபட்டும் காணப்படும். நீர்த் தாவரங்களில் காணப்படும் இந்த ஹெட்டிரோஃபில்லி பண்பானது இருவேறு சூழலுக்கேற்ற தகவமைப்புகளைக் கொண்டுள்ளது. எடுத்துக்காட்டு: *ரனன்குலஸ் அக்குவாடிலிஸ்*, நீர்வாழை (*அலிஸ்மா பிளான்டகோ*), அம்புத்தலை (*சாஜிட்டேரியா*), *லிம்னோஃபிலா ஹெட்டிரோஃபில்லா.*