www.tntextbooks.in



படம் 4.17: (அ)
மூவங்கமலர்.



படம் 4.17: (ஆ)
நான்கங்கமலர்.



படம் 4.17: (இ)
ஐந்தங்கமலர்.

2.**வேறுபட்ட அங்கமலர்** (*Anisomerous*): *மலரின் ஒவ்வொரு வட்டமும் வேறுபட்ட எண்ணிக்கையிலான மலர் உறுப்புகள் கொண்டவை. எடுத்துக்காட்டு: அன்னோனா.*

ஒத்த அங்கமலர்களை பின்வரும் வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்.

3. ஈரங்கமலர் (*Bimerous*): *மலரின் ஒவ்வொரு வட்டத்திலுமுள்ள பாகங்கள் இரண்டு அல்லது இரண்டின் மடங்கில் இருக்கும். எடுத்துக்காட்டு: இக்ஸோரா.*

4. மூவங்கமலர் (*Trimerous*): *மலரின் ஒவ்வொரு வட்டத்திலுமுள்ள பாகங்கள் மூன்று அல்லது மூன்றின் மடங்கில் இருக்கும். எடுத்துக்காட்டு: அல்லியம், மற்றும் ஒருவிதையிலைக்குடும்பத்தாவரங்கள்.*

5. நான்கங்கமலர் (*Tetramerous*): *மலரின் ஒவ்வொரு வட்டத்திலுமுள்ள பாகங்கள் நான்கு அல்லது நான்கின் மடங்கில் இருக்கும்.*

எடுத்துக்காட்டு: பிராசிக்கா ஜன்ஷியா.

6. ஐந்தங்கமலர் (*Pentamerouss*): *மலரின் ஒவ்வொரு வட்டத்திலுமுள்ள பாகங்கள் ஐந்து அல்லது ஐந்தின் மடங்காக இருக்கும். எடுத்துக்காட்டு: ஹைபிஸ்கஸ், இருவிதையிலைத் தாவரங்கள்.*

4.3.4. புல்லிவட்டம் (calyx)

புல்லிவட்டம் மலரை அதன் மொட்டுப் பருவத்தில் மூடிப் பாதுகாக்கிறது. மலரின் வெளி வட்டம் புல்லிவட்டமாகும். இது புல்லி இதழ்களால் ஆனது. பொதுவாக பச்சை வண்ணத்தில் காணப்படும்.

1. இணைவு: அ. இணையாப் புல்லிவட்டம் (*Aposepalous/ Polysepalous / chorisepalous*)

இணையாத புல்லி இதழ்கள் கொண்ட மலர்கள். எடுத்துக்காட்டு: பிராஸிக்கா, அன்னோனா.



படம் 4.18. (அ): இணையாப்புல்லிவட்டம்.



படம் 4. 18(ஆ): இணைந்த புல்லிவட்டம்.

ஆ. இணைந்த புல்லிவட்டம் (*Synsepalous/ Gamosepalous*): *இணைந்தபுல்லி இதழ்கள் கொண்ட மலர்கள். எடுத்துக்காட்டு: ஹைபிஸ்கஸ், டாட்டுரா.*

2. மலர்உறுப்புகளின் ஆயுட் காலம்

கத்திரிக்காயின் பச்சைநிறப் பாகம் என்ன? அதுபோல மற்ற கனிகளில் பார்த்திருக்கிறீர்களா?

அ. விரைவுதிர்பவை (*Caducous or fugacious*): *மலர் உருவாகும் ஆரம்ப நிலையிலேயே புல்லி இதழ்கள் உலர்ந்து உதிர்ந்து விடும். எடுத்துக்காட்டு: பப்பாவர்.*

ஆ. முதிர் உதிருபவை: *மலர் மலர்ந்தபின் அல்லி*