www.tntextbooks.in

பக்கப் பூவிதழ் தனித்துக் காணப்படுகிறது. இது பெரிதாகவும் மற்றும் மென்மையான சவ்வு போன்றும் உள்ளது. இது **சிற்றுதடு** (*Labellum*) என அழைக்கப்படுகிறது.

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: மகரந்தத்தாள்கள் 6, அடுக்கிற்கு 3 வீதம் இரு அடுக்குகளில் பூவிதழ்களுக்கு எதிராக அமைந்துள்ளன. 5 மகரந்தத்தாள்கள் மட்டுமே இனப்பெருக்கத்தன்மையுடையவை. உள் அடுக்கில் அச்சு நோக்கி மலட்டு மகரந்தத்தாள் காணப்படுகிறது அல்லது முற்றிலும் இல்லாமல் இருக்கும். மகரந்தப்பைகள் இரு அறைகளையுடையவை, நீள்வாக்கில் வெடிப்பவை, மகரந்தக்கம்பி இழை போன்றது. சில ஆண் மலர்களில் மலட்டுச் சூலகம் காணப்படும்.

சூலக வட்டம்: மூன்று சூலக இலைகளையுடையவை, இணைந்தவை, நடு சூலகம் அச்சு விலகி அமைந்துள்ளது. மூன்று சூலறைகளையுடையவை, கீழ்மட்டச் சூலகப்பையுடையவை, பல சூல்கள் அச்சு சூல் ஒட்டு முறையில் அமைந்துள்ளன. சூலகத் தண்டு இழை போன்றது. சூலக முடி மூன்று மடல்களை உடையது தடுப்புச்சுவர் தேன்சுரப்பி காணப்படுகிறது.

கனி: நீண்ட சதைக்கனி, சாகுபடி செய்யப்படும் பெரும்பாலான வாழைகளில் விதைகள் இல்லை.

மலர் சூத்திரம்:

ஆண் மலர்: $Br, Ebrl, \%, ♂, P_{(3+2)}+1, A_{3+3}, G_{0}$.

பெண் மலர்: $Br, Ebrl, \%, ♀, P_{(3+2)+1}, A_{0}, \underline{G}_{(3)}$.

இருபால் மலர்: $Br, Ebrl, \%, ☿, P_{(3+2)+1}, A_{3+3}, \underline{G}_{(3)}$.



என்சீட்டே வென்ரிகோஸம்



ஸ்டெரிலிட்சியா ரெஜினே



ராவனெலா மடகாஸ்காரியன்சிஸ்



ஹெலிக்கோனியா சிற்றினம்.

படம் 5.25: தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சில மியூசேசி குடும்பத்தாவரங்கள்