நூல் போன்ற ஸ்கிலிரைடுகள்(*Filiform sclereids*):

இவை ஓலியா யுரோப்பியா இலைத்தாளில் காணப்படும் ஸ்கிலிரைடுகள். இவை 1மி.மீ நீளமுள்ள நீண்ட நார்களைப் போன்றவை.




படம் 9. 8 ஸ்கிலிரங்கைமா காணப்படும் சில கனிகள்

அ. பேரிக்காய், ஆ. ஸ்ட்ராபெர்ரி, இ. கொய்யா

நார்கள் (Fibres)

நீண்ட, கூர்முனைகளைக் கொண்ட ஸ்கிலிரங்கைமா செல்கள் நார்கள் எனப்படும். நார்கள் குறுகிய செல் அறைகள், லிக்னின் செல் சுவர் ஆகியவை கொண்ட உயிரற்ற செல்களாகும். இவை எளிய குழிகளைக் கொண்டது. இவை தாங்கு திறனை அளிப்பதால் வலிமையான காற்றின் தாக்கத்திலிருந்து தாங்குகிறது. எனவே நார்கள் தாங்கு திசுக்கள் எனப்படும். நார்களானது குடிசை மற்றும் நெசவுத்தொழிலில் வணிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது.



படம் 9.9 நார்கள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம்

நார்கள் ஐந்து வகைப்படும். அவை,

1.சைலம் நார்கள் அல்லது கட்டை நார்கள் (*Wood fibres or xylary fibres*):

இரண்டாம் நிலை சைலத்துடன் இணைந்து காணப்படுகின்ற நார்கள் ஆகும். இவை **சைலம் இணைந்த நார்கள்** எனவும் அழைக்கப்படுன்றன. இவ்வகை நார்கள் வாஸ்குலக் கேம்பியத்திலிருந்து உருவாகின்றன. இவை நான்கு வகைப்படும்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

தாவரசெல்களில் மிக நீண்டது நார்கள். மிக நீண்ட நார்கள் போமிரியா (*Boehmeria*) ரேமி நார்கள் (*Ramie fibre*) ஆகும். இது 55 செ.மீ நீளமுடையது

அ) லிப்ரிபார்ம் நார்கள் (*Libriform fibres*): இந்த நார்கள் எளிய குழிகளுடன் கூடிய குறைவான லிக்னினை கொண்ட இரண்டாம் நிலை தடிப்புகளை கொண்டவை. இந்த நார்கள் நீண்டவை, குறுகியவை.

ஆ) நார் டிரக்கீடுகள் (*Fibre tracheids*): இவை லிப்ரிஃபார்ம் நார்களை விடக் குட்டையானவை மிதமான லிக்னினை கொண்ட இரண்டாம்நிலை தடிப்புகளைக் கொண்டவை. இவற்றில் எளிய அல்லது கிளைத்த குழிகளைக் கொண்டுள்ளன.

இ) குறுக்கு சுவருடைய நார்கள் (*Septate fibres*): இவ்வகை நார்களின் செல் அறையானது மெல்லிய குறுக்கு சுவரால் பிரிக்கப்பட்டு அறைகளாகக் காணப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு – தேக்கு

ஈ) இழுவை நார்கள் (*Gelatinous fibres*) : இவ்வகை நார்களின் செல் சுவர்களில் அதிக அளவு செல்லுலோஸ் மற்றும் குறைந்த அளவு லிக்னினை கொண்டுள்ளது. இவ்வகை நார்கள் இழுவிசைக் கட்டைகளில் (*tension wood*) முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. இது தண்டு மற்றும் கிளைகளில் மேல் பகுதியில் உண்டாகிறது.

2. பாஸ்ட் நார்கள் அல்லது சைலத்திற்கு வெளியே அமைந்த நார்கள் (*Bast fibres or extra xylary fibres*)

இவ்வகை நார்கள் ஃபுளோயத்தில் காணப்படுகின்றன. இயற்கையான பாஸ்ட் நார்கள் வலிமையானவை. செல்லுலோஸினால் ஆனவை. சணல் (*Jute*), புளிச்சகீரை , ஆளி விதைத்தாவரம் (*flax*), சணப்பை (*hemp*) போன்ற தாவரங்களில் ஃபுளோயம் அல்லது வெளிப்புறப் பட்டையிலிருந்து கிடைக்கிறது. இந்த ஃபுளோயம் நார்கள் தான் பெரிசைகிள் நார்கள் என்று முதன் முதலில் தவறாக அழைக்கப்பட்டவையாகும்.

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH9_TAMIL.indd 9 04-07-2018 16:33:10