

எ) கோந்துடன் கூடிய மரம்



ஏ) கோந்து

அரேபியக் கோந்து

ஒரு சின்னக் கோடாரியைக் கொண்டு ஆழமான குறுக்குக் கீறல்களை ஏற்படுத்தி, மெல்லிய கீற்றாக வெளிபட்டையானது கிழித்து எடுக்கப்படுகிறது. அதிலிருந்து கோந்து மெதுவாகக் கசிந்து பிசுபிசுப்பான திரவமாக வெளியேறுவதைத் துளிகளாகச் சேகரித்துக் கடினப்படுத்தப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: அக்கேசியா செனகல்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

*பெரிடெர்மை உள்ளடக்கிய இறந்த வெளிப்பட்டையையும், தொடர்ச்சியான இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியினால் உருவாக்கப்படும் புறணியும், ஃபுளோயம் திசுக்களையும் மொத்தமாகக் குறிக்கும் சொல் **ரிட்டிடோம் (rhytidome)** ஆகும். எடுத்துக்காட்டு: குர்கஸ்.*


பாலிடெர்ம் (polyderm) *வேர் மற்றும் தரைகீழ் தண்டுகளில் காணப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: ரோசேசி.பெரிடெர்மின் ஒரு வரிசையிலான சூபரின் படிந்த அடுக்குக்கு மாறாகப் பல அடுக்குகளாலான சூபரின் படிந்த செல்களைக் கொண்ட ஒரு சிறப்பு வகையான பாதுகாப்புத் திசு.*

பட்டைத் துளை (லெண்டி செல் – Lenticel)

*தண்டு மற்றும் வேர்களின் பட்டையின் புறப்பரப்பிலிருந்து சற்று உயர்ந்து காணப்படுகின்ற வாயில் அல்லது துளை **பட்டைத் துளை** எனப்படும்.*

*இது தண்டின் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியின் போது தோன்றுகிறது. ஃபெல்லோஜென் அதிகச் செயல்பாட்டுடன் இருக்கும் பொழுது பட்டைத் துளை பகுதியில், ஒரு திரளான நெருக்கமற்று அமைந்த மெல்லிய சுவர் கொண்ட பாரங்கைமா செல்கள் உருவாகின்றன. இதற்கு **நிரப்பிச் செல்கள்** அல்லது **நிரப்புத் திசு (complementary tissue or filling tissue)** என்று பெயர்.*

பட்டைத்துளைகள் வளிமப் பரிமாற்றமும் (Gas exchange) பட்டைத்துளை நீராவிப் போக்கும் (lenticular transpiration) செய்கின்றன.



படம் 10.16 பட்டைத் துளையின் அமைப்பு

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH10_TAMIL.indd 55 04-07-2018 16:46:59