www.tntextbooks.in

## ஒளிக்காலத்தின் அடிப்படையில் அமைந்த தாவரங்களின் வகைப்பாடு

ஒளிக்காலத்துவத்தின் முன்னோடிகள் கார்னர் மற்றும் அல்லார்டு (1920)






**நீள் பகல் தாவரங்கள்**

தீர்வுக்கட்ட ஒளிக்கால அளவைவிட மலர்தலுக்கு அதிக ஒளிக்காலம் தேவைப்படும் தாவரங்கள் நீள் பகல் தாவரங்கள் அல்லது குறு இருள் தாவரங்கள் எனப்படுகின்றன.

**குறு நீள்நாள் தாவரங்கள்**

இவைகள் நீள் நாள் தாவரங்கள் ஆனால் மலர்தலுக்காக ஆரம்ப வளர்ச்சி காலத்தில் குறைந்த ஒளி காலத்திற்கு உட்படுத்த வேண்டியுள்ளது. எடுத்துக்காட்டு: **கோதுமை, ரை**

ஒரு சில தாவரங்கள் அனைத்து ஒளிக் கால அளவிலும் மலர்தலை உருவாக்குகின்றன. இவை நாள் நடுநிலைத் தாவரங்கள் அல்லது வரம்பீடற்ற தாவரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: **உருளை, ரோடோடெண்ட்ரான்**

**நாள் நடுநிலை தாவரங்கள்**








**இடை நாள் தாவரங்கள்**

மலர்தலுக்காக நீண்ட நாள் மற்றும் குறு நாள் இவற்றிற்கிடையேயான ஒளி அளவு தேவைப்படும் தாவரங்கள்.


இவைகள் குறு நாள் தாவரங்கள் ஆனால் மலர்தலுக்காக ஆரம்ப வளர்ச்சி காலத்தில் அதிக ஒளி கால அளவிற்கு உட்படுத்த வேண்டும். எடுத்துக்காட்டு: பிரையோஃபில்லம் தாவரத்தின் சில சிற்றினங்கள், இரவு மல்லி ஆகியன.

**நீள் குறுநாள் தாவரங்கள்**



மலர்தலுக்காக குறைவான தீர்வுக்கட்ட ஒளி காலம் தேவைப்படும் தாவரங்கள் குறு நாள் தாவரங்கள் அல்லது நீள் இருள் தாவரங்கள் எனப்படும்

**குறு நாள் தாவரங்கள்**






XI BOTANY TAMIL-VOL 2 CH 15_TAMIL.indd 207 06-07-2018 14:43:08