

வினைவழி முறை



4) அம்மோனியா மற்றும் அதன் பெறுதிகளை சேர்த்தல்

அம்மோனியா மற்றும் அதன் பெறுதியான $H_2\ddot{N}$-G ஆகியவற்றை கார்பனைல் சேர்மத்துடன் சேர்க்கும்போது கருகவர் சேர்ப்பு வினை நிகழ்கிறது. கார்பனைல் ஆக்ஸிஜன் அணுவானது புரோட்டானேற்றம் பெற்று பின்னர் நீக்க வினைக்கு உட்படுவதால் கார்பன் – நைட்ரஜன் இரட்டை பிணைப்பு உருவாகிறது $\left(>C=N-G\right)$

இங்கு G என்பது –ஆல்கைல், அரைல், OH, NH_2, C_6H_5NH, $NHCONH_2$ போன்றவை



G	அம்மோனியா பெறுதி	கார்பனைல் பெறுதி	விளைபொருள் பெயர்
$-OH$	ஹைட்ராக்ஸிலமீன்	$>C=N-OH$	ஆக்சைம்
$-NH_2$	ஹைட்ரசீன்	$>C=N-NH_2$	ஹைட்ரசோன்
$-HN-C_6H_5$	பீனைல் ஹைட்ரசீன்	$>C=N-NH-C_6H_5$	பீனைல் ஹைட்ரசோன்

XII U12-Carbonyl Compounds.indd 163 16-12-2022 20:39:53