Proof

By property 3, we have

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = \int_{-a}^{0} f(x)\,dx + \int_{0}^{a} f(x)\,dx.$$

In the integral $\int_{-a}^{0} f(x)\,dx$, let us make the substitution, $x = -u$. Then, $dx = -du$.

When $x = -a$, we get $u = a$, when $x = 0$, we get $u = 0$, So, we get

$$\int_{-a}^{0} f(x)\,dx = \int_{a}^{0} f(-u)(-du) = \int_{0}^{a} f(-u)\,du = \int_{0}^{a} f(-x)\,dx = \int_{0}^{a} f(x)\,dx. \qquad \ldots (2)$$

Substituting equation (2) in equation (1), we get

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = \int_{0}^{a} f(x)\,dx + \int_{0}^{a} f(x)\,dx = 2\int_{0}^{a} f(x)\,dx.$$

Property 9

If $f(x)$ is an odd function, then $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0$.

(Recall that a function $f(x)$ is an odd function if and only if $f(-x) = -f(x)$.)

Proof

By property 3, we have

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = \int_{-a}^{0} f(x)\,dx + \int_{0}^{a} f(x)\,dx. \qquad \ldots (1)$$

Consider $\int_{-a}^{0} f(x)\,dx$. In this integral, let us make the substitution, $x = -u$. Then, $dx = -du$.

When $x = -a$, we get $u = a$; when $x = 0$, we get $u = 0$. So, we get

$$\int_{-a}^{0} f(x)\,dx = \int_{a}^{0} f(-u)(-du) = \int_{0}^{a} f(-u)\,du = \int_{0}^{a} f(-x)\,dx = -\int_{0}^{a} f(x)\,dx. \qquad \ldots (2)$$

Substituting equation (2) in equation (1), we get

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = \int_{0}^{a} f(x)\,dx - \int_{0}^{a} f(x)\,dx = 0$$

Property 10

If $f(2a - x) = f(x)$, then $\int_{0}^{2a} f(x)\,dx = 2\int_{0}^{a} f(x)\,dx$.

Proof

By property 7, we have

$$\int_{0}^{2a} f(x)\,dx = \int_{0}^{a} [f(x) + f(2a - x)]\,dx. \qquad \ldots (1)$$

Setting the condition $f(2a - x) = f(x)$ in equation (1), we get

$$\int_{0}^{2a} f(x)\,dx = \int_{0}^{a} [f(x) + f(x)]\,dx = 2\int_{0}^{a} f(x)\,dx.$$

Property 11

If $f(2a - x) = -f(x)$, then $\int_{0}^{2a} f(x)\,dx = 0$.

12th_Maths_Vol 2_EM_CH 9_App of Integration_17-02-20.indd 106 16-12-2022 16:38:30