2. The value of $\int_{-1}^{2}|x|\,dx$ is

(1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{3}{2}$ (3) $\frac{5}{2}$ (4) $\frac{7}{2}$

3. For any value of $n \in \mathbb{Z}$, $\int_{0}^{\pi} e^{\cos^2 x}\cos^3\left[(2n+1)x\right]dx$ is

(1) $\frac{\pi}{2}$ (2) π (3) 0 (4) 2

4. The value of $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 x\cos x\,dx$ is

(1) $\frac{3}{2}$ (2) $\frac{1}{2}$ (3) 0 (4) $\frac{2}{3}$

5. The value of $\int_{-4}^{4}\left[\tan^{-1}\left(\frac{x^2}{x^4+1}\right)+\tan^{-1}\left(\frac{x^4+1}{x^2}\right)\right]dx$ is

(1) π (2) 2π (3) 3π (4) 4π

6. The value of $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\left(\frac{2x^7-3x^5+7x^3-x+1}{\cos^2 x}\right)dx$ is

(1) 4 (2) 3 (3) 2 (4) 0

7. If $f(x)=\int_{0}^{x} t\cos t\,dt$, then $\frac{df}{dx}=$

(1) $\cos x - x\sin x$ (2) $\sin x + x\cos x$ (3) $x\cos x$ (4) $x\sin x$

8. The area between $y^2=4x$ and its latus rectum is

(1) $\frac{2}{3}$ (2) $\frac{4}{3}$ (3) $\frac{8}{3}$ (4) $\frac{5}{3}$

9. The value of $\int_{0}^{1} x(1-x)^{99}dx$ is

(1) $\frac{1}{11000}$ (2) $\frac{1}{10100}$ (3) $\frac{1}{10010}$ (4) $\frac{1}{10001}$

10. The value of $\int_{0}^{\pi}\frac{dx}{1+5^{\cos x}}$ is

(1) $\frac{\pi}{2}$ (2) π (3) $\frac{3\pi}{2}$ (4) 2π

11. If $\frac{\Gamma(n+2)}{\Gamma(n)}=90$ then n is

(1) 10 (2) 5 (3) 8 (4) 9

12. The value of $\int_{0}^{\frac{\pi}{6}}\cos^3 3x\,dx$ is

(1) $\frac{2}{3}$ (2) $\frac{2}{9}$ (3) $\frac{1}{9}$ (4) $\frac{1}{3}$

12th_Maths_Vol 2_EM_CH 9_App of Integration_17-02-20.indd 140 16-12-2022 16:42:37