14. $\sin^{-1}\left(2\cos^2 x-1\right)+\cos^{-1}\left(1-2\sin^2 x\right)=$

(1) $\frac{\pi}{2}$ (2) $\frac{\pi}{3}$ (3) $\frac{\pi}{4}$ (4) $\frac{\pi}{6}$

15. If $\cot^{-1}\left(\sqrt{\sin\alpha}\right)+\tan^{-1}\left(\sqrt{\sin\alpha}\right)=u$, then $\cos 2u$ is equal to

(1) $\tan^2\alpha$ (2) 0 (3) -1 (4) $\tan 2\alpha$

16. If $|x|\le 1$, then $2\tan^{-1}x-\sin^{-1}\frac{2x}{1+x^2}$ is equal to

(1) $\tan^{-1}x$ (2) $\sin^{-1}x$ (3) 0 (4) π

17. The equation $\tan^{-1}x-\cot^{-1}x=\tan^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ has

(1) no solution (2) unique solution

(3) two solutions (4) infinite number of solutions

18. If $\sin^{-1}x+\cot^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{\pi}{2}$, then x is equal to

(1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{1}{\sqrt{5}}$ (3) $\frac{2}{\sqrt{5}}$ (4) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

19. If $\sin^{-1}\frac{x}{5}+\operatorname{cosec}^{-1}\frac{5}{4}=\frac{\pi}{2}$, then the value of x is

(1) 4 (2) 5 (3) 2 (4) 3

20. $\sin(\tan^{-1}x), |x|<1$ is equal to

(1) $\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ (2) $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ (3) $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ (4) $\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$

12th_Maths_EM_Vol1_CH 4 Inverse Trigonometry.indd 168 16-12-2022 13:19:51