இடைநிலை பிரிவை கணக்கிடுதல்

$$N = 371, \left(\frac{N}{2}\right) = \left(\frac{371}{2}\right) = 185.5$$

எனவே இடைநிலை பிரிவு இடைவெளி = 20–25

சூத்திரம்

$$\text{இடைநிலை} = l + \frac{\frac{N}{2} - m}{f} \times c$$

l = இடைநிலை பிரிவின் கீழ்எல்லை மதிப்பு

N = மொத்த நிகழ்வெண்கள்

f = இடைநிலைப் பிரிவின் நிகழ்வெண்

m = இடைநிலைப் பிரிவுக்கு முந்தைய குவிவு நிகழ்வெண்

c = இடைநிலைப் பிரிவின் பிரிவு இடைவெளி

$$\text{இடைநிலை} = l + \frac{\frac{N}{2} - m}{f} \times c$$

$l = 20$, f $= 73.2$, m $= 183.3$, c $= 5$

$$\text{இடைநிலை} = 20 + \left(\frac{185.5 - 183.3}{73.2}\right) \times 5$$

$$\text{இடைநிலை} = 20 + \left(\frac{2.2}{73.2}\right) \times 5$$

$$\text{இடைநிலை} = 20 + (0.03 \times 5)$$

$$\text{இடைநிலை} = 20 + 0.15$$

விடை : இடைநிலை = 20.15

முகடு (Mode)

நிகழ்வெண் பரவலில் மிகப்பெரிய நிகழ்வெண்களை பெற்றுள்ள உறுப்பின் மதிப்பு முகடு எனப்படும்.

முகடு கணக்கிடுதல்

எடுத்துக்காட்டு 13.5

கீழ்க்காணும் தரவிற்கு முகடு காண்க.

நிலையம்: கொச்சின்

காற்றின் திசை	காற்றுவீசும் நாட்கள்(%)
வடக்கு	2
வடகிழக்கு	10
கிழக்கு	10
தென்கிழக்கு	6
தெற்கு	5
தென்மேற்கு	25
மேற்கு	5
வடமேற்கு	7
அமைதி	10