| நோயின் பெயர் | நோய்க்காரணி | அறிகுறிகள் | நோய் வெளிப்படும் காலம் |
|---|---|---|---|
| | | • சிறுநீர் கழிக்கும் போது வலி.<br>• மாதவிடாய் சுழற்சிகளுக்கிடையே இரத்தப்போக்கு<br>• தொடை இடுக்குகளின் நிணநீர் முடிச்சுகளில் வீக்கம் | |
| பிறப்புறுப்பு மருக்கள்<br>*(Genital warts)* | *மனித பாப்பிலோமா வைரஸ் (HPV)*<br>*(Human papilloma virus)* | • இன உறுப்புகளின் வெளிப்பகுதி, கருப்பைவாய், மலவாயைச் சுற்றிய பகுதிகளில் கடினமான புடைப்புகள் (கட்டிகள்) | *1 – 8 மாதங்கள்* |
| கல்லீரல் அழற்சி<br>*(Hepatitis–B)* | *ஹிபாடிடிஸ் – B வைரஸ் (HBV)*<br>*(Hepatitis –B Virus)* | • சோர்வு, மஞ்சள் காமாலை, காய்ச்சல், தோல் தடிப்பு, வயிற்று வலி,<br>• கல்லீரல் இறுக்கம், இறுதி நிலையில் கல்லீரல் செயலிழப்பு | *30 – 80 நாட்கள்* |
| எய்ட்ஸ் *(AIDS)* | *மனித தடைகாப்பு குறைப்பு வைரஸ் (HIV)* | • நிணநீர் முடிச்சுகள் பெரிதாதல், நீண்டநாள் காய்ச்சல், நீண்டநாள் வயிற்றுப்போக்கு, உடல் எடை குறைதல், இரவில் வியர்த்தல், | *2 – 6 வாரங்கள் முதல் 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலும்.* |
| **பூஞ்சை பால்வினைத் தொற்று** (Fungal STI) | | | |
| கேன்டிடியாஸிஸ்<br>*(Candidiasis)* | *கேன்டிடா அல்பிகன்ஸ்*<br>*(Candida albicans)* | • வாய், தொண்டை, குடற்பாதை மற்றும் கலவிக்கால்வாய் ஆகிய பகுதிகளில் தாக்கம்.<br>• கலவிக்கால்வாயில் அரிப்பு (அ) புண்கள்<br>• கலவிக்கால்வாய் திரவம் மிகைப் போக்கு<br>• வலியுடன் சிறுநீர் கழித்தல் | – |
| **புரோட்டோசோவா பால்வினைத் தொற்று** (Protozoan STI) | | | |
| டிரைகோமோனியாசிஸ்<br>(Trichomoniasis) | *டிரைகோமோனாஸ் வாஜினாலிஸ்*<br>(*Trichomonas vaginalis*) | • கலவிக்கால்வாய் அழற்சி, பச்சை மஞ்சள் கலந்த கலவிக் கால்வாய் திரவ வெளிப்பாடு, அரிப்பு மற்றும் எரிச்சல் உணர்வு, சிறுநீர் வடிகுழல் அழற்சி, விந்தக மேல் சுருள் நாள அழற்சி, புரோஸ்டேட் சுரப்பி அழற்சி | *4–28 நாட்கள்* |



XII Std Biology-Zoology Chapter-3 TM.indd 42 27/12/2022 18:32:57