
அட்டவணை 7.7 இரத்தத்தில் உள்ள செல் பொருட்கள்

| செல்வகை | செல்களின் எண்ணிக்கை /µl | விழுக்காடு |
|---|---|---|
| இரத்தசிவப்பணுக்கள் | 4200,000 – 6500,000 | – |
| இரத்த வெள்ளையணுக்கள் | | |
| துகள்களற்ற வெள்ளையணுக்கள் | | |
| லிம்போசைட்டுகள் | 1500 – 4000 | 20–30 |
| மோனோசைட்டுகள் | 200–950 | 2–7 |
| துகள்உள்ள வெள்ளையணுக்கள் | | |
| நியூட்ரோபில்கள் | 2000–7000 | 50–70 |
| பேசோபில்கள் | 50–100 | <1 |
| இயோசினோபில்கள் | 40–500 | 2–5 |
| பிளேட்லெட்டுகள் | 150,000–500,000 | – |




படம் 7.14 நோய்த்தடைக்காப்பு மண்டலத்தின் செல்கள்

டென்ரைடிக் செல்கள் நீண்ட, மெல்லிய சவ்வின் நீட்சிகாலால் சூழப்பட்டு, நரம்பு செல்லின் டென்ரைட்டுகள் போலத் தோன்றுவதால் அவை அவ்விதம் அழைக்கப்படுகிறது. இவை எதிர் பொருள் தூண்டிகளை T-ஹெல்பர் செல்களிடம் வழங்குகிறது. நான்கு வகையான டென்ரைட்டு செல்கள் அறியப்பட்டுள்ளன. அவையாவன லாங்கர்ஹான்கள், இடையீட்டுச் செல்கள், மைலாய்டு மற்றும் லிம்ப்பாய்டு செல்களாகும்.

லிம்போசைட்டுகள் மட்டுமே. இலக்கற்ற தடைகாப்பு துலங்கல், எதிர்பொருள் தூண்டிகளை முன்னிலைப்படுத்துதல் மற்றும் சைட்டோகைன் உற்பத்தி ஆகியவற்றை இரத்தத்திலுள்ள பிறவகை வெள்ளையணுக்கள் செய்கின்றன.

### லிம்போசைட்டுகள்

இரத்தத்திலுள்ள வெள்ளையணுக்களில் ஏறத்தாழ 20–30% லிம்போசைட்டுகள் ஆகும். இச்செல்லின் பெரும்பகுதியை உட்கரு நிரப்பியுள்ள நிலையில் சிறிய அளவிலான சைட்டோபிளாசம் மட்டும் காணப்படுகிறது. B மற்றும் T என இரண்டு வகை லிம்போசைட்டுகள் உள்ளன. இருவகை செல்களும் எலும்பு மஜ்ஜையில் தோன்றுகின்றன. இதில் 'B' செல்கள் எலும்பு மஜ்ஜையிலேயே தங்கி, வளர்ந்து முதிர்ச்சி அடைந்து B-லிம்போசைட்டுகளாக



XII Std Biology-Zoology Chapter-7 TM.indd 143 27/12/2022 19:13:08