

# 1 22.11.

## 1.1 jak se mela resit minula pisemka

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 4 \\ 2 & p & 4 & 1 & \\ 3 & 4 & 1 & 2 & \\ 4 & 1 & 2 & p & \end{bmatrix}$$

REF kam az to pujde

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & p+1 & 3 & 3 & \\ 0 & 3 & 2 & 0 & \\ 0 & 3 & 0 & p+4 & \end{bmatrix}$$

vybereme si jen radky a sloupce co potrebujeme  
protoze zbytek uz ma pivoty definovane

$$\begin{bmatrix} p+4 & 3 \\ 3 & p+4 \end{bmatrix}$$

Zjednodusime a vyzkousime vse v  $Z^5$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2p+3 \\ 0 & 2p+1-p(2p+3) \end{bmatrix}$$

## 1.2 jsou linearne nezavisle?

v  $\mathbb{R}^4$ :

$$x_1 = (1, 2, 0, 0)^T$$

$$x_2 = (2, 1, 1, 3)^T$$

$$x_3 = (0, 1, 0, 1)^T$$

matice pro vypocet:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{REF} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

tudiz ma dimenzi 3 a tudiz jsou ty vektory linearne nezavisle  
jaky vektor jeste muzeme prdat aby byly stale linearne nezavisle?

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & a \\ 2 & 1 & 1 & b \\ 0 & 1 & 0 & c \\ 0 & 3 & 1 & d \end{bmatrix} \xrightarrow{REF} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & c \\ 0 & 0 & 1 & b-2a+3c \\ 0 & 0 & 1 & d-3c \end{bmatrix} \xrightarrow{REF} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & c \\ 0 & 0 & 1 & b-2a+3c \\ 0 & 0 & 0 & d-3c-(b-2a+3c) \end{bmatrix}$$

vysledek:

$$2a - b - 6c + d \neq 0$$

### 1.3 jak vypocist souradnice s jinou bazi

zadani: v  $\mathbb{R}^4$  :

$$B = ((1, -3, 7, 2)^T, (3, 2, 1, -4)^T, (0, -1, 4, -3)^T, (-2, 4, -3, 0)^T)$$

$$x_1 = (2, 2, 9, -5)^T$$

$$x_2 = (-7, 2, 9, -8)^T$$

$$x_3 = (-2, 4, -3, 0)^T$$

dosazeni do matice:

$$\left[ \begin{array}{cccc|ccc} 1 & 3 & 0 & -2 & 2 & -7 & -2 \\ -3 & 2 & -1 & 4 & 2 & 2 & 4 \\ 7 & 1 & 4 & -3 & 9 & 9 & -3 \\ 2 & -4 & -3 & 0 & -5 & -8 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{RREF} \left[ \begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & -7 \end{array} \right]$$

tudiz nam vzniknou nove souradnice:

$$[x_1]_B = (1, 1, 1, 1)^T$$

$$[x_2]_B = (0, -1, 4, 2)^T$$

$$[x_3]_B = (2, -4, 0, -7)^T$$

## 2 29.11.

### 2.1 hledani bazi

V  $\mathbb{R}^5$  mejme vektorove podprostory  $U, V$  definovane

$$U = \text{span}((2, 1, -2, 1, -1)^T, (2, 4, -2, -1, 1)^T, (4, 1, -4, 3, -3)^T)$$

$$V = \text{span}((0, 1, 1, 0, -1)^T, (1, 2, -1, -2, 0)^T, (1, 1, -2, -2, 1)^T, (1, 4, 0, -3, 0)^T, (2, 6, -1, -5, 0)^T)$$

Najdete baze podprostoru  $U, V, U \cap V$  a  $U + V$

$$\left[ \begin{array}{ccc} 2 & 2 & 4 \\ 1 & 4 & 1 \\ -2 & -2 & -4 \\ 1 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & -3 \end{array} \right] \xrightarrow{REF} \left[ \begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

tudiz dimenze je tri (  $\dim(U) = 3$  )

pozorovani: nektre radky jsou stejne (jen jine znamenko), ty se daji lehce odstranit

v  $\mathbb{R}^5$ :

$$\dim(U) = \dim(V) = 3$$

$$\dim(U + V) = 5$$

pro sjednoceni i soucet se udela  $REF$  vseho v jedne matici, s tim ze se tam nemusí davat duplicitni „sloupecky“

### 2.2 baze (pokracovani z minula)

$$B = (x^4 + x^3, x^3 + x^2, x^2 + x, x + 1, 1 + x^4)$$

$$f(x) = 4x^4 + 4x^3 + x + 3$$

$$[f(x)]_B = (a, b, c, d, e)^T$$

$$\left[ \begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right] \xrightarrow{RREF} \left[ \begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] = (3, 1, -1, 2, 1)^T$$

### 2.3 co se bude dit, kdyz u prvniho prikladu zanedbame transpozici

dimenze sice zustane, ale ztratime prehled o tom který vektor je který radek, coz se nam pri sloupcovem zapisu nestane  
v obou pripadech to ulohu nejak resi, ale vysledek se pak musi „spravne precist“