## 8.2 definice: skalarni soucin nad $\mathbb{R}$

Bud V vektorovy prostor nad  $\mathbb{R}$ .

Pak skalarni soucin je zobrazeni  $\langle \cdot, \cdot \rangle : V^2 \to \mathbb{R}$ , splnujici  $\forall x, y, z \in V, |forall\alpha \in \mathbb{R}$ 

- $\langle x, y \rangle \geq 0$  a rovnost nastane pouze pro x = 0
- $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$
- $\langle \alpha x, y \rangle = \alpha \langle x, y \rangle$
- $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$

## 8.3 definice: skalarni soucin nad $\mathbb C$

to same jako 8.2 se zmenou:

### 8.8 definice: Norma indukovana skalarnim soucinem

Norma indukovana skalarnim soucinem je definovano pro  $x \in V$  jako  $||x|| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ 

#### 8.9 definice: Kolmost

vektory  $x, y \in V$  jsou kolme pokud  $\langle x, y \rangle = 0$ 

## 8.11 veta: Pythagorova

Pokud  $x, y \in V$  jsou kolme, tak  $||x + y||^2 = ||x||^2 + ||y||^2$ 

#### dukaz

$$\begin{split} ||x+y||^2 &= \langle x+y, x+y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle = \\ \text{dle definice 8.2 item 2.} \\ \langle x+y, x+y \rangle &= \langle x, x+y \rangle + \langle y, x+y \rangle \\ \text{dle predpokladu kolmosti} \; \langle x, y \rangle &= \langle y, x \rangle = 0 \\ \langle x, x \rangle &= ||x||^2 \; \text{a} \; \langle y, y \rangle = ||y||^2 \end{split}$$

### 8.13 veta: Cauchyho-Schwarzova nerovnost

Pro kazde  $x, y \in V$  plati  $|\langle x, y \rangle| \le ||x|| \cdot ||y||$ 

## 8.15 definice: Norma

Bud V vektorovy prostor nad  $\mathbb R$  resp.  $\mathbb C$ 

Pak norma je zobrazeni ||/cdot|| :  $V \to \mathbb{R}$ , splnujici  $\forall x,y \in Va \forall \alpha \in \mathbb{R}$ 

- $||x|| \ge 0$  a rovnost nastane pouze pro x = 0
- $||\alpha x|| = |\alpha| \cdot ||x||$
- $||x + y|| \le ||x|| + ||y||$

#### Priklady norem v $x \in \mathbb{R}^n$ :

- $p \ge 1$  p-norma
- p=2 eukleidovska
- p = 1 soucotva
- $p = \infty$  maximova (cebysevova)

# 8.20 pozorovani: rovnobeznikove pravidlo

$$||x - y||^2 + ||x + y||^2 = 2||x||^2 + 2||y||^2$$

## 8.21 definice: metrika

 $\forall x,y,z\in M\colon$ 

- $d(x,y) \ge 0$  a = nastane pouze pro x = y
- d(x,y) = d(x,y)
- $d(x,z) \le d(x,y) + d(y,z)$

# 8.27 veta: Fourierovy koeficienty

Gramova-Schmidtova ortogonalizace

- 8.38 veta: Ortogonalni doplnek
- 8.29 veta: Vlastnosti ortogonálního doplňku množiny