

Villa Carlos Paz, 29 de febrero 2024

**A la Presidenta del
Concejo de Representantes
de la Ciudad Villa Carlos Paz
Soledad Zacarías**
S _____ / _____ D:

Dictamen N° 7

Ref: El Artículo 2.3.7. DEL ARBOLADO DE CALLES de la Ordenanza 4021,

Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a los señores Concejales a fin de remitir el Anexo 1. Mencionado en el Dictamen N° 7, fecha 22 de mayo 2023. Proyecto de Ordenanza que modifica el artículo 2.3.7. Del Arbolado de Calles de la Ordenanza N 4021, en su Artículo 2.3.7.3.- SISTEMA DE ARBOLADO PÚBLICO (SAP), incisos a) y b), que por error u omisión no fueron incorporados en su momento.

Saluda Atentamente

Anexo de Referencia (AR). Incisos a y b.

ANEXO I

Zonificación del Sistema de Arbolado Público (SAP)

La Zonificación se basa en un estudio integrado de aspectos urbanos, paisajísticos, edáficos, litológicos, geomorfológicos, hidrológicos y de la vegetación de la localidad. Destaca cualidades y valores del paisaje serrano, pone sobre relieve la diversidad de los caracteres paisajísticos zonales de Villa Carlos Paz y propicia la conectividad ecológica ciudad-entorno a través una estrategia de forestación con fuerte impronta nativa, aportando así a la calidad del hábitat urbano. Al ser una capa de síntesis, esta Zonificación no se ajusta a los límites de los barrios, sino que imprime una lectura nueva sobre el territorio de Villa Carlos Paz.

Se definen 8 Zonas en total para el Sistema de Arbolado Público, siendo 4 Zonas de borde y 4 Zonas internas, que se presentan en el Mapa de Zonificación. Además se definen 5 Bajadas que actúan como Corredores Biológicos particulares. Cada Zona y cada Bajada reciben su nombre en alusión al carácter paisajístico y valores de la identidad cultural y natural que se pretenden resaltar. De acuerdo al criterio de conectividad ecológica definido para el Sistema de Arbolado Público, las Zonas de borde urbano que están en contacto directo con áreas protegidas y con sectores naturales aún no urbanizados, serán forestadas con especies autóctonas locales exclusivamente. Las Zonas centrales donde la urbanización está más consolidada, serán forestadas tanto con especies autóctonas, autóctonas locales, argentinas o exóticas no invasivas.

A cada Zona se le asigna un listado de especies que responde a las características particulares zonales y a la capacidad de las especies para adecuarse a ellas. En las descripciones de las Zonas se destaca el tipo de sustrato natural de implantación y en los listados se aportan características de las especies a fin de orientar mejor la elección por parte de los frentistas.


Las zonas están definidas por polígonos irregulares. En caso de pasar las líneas de los polígonos por una calle donde confluyen una zona de borde y una zona interna, ambas veredas tomarán el criterio de la zona de borde.

Para cada Zona se presentan las especies Permitidas y Recomendadas. Las Especies Permitidas para son aquellas deseables tanto en veredas como en espacios verdes, pues tienen requerimientos compatibles con las características ambientales y urbanas particulares de la Zona. Las especies Recomendadas se resaltan en negritas y son aquellas que presentan las mejores cualidades para ser implantadas en las veredas de esa Zona, considerando dos tipologías de anchos de veredas. La implantación en veredas o espacios verdes de especies que no figuran en estos listados requiere autorización por parte de la Autoridad de Aplicación.

En los listados se presentan las especies por su nombre común y nombre científico. Para ayudar a la elección del frentista se brindan características sobre las especies, tales como tamaño y velocidad de crecimiento, época de floraciones notorias, coloraciones de otoño, presencia o no de espinas, etc. Se resalta que todo árbol implantado, especialmente en vereda, requiere cuidados y conducción frecuente para formar la copa, ya sea que la especie posea o no espinas. Las especies con alta demanda de sol no deben implantarse cuando el espacio que ocupará el árbol recibe proyección de sombras desde el norte, en ese caso seleccionar especies de baja demanda de sol.

Ciudad de Villa Carlos Paz

Zonificación del Sistema de Arbolado Público



1- ZONA UMBRAL DE LA SIERRA

Comprende una franja lineal que se extiende de norte a sur sobre el borde este de la ciudad, en contacto directo con el Área Protegida Camiare. Esta Zona se caracteriza por un sustrato geológico correspondiente a una mixtura de interfase entre la vertiente occidental abrupta de la Sierra Chica y el Piedemonte, de modo que se encuentran sectores escarpados sobre roca metamórfica y con suelos someros pedregosos, y otros sectores que tienen un relieve con menos pendiente y suelos drenados con más depósitos de sedimentos. La zona está atravesada por numerosos escurrimientos naturales.

El polígono de la Zona tiene como límite este el AP Camiare, al norte la intersección del AP Caminare con Av. Bach, y hacia el oeste una línea quebrada que discurre por Av. Bach (exceptuando sus veredas por ser corredor vial principal) hasta Autopista Ruta Nac. 20, retoma por Rosario, Tokio, Santa Fe, Av. Gabriela Mistral, Roque Sáenz Peña, República Argentina, Rivadavia, Miguel Cané, Av. Estrada, La Antártida, Mazzini, Chaco, Tierra del Fuego, Paraguay, Kepler, Portugal, Humboldt, Av. Ramón J. Cárcano (exceptuando sus veredas por ser corredor vial principal), Filipinas, India, Ayacucho Este, Av. Cárcano (exceptuando sus veredas) hasta el límite del ejido municipal que conforma el límite sur del polígono.

Veredas chicas hasta 2m de ancho. Distancia de implantación entre árboles entre 4 y 6 m.

Nombre Común	Nombre Científico	Origen	Crecim.	Follaje	Demand a de sol	Observaciones
Guindillo	Sebastiania commersoniana	autóctona local	Árbol chico. Medio	caduco	media	Coloración otoñal. Posee espinas terminales y pequeñas en etapa juvenil
Durazno del campo	Kageneckia lanceolata	autóctona local	Árbol chico. Rápido	caduco tardío	media	Floración primaveral. Sin espinas
Manzano del Campo	Ruprechtia apetala	autóctona local	Árbol chico. Medio	caduco tardío	media	Floración estival. Sin espinas
Sen del campo	Senna corymbosa	autóctona local	Arbusto. Rápido	caduco tardío	media	Floración verano otoñal. Sin espinas No tolera podas Intensas. Con poda se forma como árbol.
Tumiñico	Lycium cestroides	autóctona local	Árbol chico. Medio	caduco tardío	media	Floración primavera estival. Posee espinas poco notorias. Atrae colibríes
Tusca	Vachellia aroma	autóctona local	Árbol chico. Rápido	caduco	alta	Floración primaveral. Posee espinas que se reducen cuando dispone de más humedad en suelo
Moradillo	Schinus fasciculata / S. longifolius	autóctona local	Árbol chico. Medio	perenne	media	Follaje aromático. Posee pequeñas espinas que se reducen cuando dispone de más humedad en suelo

Veredas medianas o grandes de más de 2m de ancho. Distancia de implantación entre árboles entre 5 y 9 m.

Nombre Común	Nombre Científico	Origen	Crecim.	Follaje	Demand a de sol	Observaciones
Durazno del campo	Kageneckia lanceolata	autóctona local	Árbol chico. Rápido	caduco tardío	media	Floración primaveral. Sin espinas
Manzano del Campo	Ruprechtia apetala	autóctona local	Árbol chico. Medio	caduco tardío	media	Floración estival. Sin espinas
Guindillo	Sebastiania commersoniana	autóctona local	Árbol chico. Medio	caduco	media	Coloración otoñal. Posee espinas terminales y pequeñas en etapa juvenil
Tala falso	Boungainvillea stipitata	autóctona local	Árbol mediano. Medio	Caduco	media	Floración estival. Posee espinas poco notorias.
Coco	Zanthoxylum coco	autóctona local	Árbol mediano. Rápido	perenne	alta	En estado juvenil posee hojas con aguijones.
Tusca	Vachellia aroma	autóctona local	Árbol chico. Rápido	caduco	alta	Floración primaveral. Posee espinas que se reducen cuando dispone de más humedad en suelo
Algarrobo Negro	Prosopis nigra	autóctona local	Árbol mediano. Medio	caduco tardío	muy alta	Posee espinas en etapa juvenil
Mollebeber	Lithraea molleoides	autóctona local	Árbol mediano. Lento	perenne	media	El follaje puede resultar alergénico (dermatitis)
Chañar	Geoffroea	autóctona local	Árbol	caduco	alta	Posee raíz gemífera

	decortica ns		median o. Lento			cuya brotación se estimula por podas intensas
Algarro bo blanco	Prosopis alba	autócton a local	Árbol grande. Rápido	caduco tardío	muy alta	Posee espinas en etapa juvenil. Silueta muy ancha

2- ZONA RIBERAS Y BARRANCAS

Esta Zona se encuentra distribuida en varios sectores sinuosos que acompañan cursos de agua permanentes, temporales y bordes barrancosos del lago. El sustrato geológico es heterogéneo según los sectores. La zona se desarrolla sobre partes con depósitos en valles secundarios, con suelos permeables y pendientes suaves, y otros sectores con roca metamórfica (gneiss) y suelos someros pedregosos, con afloramientos rocosos.

Sector de costa este del lago: Polígono definido en su límite oeste por la costa, límite sur por calle Nahuel Huapi, Quisquisacate y la proyección por fondos de lotes desde Quisquisacate hasta Av. Bach, límite este por Av. Bach hasta la intersección del AP Caminare.

Sector costa oeste del lago al norte del arroyo Los Chorrillos y arroyo Los Mimbres: este polígono tiene su lado este en contacto con la costa del lago ubicada hacia el norte de la desembocadura del río Los Chorrillos, limita al norte con el Área Protegida Norte, el límite oeste y sur discurre por ruta 38, calle s/n, San Gabriel, Av. San Miguel, Gautier, San Abel, Cristóbal Gluck, Liberia, Pitágoras, Tagore, Vivaldi, Bv. Sarmiento.

Sector costa oeste del lago al sur del arroyo Los Chorrillos: este polígono tiene la costa del lago como límite este, al norte la desembocadura de Los Chorrillos, al oeste el Bv Sarmiento y al sur la Av. Uruguay (exceptuando sus veredas por ser corredor vial principal).

Sector Los Chorrillos norte: el polígono se desarrolla entre el cauce del río Los Chorrillos, Bv. Sarmiento, Schiller, Sand, Manet, Víctor Hugo, Sarratea, Quintana, calle s/n hasta el límite del ejido en el oeste.

Sector Los Chorrillos sur y arroyo Los Sauces: se desarrolla como un polígono dendrítico que toma como límite al norte el cauce del río Los Chorrillos, al este Bv. Sarmiento, el límite sur discurre en una línea irregular por las calles Chiclana, Edison, Washington, Grecia, Buonarrotti, Platón, calle s/n, calle s/N, Sancio, Holbein, Congreso, Spaner, Sucre, Pueyrredón, Av. Aristóteles, Roma y su proyección hasta el final de ejido considerando fuera de áreas urbanas una distancia de 50 metros desde el eje del cauce del arroyo Los Sauces, hacia cada margen, en un todo de acuerdo a las disposiciones de la Ley Provincial 10.355. Retoma por la otra orilla por calle Cuchilla Nevada, Montecatini, Cerro de la Gloria, Int. Grimberg, Cerro Negro, calle s/n, calle s/n, Alejandría, ribera sur de Los Chorrillos considerando fuera del área urbana actual una distancia de 50 metros desde el eje del cauce, calle Cimarrosa, límite el ejido.

Sector La Quinta arroyo Huahuas Mayún: el polígono se desarrolla sobre la costa oeste del Río San Antonio, desde Puente Mansilla, discurriendo el límite por calles Asunción, Alejandro Magno, Los Ceibos, prolongación a lo largo del arroyo Huahuas Mayún hasta límite de ejido considerando fuera del área urbana actual una distancia de 50 metros desde el eje del cauce, calle s/n, calle s/n, Los Alerces, Alfonsina Storni, Av. Perito Moreno hasta límite sur del ejido municipal.

Sector arroyo Las Catitas: es un polígono lineal que acompaña al curso de este arroyo considerando fuera de área urbana actual una distancia de 50 metros desde el eje del cauce, desde Río Los Chorrillos, calle s/n, Cerro Nihuil, Monte Sacramento, prolongación por curso del arroyo.

Sector de afluentes del arroyo de la Bajada del Agua Sana: se trata de dos afluentes que confluyen en el cauce que acompaña a Ushuaia hasta el Río San Antonio, considerando fuera de área urbana actual una distancia de 50 metros desde el eje del cauce.

Sector sur de costa este del río San Antonio: el límite oeste está dado por el río San Antonio, al sur por el fin del ejido municipal, al este por la línea que discurre por Av. Cárcano, Ayacucho Oeste, Cuba, Igualdad, Av. Perón y por el norte el lateral del área de interés ambiental.

Sector norte de costa este del río San Antonio: el límite oeste está dado por el río San Antonio, al sur por el lateral del área de interés ambiental, límite este por la línea que discurre por calles Uspallata, Paul Vertaine, Bolivia, Brasil, Ecuador, Leandro Alem, Int. J. García, El Prado, Jorge Newbery, Mármol, Belisario Roldán, José Hernández, Leandro Alem hasta 9 de julio como límite norte.

Veredas chicas hasta 2m de ancho. Distancia de implantación entre árboles entre 4 y 6 m.

Nombre Común	Nombre Científico	Origen	Crecim	Follaje	Deman da de sol	Observacione s
Sen del campo	Senna corymbosa	autócton a local	Arbusto . Rápido	caduco tardío	media	Floración verano otoñal. Sin espinas No tolera podas Intensas
Guindillo	Sebastiania commersoniana	autócton a local	Árbol chico. Medio	caduco	media	Coloración otoñal. Posee espinas terminales y pequeñas en etapa juvenil
Tusca	Vachellia aroma	autócton a local	Árbol chico. Rápido	caduco	alta	Floración primaveral. Posee espinas que se reducen cuando dispone de

						más humedad en suelo
Moradillo	Schinus fasciculata / S. longifolius	autóctona local	Árbol chico. Medio	perenn e	media	Follaje aromático. Posee pequeñas espinas que se reducen cuando dispone de más humedad en suelo
Durazno del campo	Kageneckia lanceolata	autóctona local	Árbol chico. Rápido	caduco tardío	media	Floración primaveral. Sin espinas
Tumiñico	Lycium cestroides	autóctona local	Árbol chico. Medio	caduco tardío	media	Floración primavero estival. Posee espinas poco notorias. Atrae colibríes

Veredas medianas o grandes de más de 2m de ancho. Distancia de implantación entre árboles entre 5 y 9 m.

Nombre Común	Nombre Científico	Origen	Crecim.	Follaje	Demand a de sol	Observaciones
Tala falso	Boungainvillea stipitata	autóctona local	Árbol mediano. Medio	Caduco	media	Floración estival. Posee espinas poco notorias
Manzano del Campo	Ruprechtia apetala	autóctona local	Árbol chico. Medio	caduco tardío	media	Floración estival. Sin espinas
Tala	Celtis tala	autóctona local	Árbol mediano. Lento	caduco	media	Fruto comestible. Posee espinas. Atrae pájaros.
Guindillo	Sebastiania commersoniana	autóctona local	Árbol chico. Medio	caduco	media	Coloración otoñal. Posee espinas terminales y pequeñas en etapa juvenil
Durazno del campo	Kageneckia	autóctona local	Árbol chico.	caduco	media	Floración primaveral. Sin

	lanceolata		Rápido	tardío		espinas
Sauce criollo	Salix humboldtiana	autóctona local	Árbol mediano. Rápido	caduco	alta	Coloración otoñal. Sin espinas
Molle de beber	Lithraea molleoides	autóctona local	Árbol mediano. Lento	perenne	media	El follaje puede resultar alergénico (dermatitis)
Chañar	Geoffroea decorticans	autóctona local	Árbol mediano. Lento	caduco	alta	Posee raíz gemífera cuya brotación se estimula por podas intensas
Algarrobo blanco	Prosopis alba	autóctona local	Árbol grande. Rápido	caduco tardío	muy alta	Posee espinas en etapa juvenil. Silueta muy ancha

3- ZONA LADERAS DEL SAN ANTONIO

Esta Zona se extiende sobre las laderas ubicadas al oeste del Río San Antonio. El sustrato geológico corresponde a roca metamórfica (gneiss), suelos someros pedregosos, el relieve es mediano a fuerte. Hay sectores con depósitos loésicos discontinuos. La zona está atravesada por varios lechos de inundación temporales y algunos humedales pequeños.

El polígono toma como límite este la Av. Perito Moreno, límite sur del ejido municipal, límite oeste el ejido urbano actual, límite norte por calle Los Alerces y Alfonsina Storni hasta Av. Perito Moreno.

Veredas chicas hasta 2m de ancho. Distancia de implantación entre árboles entre 4 y 6 m.

Nombre Común	Nombre Científico	Origen	Crecimiento	Follaje	Demandas de sol	Observaciones
Sen del campo	Senna corymbosa	autóctona local	Arbusto. Rápido	caduco tardío	media	Floración verano otoñal. Sin espinas No tolera podas Intensas
Guindillo	Sebastiania commersoniana	autóctona local	Árbol chico. Medio	caduco	media	Coloración otoñal. Posee espinas terminales y pequeñas en etapa juvenil

Manzano del Campo	Ruprechtia apetala	autóctona local	Árbol chico. Medio	caduco tardío	media	Floración estival. Sin espinas
Moradillo	Schinus fasciculata / S. longifolius	autóctona local	Árbol chico. Medio	perenn e	media	Follaje aromático. Posee pequeñas espinas que se reducen cuando dispone de más humedad en suelo
Tumiñico	Lycium cestroides	autóctona local	Árbol chico. Medio	caduco tardío	media	Floración primavera estival. Posee espinas poco notorias. Atrae colibríes
Tusca	Vachellia aroma	autóctona local	Árbol chico. Rápido	caduco	alta	Floración primavera. Posee espinas que se reducen cuando dispone de más humedad en suelo

Veredas medianas o grandes de más de 2m de ancho. Distancia de implantación entre árboles entre 5 y 9 m.

Nombre Común	Nombre Científico	Origen	Crecim.	Follaje	Demanda de sol	Observaciones
Manzano del Campo	Ruprechtia apetala	autóctona local	Árbol chico. Medio	caduco tardío	media	Floración estival. Sin espinas
Guindillo	Sebastiania commersoniana	autóctona local	Árbol chico. Medio	caduco	media	Coloración otoñal. Posee espinas terminales y pequeñas en etapa juvenil
Tala	Celtis tala	autóctona local	Árbol mediano. Lento	caduco	media	Fruto comestible. Posee espinas. Atrae pájaros.
Coco	Zanthoxylum coco	autóctona local	Árbol mediano. Rápido	perenn e	alta	En estado juvenil posee hojas con aguijones.
Tusca	Vachellia	autóctona local	Árbol	caduco	alta	Floración

	aroma		chico. Rápido			primaveral. Posee espinas que se reducen cuando dispone de más humedad en suelo
Algarrobo Negro	Prosopis nigra	autóctona local	Árbol mediano. Medio	caduco tardío	muy alta	Posee espinas en etapa juvenil
Tala falso	Boungainvillea stipitata	autóctona local	Árbol mediano. Medio	caduco	media	Floración estival. Posee espinas poco notorias.
Molle de beber	Lithraea molleoides	autóctona local	Árbol mediano. Lento	perenne	media	El follaje puede resultar alergénico (dermatitis)
Chañar	Geoffroea decorticans	autóctona local	Árbol mediano. Lento	caduco	alta	Posee raíz gemífera cuya brotación se estimula por podas intensas
Algarrobo blanco	Prosopis alba	autóctona local	Árbol grande. Rápido	caduco tardío	muy alta	Posee espinas en etapa juvenil. Silueta muy ancha

4- ZONA LOMAS ROCOSAS

Es una Zona amplia sobre el oeste de la localidad, extendida de norte a sur, en contacto con áreas protegidas actuales y pretendidas. La zona está atravesada en varios sectores por microcuencas, que pertenecen a la Zona 2- Riberas y Barrancas, y por ello se encuentra dividida en varios sectores. El sustrato geológico abarca dos dominios, uno de roca metamórfica (gneiss) hacia el sur del arroyo Huahuas Mayún y otro de roca ígnea (graníticas) hacia el norte del mismo. El relieve es moderado a fuerte y los suelos son pedregosos y someros. Son frecuentes los afloramientos rocosos.

Sector entre arroyo Los Mimbres y R38: toma el límite del Sector Los Chorrillos sur y arroyo Los Sauces de la Zona 2, discurre por ruta 38, calle s/n, San Gabriel, Av. San Miguel, Gautier, San Abel, Cristóbal Gluck, Corneille, Pitágoras, R. Tagore, Av. Sarmiento, Schiller, George Sand, Manet, Víctor Hugo, Sarratea, Quintana, calle s/n hasta el límite del ejido en el oeste.

Sector al oeste de arroyo Las Catitas: el polígono se extiende entre el límite del ejido municipal oeste, el límite de la poligonal pretendida para el área protegida Oeste (AP2), hasta el río Los Chorrillos.

Sector entre arroyos Las Catitas y Los Sauces: toma en el oeste el límite del Sector arroyo Las Catitas de Zona 2, considerando fuera de área urbana actual una distancia de 50 metros

desde el eje del cauce, al sur el límite de la poligonal pretendida para el área protegida Oeste, al este el límite del Sector Los Chorrillos sur y arroyo Los Sauces de Zona 2 que discurre por calle Cuchilla Nevada, Montecatini, Cerro de la Gloria, Int. Grimberg, Cerro Negro, calle s/n, calle s/n, Alejandría, ribera sur de Los Chorrillos considerando fuera del área urbana actual una distancia de 50 metros desde el eje del cauce, Cimarrosa, límite del ejido municipal.

Sector entre arroyos Los Sauces y Huahuas Mayún: toma como límite sur la línea de la poligonal pretendida para el área protegida Oeste, límite oeste calle Roma hasta Gound, Baudelaire, Alejandro Magno, Los Ceibos y la extensión del arroyo Huahuas Mayún según límite definido en Sector La Quinta arroyo Huahuas Mayún de la Zona 2 considerando fuera de área urbana actual una distancia de 50 metros desde el eje del cauce.

Sector al sur del arroyo Huahuas Mayún: este polígono extenso toma como límite oeste la línea de la poligonal pretendida para el área protegida Oeste, al norte con el límite definido para el Sector La Quinta arroyo Huahuas Mayún de la Zona 2 considerando fuera de área urbana actual una distancia de 50 metros desde el eje del cauce, hasta el límite de la Zona – Laderas del San Antonio sobre límite del ejido urbano actual, hasta el límite sur del ejido municipal. Este sector presenta dos intrusiones correspondientes a los afluentes del arroyo de la Bajada del Agua Sana.

Veredas chicas hasta 2m de ancho. Distancia de implantación entre árboles entre 4 y 6 m.

Nombre Común	Nombre Científico	Origen	Crecim.	Follaje	Demand a de sol	Observaciones
Guindillo	Sebastiania commersoniana	autóctona local	Árbol chico. Medio	caduco	media	Coloración otoñal. Posee espinas terminales y pequeñas en etapa juvenil
Manzano del Campo	Ruprechtia apetala	autóctona local	Árbol chico. Medio	caduco o tardío	media	Floración estival. Sin espinas
Tusca	Vachellia aroma	autóctona local	Árbol chico. Rápido	caduco	alta	Floración primaveral. Posee espinas que se reducen cuando dispone de más humedad en suelo
Moradillo	Schinus fasciculata / S. longifolius	autóctona local	Árbol chico. Medio	perenne	media	Follaje aromático. Posee pequeñas espinas que se reducen cuando dispone de más humedad en suelo
Tintitaco	Prosopis torquata	autóctona local	Árbol chico. Lento	caduco	alta	Floración primaveral estival. Posee espinas

Espinillo	Vachellia caven	autóctona local	Árbol chico. Rápido	caduco	alta	Floración primaveral. Posee espinas que se reducen cuando dispone de más humedad en suelo
Espinillo negro	Vachellia astringens	autóctona local	Árbol chico. Rápido	caduco	alta	Floración primaveral. Posee espinas que se reducen cuando dispone de más humedad en suelo

Veredas medianas o grandes de más de 2m de ancho. Distancia de implantación entre árboles entre 5 y 9 m.

Nombre Común	Nombre Científico	Origen	Crecimiento	Follaje	Demand a de sol	Observaciones
Molle de beber	Lithraea molleoides	autóctona local	Árbol mediano. Lento	perenn e	media	El follaje puede resultar alergénico (dermatitis)
Tala	Celtis tala	autóctona local	Árbol mediano. Rápido	caduco	media	Fruto comestible. Posee espinas. Atrae pájaros.
Algarrobo Negro	Prosopis nigra	autóctona local	Árbol mediano. Medio	caduc o tardío	muy alta	Posee espinas en etapa juvenil
Coco	Zanthoxylum coco	autóctona local	Árbol mediano. Rápido	perenn e	alta	En estado juvenil posee hojas con agujones.
Manzano del Campo	Ruprechtia apetala	autóctona local	Árbol chico. Medio	caduc o tardío	media	Floración estival. Sin espinas
Guindillo	Sebastiania commersoniana	autóctona local	Árbol chico. Medio	caduco	media	Coloración otoñal. Posee espinas terminales y pequeñas en etapa juvenil
Espinillo	Vachellia caven	autóctona local	Árbol chico.	caduco	alta	Floración primaveral. Posee

			Rápido			espinas que se reducen cuando dispone de más humedad en suelo
Chañar	Geoffroea decorticans	autóctona local	Árbol mediano. Lento	caduco	alta	Posee raíz gemífera cuya brotación se estimula por podas intensas
Tusca	Vachellia aroma	autóctona local	Árbol chico. Rápido	caduco	alta	Floración primaveral. Posee espinas que se reducen cuando dispone de más humedad en suelo
Espinillo negro	Vachellia astringens	autóctona local	Árbol chico. Rápido	caduco	alta	Floración primaveral. Posee espinas que se reducen cuando dispone de más humedad en suelo

5- ZONA MIRADORES

En esta Zona el sustrato geológico es de roca ígnea (graníticas) y suelos someros, pendientes medianas a fuertes. Son frecuentes los afloramientos rocosos.

El polígono está delimitado al este por Asunción, Bv Sarmiento, por el norte y oeste el límite del Sector de Zona 2 denominado Los Chorrillos sur y arroyo Los Sauces que discurre por las calles Chiclana, Edison, Washington, Grecia, Buonarrotti, Platón, calle s/n, calle s/N, Sancio, Holbein, Congreso, Spaner, Sucre, Pueyrredón, Av.Aristóteles, Roma hasta Gound, Baudelaire, Alejandro Magno, Asunción.

Veredas chicas hasta 2m de ancho. Distancia de implantación entre árboles entre 4 y 6 m.

Nombre Común	Nombre Científico	Origen	Crecim.	Follaje	Demand. de sol	Observaciones
Guindillo	Sebastiania commersoniana	autóctona local	Árbol chico. Medio	caduco	media	Coloración otoñal. Posee espinas terminales y pequeñas en etapa juvenil

Manzano del Campo	Ruprechtia apetala	autóctona local	Árbol chico. Medio	caduco o tardío	media	Floración estival. Sin espinas
Tusca	Vachellia aroma	autóctona local	Árbol chico. Rápido	caduco	alta	Floración primaveral. Posee espinas que se reducen cuando dispone de más humedad en suelo
Espinillo	Vachellia caven	autóctona local	Árbol chico. Rápido	caduco	alta	Floración primaveral. Posee espinas que se reducen cuando dispone de más humedad en suelo
Falso guayabo	Acca sellowiana	argentina	Árbol chico. Medio	perenn e	alta	Floración primavero estival. Sin espinas
Tintitaco	Prosopis torquata	autóctona local	Árbol chico. Medio	caduco	alta	Floración primavero estival. Posee espinas
Moradillo	Schinus fasciculata / S. longifolius	autóctona local	Arbusto. Medio	perenn e	media	Follaje aromático. Posee pequeñas espinas que se reducen cuando dispone de más humedad en suelo
Espinillo negro	Vachellia astringens	autóctona local	Árbol chico. Rápido	caduco	alta	Floración primaveral. Posee espinas que se reducen cuando dispone de más humedad en suelo
Crespón	Lagerstroemia indica	exótica	Árbol chico. Medio	caduco	media	Floración estival, coloración otoñal. Sin espinas. Rebrote basal.

Veredas medianas o grandes de más de 2m de ancho. Distancia de implantación entre árboles entre 5 y 9 m.

Nombre Común	Nombre Científico	Origen	Crecim.	Follaje	Demand a de sol	Observaciones
--------------	-------------------	--------	---------	---------	-----------------	---------------

Tala	Celtis tala	autóctona local	Árbol mediano. Rápido	caduco	media	Fruto comestible. Posee espinas. Atrae pájaros.
Mollebeber	Lithraea molleoides	autóctona local	Árbol mediano. Lento	perennante	media	El follaje puede resultar alergénico (dermatitis)
Chañar	Geoffroea decorticans	autóctona local	Árbol mediano. Lento	caduco	alta	Posee raíz gemífera cuya brotación se estimula por podas intensas
Coco	Zanthoxylum coco	autóctona local	Árbol mediano. Rápido	perennante	alta	En estado juvenil posee hojas con aguijones.
Guindillo	Sebastiania commersoniana	autóctona local	Árbol chico. Medio	caduco	media	Coloración otoñal. Posee espinas terminales y pequeñas en etapa juvenil
Manzano del Campo	Ruprechtia apetala	autóctona local	Árbol chico. Medio	caduco tardío	media	Floración estival. Sin espinas
Sófora	Styphnolobium japonicum	exótica	Árbol mediano. Rápido	caduco	alta	Floración estival. Sin espinas
Nogal pekán	Carya illinoensis	exótica	Árbol grande. Lento	caduco	media	Fruto comestible. Sin espinas
Algarrobo chileno	Prosopis chilensis	autóctona	Árbol grande. Medio	caduco tardío	muy alta	Posee espinas en etapa juvenil. Silueta ancha
Algarrobo dulce	Prosopis flexuosa	autóctona	Árbol grande. Medio	caduco tardío	muy alta	Posee espinas en etapa juvenil. Silueta ancha
Orco Quebrachón	Schinopsis lorentzii	autóctona	Árbol grande. Lento	caduco tardío	alta	Sin espinas

Esta Zona es extensa y está ubicada en el piedemonte hacia el este del Río San Antonio y el lago San Roque. Queda dividida en dos sectores, uno al sur separado por un área de interés ambiental y un sector central extenso hasta el norte de la Autopista. La Zona está atravesada por cuatro Bajadas. El sustrato corresponde depósitos de loésicos, arenas y gravas, los suelos son profundos y pedregosos. La Zona está atravesada por valles transversales plano cóncavos asociados a drenajes secundarios de los escurrimientos naturales que se dirigen al río y al lago y genera lechos de inundación temporales en la zona central.

Sector sur: delimitado al sur por Ayacucho Oeste, Ayacucho Este, al este por calle India, al norte por línea imaginaria que une desde la intersección de India esq. Francia con la esquina de Av. Perón y calles s/n (lateral sur del área de interés ambiental), y sigue por línea que discurre por Av. Perón, Igualdad, Cuba hasta Ayacucho Oeste.

Sector centro y norte: el límite sur del polígono está dado por calle Humboldt y la prolongación por el lateral del área de interés ambiental, el límite oeste por la línea de contacto con la Zona 2 discurriendo por calles Uspallata, Paul Vertaine, Bolivia, Brasil. Ecuador, Leandro Alem, Int. J. García, El Prado, Jorge Newbery, Mármol, Belisario Roldán, José Hernández, Leandro Alem, 9 de julio, costa del lago. El límite norte por calle Nahuel Huapi, Quisquisacate, continuando por la proyección imaginaria perpendicular a ésta hasta Av. Bach, Av. Bach hasta autopista, calle Rosario, Tokio, Santa Fe, Av. Gabriela Mistral, Roque Sáenz Peña, República Argentina, Rivadavia, Miguel Cané, Av. Estrada, La Antártida, Mazzini, Chaco, Tierra del Fuego, Paraguay, Kepler, Portugal hasta Humboldt.

Veredas chicas hasta 2m de ancho. Distancia de implantación entre árboles entre 4 y 6 m.

Nombr e Comú n	Nombr e Científic o	Origen	Crecim.	Follaje	Deman da de sol	Observaciones
Durazno del campo	Kagenec kia lanceolat a	autóctona local	Árbol chico. Rápido	caduco tardío	media	Floración primaveral. Sin espinas
Guindillo	Sebastiania commersoni ana	autóctona local	Árbol chico. Medio	caduco	media	Coloración otoñal. Posee espinas terminales y pequeñas en etapa juvenil
Manzano del Campo	Ruprech tia apetala	autóctona local	Árbol chico. Medio	caduco tardío	media	Floración estival. Sin espinas
Espinillo	Vachellia caven	autóctona local	Árbol chico. Rápido	caduco	alta	Floración primaveral. Posee espinas que se reducen cuando dispone de

						más humedad en suelo
Espinillo negro	Vachellia astringens	autóctona local	Árbol chico. Rápido	caduco	alta	Floración primaveral. Posee espinas que se reducen cuando dispone de más humedad en suelo
Tumiñico	Lycium cestroides	autóctona local	Árbol chico. Medio	caduco tardío	media	Floración primavera estival. Posee espinas poco notorias. Atrae colibríes
Árbol de Judea	Cercis siliquastrum	exótica	Árbol chico. Medio	caduco	alta	Floración primaveral. Sin espinas
Ciruelo flor de	Prunus cerasifera var. Atropurpurea	exótica	Árbol chico. Lento	caduco	alta	Follaje morado, floración primaveral
Falso guayabo	Acca sellowiana	argentina	Árbol chico. Medio	perenn e	alta	Floración primavera estival. Sin espinas
Sen del campo	Senna corymbosa	autóctona local	Arbusto. Rápido	caduco tardío	media	Requiere conducir la copa alta para no competir con el espacio peatonal, no tolera podas intensas
Limpiatubo	Callistemon lanceolatus	exótica	Árbol chico. Rápido	perenn e	media	Hay varias especies: C. citrinus, C. rigidus, C. linearis
Crespón	Lagerstroemia indica	exótica	Árbol chico. Medio	caduco	media	Floración estival, coloración otoñal. Sin espinas. Rebrote basal.
Avellano	Corylus avellano	exótica	Árbol chico. Lento	caduco	alta	Fruto comestible. Sin espinas

Veredas medianas o grandes de más de 2m de ancho. Distancia de implantación entre árboles entre 5 y 9 m.

Nombr e Comú n	Nombre Científico	Origen	Crecim.	Follaje	Demand a de sol	Observaciones
Tala falso	Boungainvillea stipitata	autóctona local	Árbol median o. Medio	Caduco	media	Floración estival. Posee espinas poco notorias.
Tala	Celtis tala	autóctona local	Árbol median o. Rápido	caduco	media	Fruto comestible. Posee espinas. Atrae pájaros.
Algarrobo Negro	Prosopis nigra	autóctona local	Árbol median o. Medio	caduco tardío	muy alta	Posee espinas en etapa juvenil
Manzano del Campo	Ruprechtia apetala	autóctona local	Árbol chico. Medio	caduco tardío	media	Floración estival. espinas Sin
Sófora	Styphnolobium japonicum	exótica	Árbol median o. Rápido	caduco	alta	Floración estival. espinas Sin
Ciruelo de flor	Prunus cerasifera var. Atropurpurea	exótica	Árbol chico. Lento	caduco	alta	Follaje morado, floración primaveral
Fresno europeo	Fraxinus excelsior	exótica	Árbol median o. Lento	caduco	media	No produce frutos. Sin espinas.
Fresno dorado	Fraxinus excelsior 'Aurea'	exótica	Árbol chico. Rápido	caduco	media	Follaje verde amarillento. Posee injerto alto
Pezuña de vaca rosada	Bauhinia variegata	exótica	Árbol median o. Rápido	caduco	alta	Floración primaveral. Sin espinas
Tilo	Tilia moltkei	exótica	Árbol grande. Lento	caduco	media	Floración estival. espinas. Sin
Liquidámbar	Liquidambar formosana	exótica	Árbol	caduco	alta	Coloración otoñal.

			grande. Medio			No tolera suelos alcalinos
Mato	Myrcianthes cisplatensis	autóctona	Árbol median o. Medio	perenn e	alta	Posee raíces gemíferas. Sin espinas
Lapacho rosado	Handroanthus impetiginosus	argentina	Árbol median o. Medio	caduc o tardío	media	Floración primaveral. Sin espinas. Sensible a heladas intensas
Ceibo	Erythrina crista-galli	argentina	Árbol median o. Rápido	caduco	media	Posee raíces superficiales , en estado juvenil es sensible a heladas
Cina Cina	Parkinsonia aculeata	argentina	Árbol median o. Rápido	caduco	muy alta	Floración primavero estival. Posee espinas.

Las denominadas Bajadas conforman calles secundarias a las cuales se les da una forestación con carácter particular para que funcionen como corredores biológicos (destinados a aves y polinizadores principalmente), dado que atraviesan otras Zonas y así darán mayor conectividad. En estas Bajadas se conservará la forestación actual y se irá favoreciendo la presencia de las especies definidas mediante nuevas forestaciones y cuando se requiera el reemplazo de ejemplares existentes. Las calles que adquieren este perfil son:

CB1- Bajada de los Antiguos: Se extiende a través de la zona Valle del Lago, por las calles Fideas y la continuación por Gdor Garzón. Será forestada acentuando la presencia de Algarrobos negros (*Prosopis nigra*). El nombre refiere a los pobladores originarios, destacando la existencia de sectores de valor arqueológico sobre bordes del Lago y otras partes de la actual ciudad.

CB2- Bajada de las Quebradas: Atraviesa la zona Valle del Lago, por las calles Gabriela Mistral y Esparta. Será forestada con Manzano del campo (*Ruprechtia apetala*). El nombre de esta Bajada alude que a las laderas muy escarpadas del Área Protegida Camiare donde finaliza la calle Gabriela Mistral.

CB3- Bajada de las Vertientes: Se extiende atravesando la zona Valle del San Antonio, a lo largo de las calles Neuquén y Los Cóndores. Será forestada con Guindillos (*Sebastiania commersoniana*), que es una especie asociada naturalmente a

zonas de vertientes.

CB4- Bajada de los Pájaros: Se extiende atravesando la zona Valle del San Antonio, a lo largo de la calle Juncal (este y oeste). Será forestada favoreciendo una alta presencia de Talas (*Celtis tala*), que es especie autóctona muy atractiva para los pájaros, por su fruto y el ramaje intrincado.

CB5- Bajada del Agua Sana: Recorre la calle Ushuaia. Será forestada con Sauce criollo (*Salix humboldtiana*), que es una especie asociada a los cursos de agua. El nombre remite a la presencia del curso que acompaña el recorrido de esta calle, poniendo sobre relieve la necesidad de cuidar la salud del agua para nuestra propia salud y la de otros organismos que comparten el ecosistema.

ANEXO II

Especies Prohibidas para todas las Zonas del Sistema de Arbolado Público.

Este Listado está basado en documentación científica regional y nacional y en registros locales que dan cuenta de procesos de invasión biológica con consecuencias sobre laderas y cursos de agua de la región, por causa de la expansión descontrolada de especies exóticas invasivas. Se asumen en esta medida los Principios de Prevención, Precautorio y de Sustentabilidad, los cuales respectivamente indican que:

- Las causas y fuentes de problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir.
- Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.
- El desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras.

Nombre Común	Nombre Científico
Acacia blanca	Robinia pseudoacacia
Acacia negra, Acacia tres espinas	Gleditsia triacanthos
Aguaribay	Schinus areira
Álamo blanco	Populus alba
Almez	Celtis australis
Árbol del cielo	Ailanthus altissima
Arce común	Acer negundo
Aromo francés	Acacia dealbata
Bandera española	Lantana camara
Cotoneaster	Cotoneaster franchetii, C. glaucophyllus y C. horizontalis
Crató, Crataegus	Pyracantha angustifolia y P. coccinea
Eucalipto común	Eucalyptus camaldulensis
Falso cafeto	Manihot grahamii

Fresno común	Fraxinus americana
Guarán	Tecoma stans
Jacarandá	Jacaranda mimosifolia
Lambertiana	Cupressus macrocarpa
Ligustrina	Ligustrum sinense
Mora	Morus alba
Mora	Morus nigra
Mora de papel	Broussonetia papyrifera
Naranjo de Luisiana	Maclura pomifera
Olmo común	Ulmus pumilla
Paraíso	Melia azederach
Pezuña de vaca	Bahuinia forficata
Pino	Pinus elliotii y P. halepensis
Retama	Spartium junceum
Rosa mosqueta	Rosa rubiginosa
Sauce mimbre	Salix viminalis
Siempreverde, Ligustro	Ligustrum lucidum
Tamarisco	Tamarix ramosissima y T. gallica
Zarzamora	Rubus ulmifolius